

SUPLEMENT  
LA  
CONSPECTUL FLOREI ROMÂNIEI

---

SUPLEMENT

LA

# CONSPECTUL FLOREI ROMÂNIEI

PLANTE ULTERIOARE, ADIȚII ȘI RECTIFICĂRI

ÎNȘOTIT ȘI DE UN APPENDIX FINAL DE PLANTE RARE AFLATE  
ÎN ROMÂNIA, PÂNĂ ACUM NECUNOSCUTE, CU 6 TABELE  
ICONOGRAFIATE ÎN LITOGRAFIE

A U T O R

DR DIM. GRECESCU

PROFESOR UNIVERSITAR ONORAR  
MEMBRU AL ACADEMIEI ROMÂNE



BUCUREȘTI

Institutul de Arte Grafice CAROL GÖBL Succesor Ioan St. Rasidescu  
16, STRADA DOAMNEI, 16

1909

Plantele ce expunem în acest Suplement sunt acelea ce au fost culese și adunate în urma publicației **Conspectului Florei României**, dată în anul 1898. Între acestea, figurează *Plantele Indigene din România*, publicate în anii 1899, 1900 și 1901 pe timpul funcționării noastre profesionale ca director al Laboratorului de Botanică Medicală la Facultatea de Medicină din București. Aceste plante, încă de atunci, au fost încorporate în *Herbarul Florei României* al acelui laboratoriu, acum transferat și pus în păstrarea Institutului Botanic dela Cotroceni. Deși publicate odinioară în acele trei fascicule, totuși le-am întrunit în acest Suplement spre a nu rămânea în uitare, ca pierdute și împrăștiate în acele fascicule, de altfel acum dispărute și abia rămase câteva în mâna a vreo trei-patru persoane bibliofile.

Afară de acestea, în urmă, am continuat încă, explorând unele părți ale țării și constituind o *Colecție Suplementară de Plante din România*, precum se va vedea în lucrarea de față. Pe lângă cele culese de noi, există și un însemnat număr de plante datorite persoanelor următoare, spre studiere și determinare, și din localitățile ce urmează:

D-lui Locotenent-farmacist Gh. Grințescu, plantele aduse din districtul Neamțu și din Ceahlău; asemenea și cele aduse din districtul Ialomița: Urziceni, Speteni, Borănești, Dudeasca și Cotorca;

D-lui Profesor Marcel Brânză, plantele dela Agiud, Slănic și munții Slănicului: Șandru, Pufu, Dobru etc.; asemenea și plantele din Dealu-Mare dela Valea Călugărească, cele din lunca Prahovei dela Tinoasa și Crivina cum și unele din districtul Ilfov dela pădurea

## VI

Andronache, Ștefănești etc. Este locul să arătăm că plantele aduse de D-sa dovedesc o știință și pricepere deosebită prin felul exemplarelor frumos alese și reprezentate ; mare parte determinate de D-sa.

D-lui N. Iacobescu, profesor la Școala Superioară Silvică din Brănești, plantele din Brănești și vecinătățile sale, Pasărea și Cernica, cum și din câteva alte localități: dunele maritime dela Mamaea, altele dela Mihăești districtul Muscel și dela Monastirea Suzana districtul Prahova.

D-lui P. Enculescu, asistent în Institutul Geologic, plantele din regiunea stepelor, cu osebite din părțile sărate pe Călmățui în districtele Buzău, Brăila și Ialomița, cum și a stepelor din Moldova inferioară: Iași, Vaslui, Tutova, Huși și Tecuci, alegând specii mai deosebite și interesante ca raritate și în mare parte determinate de D-sa; în fine

D-lui Grigorian, silvicultor în serviciul Ministerului Domeniilor Statului, plantele aduse din Dobrogea septentrională și anume din plasa Măcinului și parte a Babadagului.

Din toată inima le exprimăm o nemărginită mulțumire pentru zelul și ostenelele ce-și au dat și pentru amabilitatea cu care ne au pus la dispoziție plantele D-lor.

O dorință veche ce ne domină de mult eră cercetarea din parte-ne a doui coloși montani ai Carpaților noștri, ce încă nu călcaserăm și cu gândul ne stau pe inimă: Negoiu și Parângu. Dar eacă-ne cu timpul ajunși în epoca de retragere din activitatea profesorală și profesională, când anii etăței înaintate și forțele corporale nu mai îngăduie călătoriile lungi și obositoare, călare sau pe jos, prin arșiță, ploaie sau frig, cutreerând, suind și pogorând. Totuși, însă, în vara anului 1906 am făcut o supremă încercare suind treptele Negoiului—deși cu mult chin numai pe înălțimea dela Lespezi, a cărei coamă ajunge cam pe la 2.000 m. altitudine ; apoi în anul următor Paltina, iar la poalele acestora valea Caprei, valea Budei, Cumpăna și Cheea-Argeșului. Însă Parângul, falnicul colos carpatic al Olteniei, a fost cutreerat în vara anului 1908 de elevii Școalei Superioare Silvice din Brănești, trămiși în excursie științifică prin inițiativa d-lui N. Po-

povici, Directorul școlii, și sub conducerea D-lui Profesor N. Iacobescu, cu rugămintea din parte-ne de a culege tot ce vor găsi ca plante în calea pe Lotru dela Voineasa până sus la Vidra și pe tot Parângul. Contingentul de plante adus din această parte este foarte însemnat și interesant ca specii montane și alpine, precum se poate vedea în expunerea ce urmează.

În cele din urmă, în vara anului 1908, aflându-ne în stația balneară Techirghiol-Movilă pentru căutarea sănătății, am profitat de acea ședere de a observa și studia mai în deaproape plantele din acea regiune a Dobrogei, colindând întinderea dintre Tuzla, Techirghiol, Marea-Neagră până în Constanța și aducând un număr însemnat de plante, pe lângă acelea ce înainte erau cunoscute și enumerate din acea parte în Conspectul nostru.

Când, acum zece ani, încheiam lucrarea noastră, **Conspectul Florei României**, ziceam că «suntem departe de a fi săvârșit țelul nostru și că treoue încă de lucru pe câmpul cercetărilor botanice în țara noastră etc. Căci, nu este destul a ști anume ce avem, dar trebuie a ști asemenea toate părțile din țară în care se găsește fiecare specie spre a ne folosi la trebuință. Nu doar că acum am putut atinge acest țel; totuși, un pas bunicele este de însemnat.

Astfel, de astădată, Conspectul nostru va putea intercală, între familiile de plante, *Frankeniaceele*; între ordine și triburi de familii, ordinea *Celospermelor* în Umbelifere, tribul *Coriandrelor* în Umbelifere, tribul *Rocheliilor* între Boraginacee. Apoi, genurile: *Aldrovanda* L., *Schiewereckia* Andr., *Frankenia* L., *Buffonia* L., *Sarothamnus* Wimm., *Bifora* Hoffm., *Stenactis* Nees ab Esemb., *Chamaepeuce* DC., *Andromeda* L., *Swertia* L., *Lycopsis* L., *Rochelia* Rchb., *Litorella* L., *Valisneria* L., *Ophrys* L., *Asphodeline* Rchb., *Sporobolus* R. Brow., *Najas* L.

Numărul speciilor și varietăților de specii, necuprinse în Conspect și aflate în urmă, este cu osebire însemnat ca să le enumerăm aici. Toate acestea — familii, ordine, triburi, genuri, specii și varietăți, cari sunt *adiționale* pentru **Conspectul Florei României** și ca deosebire de celelalte — sunt precedate cu semnul *asterisc* (\*).

Deosebit de acestea, într'un «**Appendix**» final se mai cuprinde

și următoarele *specii nouă*, aflate în România, până acum necunoscute, descrise de subsemnatul: *Silene Lotriensis*, *Melilotus arenaria*, *Senecio ponticus*, *Nonea paniculata*, *Scrophularia elata* și *Suaeda littoralis*, însoțite fiecare și de câte o tabelă sau icoană în litografie.

Câteva numiri populare românești, aflate în urma publicației Conspectului nostru, sunt înscrise ca *adiții* de numiri populare.

Cu prilejul lucrării prezente, am făcut și rectificarea numirei botanice a câtorvâ specii eronat determinate în Conspect cât și rectificarea de *prioritate* în *numirea capitală* a unor specii, precum am putut afla în urmă, eronat numite și dupe cum se obicinuiă în cele mai multe tractate de Floră de reputație clasică. Botaniștii de seamă cunosc aceste alunecușuri în Nomenclatura botanică și vor privi ca scuze confesiunea din parte-ne, cunoscând că în știință *o eroare aflată și îndreptată valorează aproape cât o descoperire*, departe de a face să roșească autorul: *în știință bună credință și adevăr înainte de toate*.

*București, 1908, Decembrie 10.*

**DR. DIM. GRECESCU.**

Ș U P L E M E N T  
LA  
CONSPECTUL FLOREI ROMÂNIEI

PLANTE ULTERIOARE, ADIȚII ȘI RECTIFICĂRI.

I. EMBRIOGENE DICOTILEDONAE

CLASA I

Dicotiledonae dialipetale ipogine

RANUNCULACEAE Juss.



*Clematis integrifolia* L. spe. p. 764 (Consp. p. 21). — Locuri joase umede. Roșești pe la pădure în Lotru.

*C. recta* L. spe. p. 764 (Consp. p. 21). — Adiție : vulgar *Sburătoare*. Livezi, crânguri. Slănic pe dealurile vecine ; Dealu-Mare la Valea Călugărească.

*C. Vitalba*  $\alpha$ . L. spe. p. 766 (Consp. p. 21). — Tuferișe, păduri. Păiuș, Lainici ; Govora ; Curtea-de-Argeș ; Dealu-Mare la Valea Călugărească ; pădure la Dascălu-Creața în Ilfov ; Tulcea, Greci, Babadag ; Murfatlar.

$\beta$ . *banatica* Wierzb. ap. Rchb. icon. fl. germ. vol. 4 fig. 4667  $\beta$ . (Consp. p. 22). Govora pe valea Hinței și la piscul Mătușea Floarea.

$\gamma$ . *dentata*. *C. Vitalba*  $\beta$ . L. spe. p. 766. — Stânci montane pe Argeș în valea Budei la Cumpăna ; păduri : Brănești, Pasărea ; Panciu.

*Atragene alpina* L. spe. p. 764 (Consp. p. 22). — Stânci montane. Pe Lotru în valea Voinășitei și pe Jidoaea ; Negoiu și la Cumpăna în valea Caprei ; Sinaia la Urlătoare și în valea Jepilor (pl. indig. 1899, 1900 și 1901) ; Ceahlău (pl. indig. 1900).

*Thalictrum aquilegifolium* L. spe. p. 770 (Consp. p. 22). — Tuferișe. Pe Lotru la Voineasa și Vidra ; Govora pe valea Hinței ; pe Argeș la Cumpăna în valea Caprei ; Predeal în valea Roșnovei (pl. indig. 1900) ; Dealu-Mare la Valea Călugărească ; pe muntele Petru-Vodă în Neamțu și pe Rarău în Suceava : *forma communis* ; la Schitul Țăbucani în Neamțu : *forma procera*.

β. *pauciflorum* Grec. consp. p. 23. **Th. pauciflorum** Schur enum. transs. p. 7. — În regiunea alpină, subalpină. Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901) și pe la Peștera-Ialomiței (pl. indig. 1899); Ceahlău.

**Th. foetidum** L. spe. p. 768 (Consp. p. 23). — Tuferișe, câmpuri. Urziceni, Speteni, Dudeasca pe la pădurea Arionoei în Ialomița.

**Th. saxatile** Schleich. ap. DC. prodr. vol. 1 p. 13 (Consp. p. 23). Locuri pietroase în părțile montane și deluroase. În Argeș pe muntele Arefu; Buceci la Urlătoare; Piatra-Neamțu pe Cozla; Botoșani pe la pădurea Rediu (pl. indig. 1901); Dealu-Mare la Valea Călugărească.

**Th. collinum** Wallr. sched. p. 259. *Th. flexuosum* Bernh. ap. Rchb. icon. fl. germ. vol. 4 fig. 4628-non Koch (Consp. p. 23). — Tuferișe. Dudeasca pe la pădurea Arionoea în Ialomița; pădurea Cieru lângă Tecuci; Nicolitel, Cocoși în Tulcea; Constanța între Palazu și Horoslar (*Th. flexuosum* Grec. pl. indig. 1900); Techirghiol-Movilă.

Specimenele noastre prezente, ca și cele citate în Conspect p. 23, au ramificațiile primare ale pețiolilor nestipelate, ceea ce-l aseamănă cu cel precedent; caulul flexuos și florile nutante, ceea ce-l deosebește de cel precedent la care caulul jos la pământ tot culcat apoi adscendent, dar florile erecte.

**Th. medium** Jacq. hort. vindob. vol. 3 tab. 96 (Consp. p. 24). — Pe dealuri, la Hârlău distr. Botoșani și la Nicorești distr. Tecuci (pl. indig. 1899).

**Th. elatum** Murr. syst. veget. p. 513 (Consp. p. 24). — Livezi, tuferișe. Brănești distr. Ilfov; pe la pădurea Arionoea la Dudeasca în Ialomița; Adjud.

**Th. simplex** L. mant. p. 78 (Consp. p. 24). — Cheea-Argeșului; dealul Hodiei și coastele Rugetului la Curtea-de-Argeș; pădurea Cotmeana-Drăgăști distr. Argeș (pl. indig. 1899); Cotorca în Ialomița; pădurea Carorman în delta Dunărei (pl. indig. 1900).

**Th. angustifolium** Jacq. hort. vindob. vol. 3 tab. 43: α. *stenophyllum* Wimm. et Grab. fl. sil. vol. 2 p. 157 (Consp. p. 25). — Brănești în Ilfov; poalele Ceahlăului la Bicz (Grec. pl. indig. 1899), pe Bistricioara și pe Petru-Vodă în Neamțu; Greci dealul Teilor în Tulcea.

*var. δ. peucedanifolium* Grec. consp. p. 25. **Th. peucedanifolium** Griseb. et Sch. iter hung. No. 102. — Cheea-Argeșului la intrare, a rar; Slănic; Ceahlău (pl. indig. 1899).

**Anemone Hepatica** L. spe. p. 758 (Consp. p. 25). Adif. vulgar *Crucea-Voinicului*. Prin fâget. Govora în valea Hinței; Curtea-de-Argeș pe dealuri; Târgu-Neamțu (pl. indig. 1899); Piatra-Neamțu pe Pietricica; dealul Șuțu distr. Râmnicu-Sărat; pădurea Rediu la Botoșani; Dorohoi (pl. indig. 1900).



**A. angulosa** Lam. encycl. vol. 1 p. 169 (1782). *Hepatica multiloba* Guebhard enum. pl. mold. an 1842 à 1848 manuscript în biblioteca lui de Candolle (ved. Dr. D. Brânză Prodrumul Florei României în Introducție nota 29 și în Adiție p. 526). *H. transsilvanica* Fuss verh. siebenb. ver. ann. 1850 p. 83 et auct. transs. (Consp. p. 27).—Păduri, pe munții Surul și Prislopul în Argeș ; Buceci pe Caraimanul (pl. indig. 1901) și la Sinaia pe Furnica ; pe dealuri la Câmpina și Poeana ; Valea Călugărească ; Comănești distr. Bacău (pl. indig. 1899).

**A. ranunculoides** L. spe. p. 762 (Consp. p. 26). — Adif. vulgar *Găinușe*. Govora în valea Hinței ; pădurea Dobrovățului distr. Vaslui.

**A. nemorosa** L. spe. p. 762 (Consp. p. 26). — Govora pe valea Hinței ; Cheea-Argeșului, Curtea-de-Argeș ; Iași la Răpedea (pl. indig. 1900) ; Piatra-Neamțu.

**A. silvestris** L. spe. p. 761 (Consp. p. 26). — Poeni, tuferișe. Pitești la Trivale (pl. indig. 1901) ; malurile Ialomiței pe la Speteni, Bărnești ; Panciu ; Căciulești ; Piatra-Neamțu ; Iași pe la pădurea Bărnova (pl. indig. 1900) ; Botoșani (pl. indig. 1899).

**A. narcissiflora** L. spe. p. 763 (Consp. p. 27). — Livezi, poeni, pe munții Surul și Prislopul în Argeș (pl. indig. 1899) ; Buceci pe Caraimanu și Costila (pl. indig. 1901) ; Parângu pe Miru-Mare.

β. *uniflora* Grec. consp. p. 27. *Homalocarpus uniflorus* Schur enum. transs. p. 3. Livezi, poeni alpine. Negoiu ; Buceci pe Caraimanu și spre Omu (pl. indig. 1899 și 1901).

**A. alpina** Jacq. fl. austr. vol. 1 tab. 85 (Consp. p. 27). — Adif. vulgar *Omeluțe*. Plaiul muntelui Cetățuia lui Ștefan-cel-Mare la Monăstirea Mera distr. Putna (pl. indig. 1900).

**A. Pulsatilla** L. spe. p. 759 (Consp. p. 28). — Adif. vulgar *Dediță*. Rediul-lui-Tătar distr. Iași (pl. indig. 1900) ; Constanța spre vii și pe la Laz-Mahalê.

**A. nigricans** Grec. consp. p. 28. *Pulsatilla nigricans* Stœrk (1771). — Comuna Voila în Prahova ; Dealu Șuțu în Râmnicu-Sărat (pl. indig. 1900) ; Onești distr. Bacău ; Piatra-Neamțu pe Cozla ; Botoșani pe la Vila-Boean, pe la Sulița și Drăcșani (pl. indig. 1899, 1900 și 1901) ; Brăila spre Ianca ; Constanța pe la Alacapù și Murfatlar.

Se va suprimă *Anemone pratensis* L. din Conspect, înlocuind-o cu *A. nigricans* în localitățile acolo enumerate. Adevărata specie occidentală linneană nu vine în părțile noastre.

**Adonis æstivalis** L. spe. p. 771 (Consp. p. 29). — Brănești, Paserea ; Urziceni, Speteni ; Brăila ; Constanța.

**A. flammea** Jacq. fl. austr. vol. 4 tab. 335 (Consp. p. 29). — Locuri

fertile nelucrate. Constanța pe la vii (pl. indig. 1899) și spre Murfatlar pe la Alacapù.

**A. vernalis** L. spe. p. 771 (Consp. p. 29).—Câmpuri sterile. Cotorca în Ialomița și pe la Hagieni ; Constanța spre Murfatlar.

**A. Walziana** Simk. năvenit. lapp. 2 p. 146 (Consp. p. 29).—Constanța pe câmpurile dela Murfatlar ; pădurea Strunga în Roman (pl. indig. 1899).

Planta noastră din Dobrogea credem că corespunde și cu cea din Bulgaria numită *A. vernalis* L. *β. bulgarica* Velen. fl. bulg. suppl. p. 3, ambele având petalele mici, înguste, lineare, sepalele înguste lanceolate ce abia ajung până pe la jumătatea petalelor, așa că, comparativ cu *A. vernalis* L. legitimul, *florile sale sunt cam pe jumătatea acestuia și laciniile foile mult mai lățite*, însă nu atât late, pe margini încise și cu indument păros pe desubt cum sunt la *A. wolgensis* Stev. ale cărui flori sunt tot pe atât de mici ca la specia noastră.

**Ceratocephalus orthoceras** DC. syst. 1 p. 231 (Consp. p. 30).—Adiț. vulgar *Cornuleț*. Stepele danubiane pe la Brăila ; Piatra-Neamțu ; Constanța spre vii și pe la Techirghiol.

**Myosurus minimus** L. spe. p. 407 (Consp. p. 30).—Buftea și pe la pădurea Andronache în Ilfov.

**Ranunculus trichophyllus** Chaix ap. Vill. pl. dauph. vol. 1 p. 355 (Consp. p. 30).—Immers, în ape limpezi stagnante sau lin fluente. Pe Prahova la pădurea Tinoasa ; pe Bistrița la Slăvinești distr. Neamțu (pl. indig. 1900 ; Vlădueni distr. Romanai (pl. indig. 1901) ; Brăila pe la Vădeni ; Măcin la Turcoaea.

\* *β. terrestris* Gren. Godr. fl. fr. vol. 1 p. 24 ex descriptione. Plantă neimmersă, pe locuri ude sau scurse, cu portul rigid și de talie scurtă, erectă, meritalele scurte, laciniile foilor scurte și mai cărnoase nu întocmesc pensulă. Pe Prahova la pădurea Tinoasa.

Adiție după *Ranunculus rutaefolius* (Consp. p. 30):

\* *3<sup>b</sup>. R. glacialis* L. spe. p. 777 ; Sturm deutsch. fl. fasc. 46 ; DC. prodr. vol. 1 p. 30 ; Koch syn. p. 14 ; Ledeb. fl. ross. vol. 1 p. 31 ; Rchb. icon. fl. germ. vol. 4 fig. 4584. — 4 Iunie, Iulie. Piscurile culminate pe muntele Suru în Argeș, pe lângă zăpadă veche (pl. indig. 1899 p. 1).

**R. alpestris** L. spe. p. 778 (Consp. p. 31).—Buceci la Omu (pl. indig. 1899 și 1901) ; Negoiu (an. 1907).

**R. crenatus** W. et Kit. pl. rar. hung. vol. 1 tab. 10 (Consp. p. 31).—Piscurile Negoifului în Argeș ; Parângu pe Mândra pe lângă zăpadă veche.

**R. platanifolius** L. mant. p. 79 (Consp. p. 31).—Livezi, poeni alpine. Parângu ; Negoiu pe Lespezi și pe Paltina în Argeș.

**R. illyricus** L. spe. p. 776 (Consp. p. 31).—Livezi, crânguri. Calafat, Alexandria (pl. indig. 1899); Panciu în Putna; Bârlad pe la grădina publică (pl. indig. 1901); Cernavodă, Constanța prin vii.

**R. oxyspermus** Willd. spe. pl. vol. 2 p. 1328 (Consp. p. 31).—Constanța pe la Anadolchioi.

**R. pedatus** W. et Kit. pl. rar. hung. vol. 2 tab. 108 (Consp. p. 31).—Locuri joase umede. Alexandria (pl. indig. p. 1899); Tecuci, Drăgănești; Bârlad pe la grădina publică și la Țugușata (pl. indig. 1901).

Adiție după *R. pedatus*:

\* 9<sup>b</sup>. **R. garganicus** Ten. fl. napol. vol. 4 p. 344 (1830); Arp. de Degen u. Ign. Dörfler beitr. zur flora alban. und macedon. p. 3. *R. millefoliatus* Rchb. icon. fl. germ. vol 4 fig. 4590 plantă Țe Croatia et Dalmatia; Velen. fl. bulg. p. 8 et exsicc. botanic. plur. Țe peninsula balcanica!—vix Vahl symb. bot. vol. 2 p. 63 tab. 27 (1794). *R. millefoliatus* var. *brevirostris* Boiss. fl. orient. vol. 1 p. 25 (1867). — 4 Aprilie. Mai. Locuri ierboase, Țărâm argilo-năsipos, pe malurile Dunărei la Calafat (pl. indig. an. 1899 p. 1).

Exemplarele de *R. millefoliatus* Vahl din Caccamo lângă Palermo (ved. Herb. Florei europ. al Facult. de medicină din București supt No. 120) nu se potrivesc pe deplin cu planta noastră exactă cu ceea din Țerile peninsulei balcanice ce poartă această numire din partea unor botaniști. Cea din Sicilia are laciniile foilor mai lungi și acute „*laciniis foliorum acutissimis superbit*“ zice Vahl. (ved. Nym. consp. p. 9 No. 17), deosebit de aceea că rostrul acheniei de formă falcată cu vârful ușor uncinat (cârligat) egalează aproximativ lungimea proprie a acheniei sale. Pe când exemplarele din Herzegovina, Bosnia, Bulgaria, date cu numele de *R. millefoliatus* Vahl, cele din Tracia cu numele de *R. millefoliatus* var. *brevirostris* Boiss. ca și cele din România aflate la Calafat, au laciniile foilor mai scurte și mai dilatate spre vârf, obtuse sau ușor acute; iar rostrul acheniei este scurt ca de  $\frac{1}{4}$  din lungimea acheniei sale și ușor răscurbat, întocmai ca figura dată de Reichenbach l. c. (Grec. pl. indig. an. 1899 p. 1).

**R. Thora** α. L. spec. p. 775 (Consp. p. 32).—Negoiu; Buceci pe Caraiman și la Obârșia-Ialomiței (pl. indig. anii 1899 și 1901).

**R. carpaticus** Herb. select. pl. galiz. p. 15 (Consp. p. 82).—Livezi, poeni alpine, subalpine. Negoiu pe muntele Lespezi; Buceci la Urătoarele și în valea Jepilor (pl. indig. 1900 și 1901), poalele Caraimanului; Ceahlău subț Piatra-Lată (pl. vasc. p. 18).

β. *pigmaus* Porciu fanerog. nasseud. p. 152 (Consp. p. 32).—Culmea Caraimanului (pl. indig. 1900); Ceahlău la Boambe.

**R. montanus** Willd. spe. pl. vol. 2 p. 1321 (Consp. 32).—Livezi,

poeni alpine. Parângu pe Mirul-Mare; Surul și Pristopul în Argeș (pl. indig. 1899); Negoii pe muntele Lespezi; culmea Caraimanului mai sus de 2.200 m. alt. (pl. indig. 1901); Ceahlău (pl. indig. 1900).

\* *var. suaneticus* Grec. pl. indig. an. 1899 p. 2. *R. suaneticus* Rupr. fl. cauc. p. 21 (1869); Velen. fl. Bulg. p. 9.—În culmea muntelui Suru, a rar.

•Valde et nimis affinis antecedente (*R. montano*) a quo tantummodo distinguitur: caule unifloro superne unica bractea instructo, caeterum aphylllo vel rarius omnino scaposo, aphyllum ebracteatum; foliorum limbo glabro praesertim in foliis infimis radicalibus...» Velen. l. c., ceea ce exact se potrivește cu exemplarele noastre. Totuși, din cele arătate, nu reese că această plantă merită titlul de specie proprie, alături de *R. montanus* Willd. (Grec. l. c.).

*R. Breyninus* Crantz stirp. austr. vol. 2 p. 115 tab. 4, fig. 2 (Consp. p. 32).—În regiunea alpină și subalpină pe stânci. Parângu pe Mirul-Mare și Găuri; Buceci în valea Jepilor și sus pe Caraimanu (pl. indig. 1901); Ceahlău la Piatra-Lată.

*R. aureus* Schleich. catal. pl. helvet. 1815 p. 24 (Consp. p. 33).—Livezi, poeni alpine, subalpine. Parângu pe Miru-Mare și Găuri; Negoii pe muntele Lespezi; Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901); pe Măgura-Odobești în Putna (pl. indig. 1900).

β. *parvulus*. — Regiunea alpină în munții Negoiului pe Clăbucetu pe la izvorul Cumpăniței și pe Lespezi.

*R. polyanthemos* L. spe. p. 779 (Consp. p. 33).—Livezi, poeni. Govora; Curtea-de-Argeș, pe Argeș în valea Budei și la stația Cumpăna; Dealu-Mare; Slănic pe muntele Pufu; Piatra-Neamțu; Dobrovățu în Vaslui; Măcin.

β. *latisectus* Borb. in litt. ann. 1881 ap. Grec. consp. p. 33. *R. polyanthemos var. latifissus* Simk. en. transs. p. 51 (1886).—București la Șosea; pădurea Țiganca plasa Mostiștea în Ilfov.

*R. repens* L. spe. p. 779 (Consp. p. 33). — Locuri joase, umede sau mlăștinoase, prin văi și vâlcele cu apsoare. Cerneț, Caracăl (pl. indig. 1899 și 1900); pe Lotru la Voineasa, Vidra; Govora pe valea Hinței; Curtea-de-Argeș; Predeal prin vâlcelele despre Schit; pe Prahova la Tinoasa; Bufta, Chitila (pl. indig. 1900): *forma vulgară*; — pe Argeș în Valea Caprci la stația Cumpăna: formă cu foarte lungi stoloni prostrați radicanți; plantă glabră, segmentele foilor petiolulate, însă mai mănunt incisodentate de cum la forma vulgară; — Cotorca în Ialomița: formă cu foile scurt păroase și palmat-tripartite, segmentele nepeiolulate, cuneate și către vârf ușor incis-dentate.

*R. lanuginosus* L. spe. p. 779 (Consp. p. 33). — În văile montane pe Petru-Vodă distr. Neamțu; Monăstirea Cociș în Dobrogea.

**R. aeris** L. spe. p. 779 (Consp. p. 33) rectè : **R. acer**. — Livezi, poeni montane, submontane. Valea Argeşului de la Corbeni până la Cumpăna; Câmpulung; Piatra-Neamţu pe Cozla şi pe la Schitu Țâbucani.

β. **alpinus** Heuff. enum. ban. p. 9 (Consp. p. 34). — Sânci pe înălţimile Bucecilor şi la Schitul-Ialomîţa (pl. indig. 1899).

γ. **multifidus** DC. prodr. vol. 1 p. 36 (Consp. p. 34). — Livezi, poeni. Schitul Predeal; Băneasa, Herestrău pe Colentina.

\* δ. **trilscetus**. — Tuferișe, la Curtea-de-Argeş, pe dealurile la Râpa-cu-Brazi.

Diferă de forma tipică a speciei prin foile radicale şi bazale trisectate, segmentele lung cuneate şi la extremitate nu profund incis-dentate, cu foarte uşor reflex sericeu pe pagina inferioară, ceea ce ar semui cu **R. Steveni**, însă tulpina sa radicală este boantă, verticală şi fibroasă.

**R. Steveni** Andr. in Bess. enum. volh. podol. bess. p. 22 (Consp. p. 34). Livezi, poeni montane. Predeal pe la Schit şi în valea Roşnovei (pl. indig. 1900); pe Prahova la Tinoasa; Schitul Durău şi Schitul Țâbucani în Neamţu.

**R. auricomus** L. spe. p. 775. Poeni alpine. Parângu pe Gruiu.

β. **pinguior** Rchb. icon. fl. germ. vol. 4 fig. 4590 (Consp. p. 34). — Livezi, poeni, păduri. Sinaia; pădurea la Strunga distr. Iaşi (pl. indig. 1900); pe Prahova la Tinoasa.

γ. **incisifolius** Rchb. l. c. (Consp. p. 34). — Păduri. Buceci pe la Sinaia; Iaşi şi Botoşani (pl. indig. 1899).

Adiţie după acesta :

\* 20<sup>b</sup>. **R. cassubicus** L. spe. p. 775; Sturm deutsch. fl. fasc. 81; DC. prodr. vol. 1 p. 34; Koch syn. p. 18; Rchb. fl. germ. vol. 4 fig. 4608; Schlechtd. Lang. deutsch fl. vol. 11 fig. 1044. — 4 Maiu. Iunie. — Păduri, locuri tinoase. Sinaia la Gura-Pădurei: specimene cu osebite caracteristice aduse de W. Knechtel (pl. indig. 1900); Bucureşti pe mlăştinile de sub cimitirul Bellu (Marcel Br.).

**R. Constantinopolitanus** D' Urv. enum. archipel. No. 476 (Consp. p. 35). — Şi de astă-dată adus tot din lunca Jiului lângă Craiova; pădurea Romula la Caracăl (pl. indig. 1900). — Plaută spectacabilă şi interesantă ca raritate pentru Flora noastră.

**R. bulbosus** L. spe. p. 779 (Consp. p. 35). — Locuri umede joase. Râmnic în Zăvoi (pl. indig. 1899); Vlădueni în Romanaţi (pl. indig. 1901); Brăila, Lacul-Sărat.

\* β. **incisus**. — Severin, Schela-Cladovei.

**R. Lingua** L. spe. p. 773 (Consp. p. 35). — Locuri joase, tinoase, în rovinele Cociocului spre Tâncăbeşti în Ilfov şi pe la Monăstirea Cernica (N. Jacobescu); pe Colentina la Fundeni-Mărcuţa.

**R. lateriflorus** DC. syst. vol. 2 p. 251 (Consp. p. 35). — Locuri mlăștinoase, rovine. Pe lângă București la Satu-Nou și la Buftea; plasa Snagov la pădurea Germănești-Bărboși.

**R. sceleratus** L. spec. p. 776 (Consp. p. 36). — Adiț. vulgar *Broschiță*. Lunca Jiului la Craiova; lunca Argeșului la Pitești; mlăștinile pârâului Cotorca la Cotorca în Ialomîța; Slănic pe albia Slănicului; pe Colentina la Fundeni-Mărcuța: *forma monstrosa* (1).

**R. polyphyllus** W. et Kit. pl. rar. hung. vol. 1 tab. 45 (Consp. p. 36). — Locuri joase umede turfoase. Buftea.

**Ficaria ranunculoides** Roth. fl. germ. vol. 1 p. 241 (Consp. p. 36). — Adiț. la sinonime: *R. Ficaria*  $\alpha$ . *divergens* Fr. Schultz arch. de flore ann. 1855 pe 122. — Vulg. adiț. *Sălăgea*. Govora pe valea Hinței; păduri pe dealuri la Câmpina; Tecuci la pădurea Cieru.

Adiție după aceasta:

\* 2. **F. calthæfolia** Rchb. fl. germ. excurs. p. 718 (1832); ej. icon. fl. germ. vol. 4 fig. 4571 et auct. plur. — non Gren. Godr. fl. fr. vol. 1 p. 39 (1848) cujus stirps ad. *F. grandifloram* Robert. catal. toul. p. 57 pertinet. *Ranunculus calthæfolius* Bluf. et Fing. comp. fl. germ. vol. 2 p. 295 (1825); Boiss fl. orient. vol. 1 p. 24. *R. Ficaria* var.  $\beta$ . Ledeb. fl. ross. vol. 1. p. 30. *R. Ficaria*  $\beta$ . *incumbens* F. Schultz arch. de flore ann. 1855 p. 120 et ann. 1864 observ. p. 332. *Ficaria nudicaulis* A. Kern. öst. bot. zeit. 1863 p. 188. *F. intermedia* et *F. transsilvanica* Schur enum. transs. p. 14 (1866). — Vulg. ca și precedentă. — Aprilie. Mai Locuri umede mlăștinoase mai ales prin păduri. Bârlad la pădurea Balaurului, Iași, Botoșani, Dorohoi (pl. indig. 1899, 1900 și 1901).

Diferă de precedentă: prin caulul său fără foi sau prea puțin foilat la bază, de aspect scapiform; prin foile sale rotund-ovale întregi sau foarte ușor crenate, dar profund cordate, lobii rotunzi și incumbenți, — nu îndepărtați sau divergenți; în fine, prin florile sale ceva mai măricele.

**Caltha palustris** L. spec. p. 784 (Consp. p. 37). — Adiț. vulgar *Bulbuci-de-baltă*. Locuri mlăștinoase, rovine și stufării: pe Prahova la pădurea Tinoasa; Buftea în rovinele Colentinei (pl. indig. 1901); Moinești pe pârâul Gâzu în Bacău (pl. indig. 1900); Măcin în bălțile dunărene.

După Simonkai, enum. transs. p. 54, specia de *Caltha* din părțile inferioare ale Transilvaniei, cum și cea iconografiată de Reichenbach în fl. germ. vol. 4 fig. 4712, nu cadrează exact cu specia lui Linné; de aceea poartă numirea de *C. cornuta* Schott analecta bot. p. 31 (1854), dar care abiă se deosebește de specia linneană ca o slabă varietate și

(1) Individe având câteva flori normale și fertile; însă, cele mai multe flori sunt abnorme: lipsite de stamine, iar carpcelele fiind sterile, constând din foliole deschise, plane, ușor pedicellate și lipsite de ovule.

neconstantă. A. Kerner menține însă numirea de *C. palustris* L. pentru specia din Ungaria și Transilvania (1).

*C. alpina* Schur verh. siebenb. ver. 1853 p. 30; ejus enum. transs. p. 25 (Consp. p. 37).—Parângu suind pe Gruiu; valea Argeșului la gura Budei; Nămăești; Buceci pe Caraiman (pl. indig. 1899, 1900); Predeal; Petru-Vodă.

Comparativ cu precedenta diferă: prin foleculii săi la maturitate coriaci, comprimați, oligospermi, abrupt terminați în stil scurticel erect, ventricos spre vârf, îngustați spre bază și coerenți, — iar nu având foleculii membranoși, înflați, polispermi, deflexi, atenuați în stil rescurbat a cornuleț, între ei separați și divergenți.

*Trollius europæus* L. spe. p. 782 (Consp. p. 37).—Livezi, poeni alpine, subalpine. La Negoiu pe Lespezi și Paltina; Predeal pe Susaiu; (pl. indig. 1900); Azuga, Bușteni (pl. indig. 1899); Biserici, Ceahlău (pl. indig. 1900); Piatra-Neamțu (pl. indig. 1901) și pe muntele Domesnicu distr. Neamțu.

β. *transsilvanicus* Schur enum. transs. p. 26 (Consp. p. 37).—Regiunea alpină în Buceci spre Omu (pl. indig. 1901).

Cu portul alpin, redusă în dimensiile părților sale, diferă prin staturile sale mult mai lungi de cum la forma specifică.

*Helleborus purpurascens* W. et Kit. pl. rar. hung. vol. 2 tab. 101 (Consp. p. 37).—Buceci în valea Cerbului (pl. indig. 1901); Moinești pe Mintianu în Bacău (pl. indig. 1899 și 1900); pădurile dealurilor mari la Panciu; Ceahlău pe la Schitul Durău.

*H. odoratus* W. et Kit. ap. Willd. enum. h. berol. vol. 1 p. 592 (Consp. p. 38). Adiț. sinon. *H. graveolens* Rchb. icon. fl. germ. vol. 4 fig. 4716 non Host.—Adiț. vulgar *Nipreală*. Craiova pe dealurile Bucovățului și la Govora (pl. indig. 1900).

*Isopyrum thalictroides* L. spe. p. 783 (Consp. p. 38). — Păduri, dumbrave. Govora; Curtea-de-Argeș pe dealurile Hodie; Otopeni în Ilfov; pe Prahova păd. Tinoasa; Panciu în Putna.

*Nigella arvensis* L. spe. p. 753 (Consp. p. 38). Adiț. vulgar *Bolbuc*. *Brus*. Câmpuri la locuri fertile. Halta Govora, Râmnic; Cotorca în Ialomița; Vaslui (pl. indig. 1900).

• *N. damascena* L. spe. p. 753 (Consp. p. 38). Adiț. vulgar *Barboierului*. *Chica-voinicului*. În horticultură.

*Aquilegia nigricans* Baumg. enum. transs. vol. 2 p. 104 (Consp. p. 38).—Locuri pietroase în văi montane umbroase. Buceci în valea Ia-

---

(1) A. Kerner Vegetationsverhältnisse des mittleren und östlichen Ungarns und angrenz. Siebenbürgens p. 19,



lomiței pe la Schit (pl. indig. 1899) și pe la poalele Caraimanului; asemenea și în Ceahlău (pl. indig. 1900).

**A. transsilvanica** Schur verh. sieben. ver. an. 1853 p. 31 (Consp. p. 39). — Adiție sinonimele: *A. paraplesia* Schur enum. transs. p. 28; *A. nigricans* var. *transsilvanica* Porciu diagn. faner. cript. p. 22. — În regiunea alpină, pe Negoiu și Paltina în Argeș.

Cu drept cuvânt, Porciu o consideră drept varietate de *A. nigricans* Baumg. de care diferă prin portul său alpin scundicel cu foile mai reduse, uni sau pauciflor, florile însă tot mari; apoi prin semințele sale la maturitate, de și negre, devin opace și nu lucioase, diferențe cu totul slabe și neconstante.

**Delphinium Consolidia** L. spe. p. 748 (Consp. p. 39). — Câmpuri, locuri fertile. Halta Govora, Râmnic; Curtea-de-Argeș, Albești; Cotorca în Ialomița; Agiud; Teghirghiol-Movilă.

β. *paniculatum* Grec. consp. p. 39. **D. paniculatum** Host. fl. austr. vol. 2 p. 65 (1831). Câmpuri inculte. Cotorca, Hagieni distr. Ialomița; Techirghiol-Movilă.

Adiție :

\* γ. *divaricatum* Rchb. icon. fl. germ. vol. 4 fig. 4669 b. (1840). **D. divaricatum** Ledeb. in Eichw. casp. p. 16 tab. 16 (1831); Ledeb. fl. ross. vol. 1 p. 59; Boiss. fl. orient. vol. 1 p. 81. — ☉ Iunie. Septembrie. Locuri aride inculte. Stepele Dobrogei, coastele de la Cerna-Vodă (Z. Panțu exsic!).

Diferă de var. β numai prin părositatea foleculilor sale.

**D. fissum** W. et Kit. pl. rar. hung. vol. 1 tab. 81 (Consp. p. 40). — Poeni, tuferișe. Brănești pe la pădurea Cernica, a rar.

**D. elatum** L. spe. p. 749: α. *intermedium* Grec. consp. p. 40. — Livezi subalpine. Sinaia (pl. indig. 1899); pe dealuri submontane la Curtea-de-Argeș în Valea-Calului.

**Aconitum Anthora** L. spe. p. 751 (Consp. p. 40). — Buceci la Omu (*A. Anthora* var. *alpinum* Grec. pl. indig. 1901 după Schur enum. transs. p. 30). — Buceci la Omu (pl. indig. 1901).

\* β. *velutinum* Rchb. icon. fl. germ. vol. 4 fig. 4711 β. *A. Anthora* b. *collinum* Schur. enum. transs. p. 30. Livezi în regiunea alpină, pe muntele Pristopol în Argeș și în Buceci pe stânci la Schitul-Ialomița (pl. indig. 1899).

**A. lasianthum** Simk. enum. transs. p. 61 (Consp. p. 40). — Livezi poeni montane subalpine. Voineasa; Bușteni pe muntele Zamura (pl. indig. 1901); Bicăz și spre gura Tarcăului (pl. indig. 1899).

β. *Baumgartianum* Simk. l. c. (Grec. consp. p. 41). La Negoiu pe Lespezi și Paltina; gura Tarcăului în Neamțu (pl. indig. 1899).

**A. moldavicum** Hacq. reisse die dacic. u. sarmat. p. 169 c. tabula !



(Consp. p. 41).—Adiție sinonimu *A. septentrionale* Baumg. enum. transs. vol. 2 p. 98 non Kœlle. — Tuferișe pe muntele Cozla la Piatra-Nearoțu; Bicaz (pl. indig. 1899).

*A. cernuum* Wulf. ap. Kœlle spicil. gen. aconit. p. 17 (Consp. p. 41). — Adiț. vulgar *Mărul-lupului*. Pe Lotru în valea Jidoaea; muntele Suru în Argeș (pl. indig. 1899); Bușteni prin tuferișe pe malurile Prahovei (pl. indig. 1901).

β. *toxicum* Grec. consp. 42. *A. toxicum* Rchb. icon. fl. germ. vol. 4 fig. 4688 plantă Ț Transsilvania. — Tuferișe. Bușteni (pl. indig. 1901); în Argeș pe muntele Suru (pl. indig. 1899).

*A. Napellus* L. spe. p. 751 (Consp. p. 42). Văi subalpine. Pe Lotru dela Brezoiu spre Voineasa în valea Voinășiței.

*A. tauricum* Wulf. ap. Rchb. monogr. gen. aconit. p. 87 tab. 12 fig. 2 et 3 (Consp. p. 42). — Regiune alpină, pe munții Closanilor, plaiul Micușei în Mehedinț (pl. indig. 1899); în Argeș pe Surul (pl. indig. 1899); Ceahlău.

*A. multifidum* Koch ap. Rchb. ill. spec. aconit. tab. 70 (Consp. p. 43). — Livezi, păscuni în regiunea alpină. Negoiu pe Lespezi și Paltina.

*A. Stœrkianum* Rchb. icon. fl. germ. vol. 4 fig. 4692 (Consp. p. 42). — Livezi, tuferișe, la poalele Ceahlăului (pl. indig. 1899); Piatra-Neamțu. — (Conf. Grec. pl. vasc. Ceahl. p. 20).

*Pæonia românica* Brânză mem. acad. române an. 1882 (Consp. p. 43). — Păduri în regiunea meridională a țerei. Bragadiru în Teleorman.

*P. tenuifolia* L. spe. p. 748 (Consp. p. 43). — Tot pe la Severin pe dealurile vecine (pl. indig. 1899); în Dobrogea pe la Greci (pl. indig. 1900).

Adiție :

\* 4. *P. triternata* Pallas nov. acta acad. imper. petropol. tom. X p. 312 (1797); DC. prodr. vol. 1 p. 65; Ledeb. fl. ross. vol. 1 p. 73. *P. corallina* β. *triternata* Boiss. fl. orient. vol. 1 p. 97. — 4 Mai, Iunie. Prin tuferișele stâncilor la Vârciorova pe muntele Ciocanu.

Cităm și înscrim aici, spre neuitare, această rară și interesantă specie pentru Flora țerei noastre, după Dr. Dim. Brânză (ved. Note postume în Analele Academiei române ser. II tom. XXV anul 1903).

*Actæa spicata* L. spe. p. 722 (Consp. p. 44). — Păduri montane și submontane. Pe Lotru în valea Jidoaei; Govora pe valea Hinței; pe Argeș în valea Caprei și în valea Budei aproape de stația Cumpăna, pe muntele Paltina; Buceci în valea Jepilor (pl. indig. 1901); Bicaz la poalele Ceahlăului (pl. indig. 1899).

## BERBERIDACEÆ Ach. Rich.

*Berberis vulgaris* L. spe. p. 471 (Consp. p. 44).—Coaste aride cu mărăciniș. Pe Ialomița la Speteni, Borănești ; Cernovoda în fund.

## PAPAVERACEÆ DC.

*Papaver pyrenaicum* Willd. enum. h. berol. p. 563 (Consp. p. 45).—Buceci la Omu (pl. indig. 1899 și 1901).

Adiție după acesta :

\* 1<sup>b</sup>. *P. hybridum* L. spec. p. 725 ; DC. prodr. vol. 1 p. 118 ; Koch syn. p. 31 ; Rchb. icon. fl. germ. vol. 3 fig. 4476 ; Boiss. fl. orient. vol. 1. p. 117 ; Schlechtd. et Langeth. deutsch. fl. vol. 13 fig. 1926. — ☉ Mai-Iulie. Câmpuri, la locuri fertile. Constanța pe la vii ; Tulcea spre comuna Malcoci

*Glaucium corniculatum* Curt. fl. lond. tab. 32 (Consp. p. 46).—Câmpuri, locuri fertile. Adjud ; Zorleni distr. Tutova și la Boldești distr. Vaslui (pl. indig. 1901) ; Măcin pe la Carcaliu ; Constanța, Techirghiol.

## CISTACEÆ Lindl.

*Helianthemum vulgare* Gaertn. fruct. vol. 1 p. 371 (Consp. p. 47).—Adiție vulgar *Mălăcel*. Livezi, poeni. Voineasa ; Govora ; Curtea-de Argeș ; Ceahlău (pl. indig. 1900).

*H. hirsutum* A. Kern. sched. fl. austro-hung. No. 882 (Consp. p. 47).—Livezi montane. Panciu în Putna ; Ceahlău ; Slănic.

*H. alpestre* Dun. ap. DC. prodr. 1 p. 276: *β. hirtum* Grec. consp. p. 48. *H. ælandicum β. hirtum* Koch syn. p. 86—sed. non *H. ælandicum* Wahlenb. *H. alpestre* Rchb. icon. fl. germ. vol. 3 fig. 4536—non Dun. (Consp. p. 48).—Stânci alpine, pe Negoiu (pl. indig. 1900 și excurs ann. 1907).

*H. rupifragum* A. Kern. œst. bot. zeit. 1868 p. 18 (Consp. p. 48).—Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901) ; Ceahlău la Panaghia (pl. vasc. p. 22).

În multă asemănare cu precedentul de care diferă prin foile sale lineare oblungi de 6 ori mai lungi de cât late (12—20 mm. lungime pe 2—3 mm. lățime), la vârf acute, glabre pe pagina inferioară, abia pe nervura mediană și pe margini cu peri înclinați spre vârf unde sunt și câțiva tufșori de peri, marginile foilor ușor reflexe. La precedentul foile sunt

mai scurte și abia de 4 ori mai lungi de cât late, plane, obovat-oblungi obtuze sau rotunjioare la vârf și cu stufigori de peri pe suprafață (*fasciculato-pilosæ*).

### TAMARISCACEÆ Lindl.

**Tamarix Pallasii** Desv. ann. de sc. natur. vol. 4 p. 349 (Consp. p. 48).—Prunțiș pe albia râurilor, zăvoiuri. Pe Ialomița pe la Urziceni ; albia Trotușului pe la Adjud ; Târgu-Neamțu ; Greci spre Iglița ; Techirghiol.

**Myricaria germanica** Desv. l. c. p. 391 (Consp. p. 49).—În lunca Argeșului la Albești spre Oești ; subț Ceahlău în lunca Bistriței.

### DROSERACEÆ DC.

**Drosera rotundifolia** L. spe. p. 501 ; Rchb. icon. fl. germ. vol. 3 ca rectificare, în loc de fig. 4622, să se citească fig. 4522 (Consp. p. 49).—Adiț. vulgar *Iarba-fearelor*.

**Parnassia palustris** L. spe. p. 391 (Consp. p. 49).—Regiunea montană subalpină pe lângă izvoare. În Parângu ; pe Surul (pl. indig. 1899), pe Lespezi la Negoiu și în Cheea-Argeșului ; Monăstirea Cheea în Prahova ; Slănic pe muntele Șandru.

Locul de drept al genului *Parnassia* intră în familia Saxifragaceelor, într'un trib chiar propriu al său, precum se urmează de autorii moderni, ceea ce am urmat astfel în lucrarea din urmă *Plante macedonice*. Totuși, recunoscând acest adevăr, menținem de astă dată pe *Parnassia* între Droseracee spre a nu strică șirul din Conspectul nostru.

Adiție între Droseracee :

\* 3. **ALDROVANDA** L. gen. 390.

\* 1. **A. vesiculosa** L. spe. p. 402 (ed. 1762) ; DC. prodr. vol. 1 p. 319 ; Ledeb. fl. ross. vol. 1 p. 262 ; Rchb. icon. fl. germ. vol. 3 fig. 4521 ; Neilr. diagn. p. 19 ; Brânză fl. dobro. p. 48.—? Iunie, Iulie. Plantă parte imersă, parte la suprafață pe ape limpezi stagnante sau în fluente. Bălțile dunărene la Malcoci aproape de Tulcea (pl. indig. an. 1900 p. 6).

### CRUCIFERÆ Juss.

**Chorispora tenella** DC. syst. vol. 2 p. 435 (Consp. p. 50).—Locuri fertile. Brănești ; Roman, în grădina publică (pl. indig. 1899) ; Constanța prin vii ; Măcin.

**Nasturtium officinale** R. Br. hort. kew. vol. 4 p. 110 (Consp. p. 50).—Adiție vulgar *Aișior*. Ape limpezi lin fluente. Pe cursul Colentinei la Fundeni Mărcuța.

**N. silvestre** R. Br. hort. kew. vol. 4 p. 110 (Consp. p. 51).—Drumuri, comune rurale și urbane, la locuri ierboase. Govora ; Curtea-de-Argeș; Predeal ; Slănic.

*var γ. Kernerii* Grec. consp. p. 51. **Roripa Kernerii** Menyh. în Kalocsa videk. növenit. 1877 p. 39 și 40.—Livezi. Predeal coastele despre Schit ; Slănic.

Adiție dupe *N. silvestre*:

\* **4<sup>b</sup>. N. prolifera** Heuff. in Flora an. 1853 part. 2<sup>o</sup> p. 624 ; ejus enum. ban. p. 16; Neilr. diagn. p. 10. — 4 Iunie. Iulie. La locuri joase umede, tinoase. Vaslui pe valea Bârladului (pl. indig. 1900 p. 6).

Intru nimic nu diferă de *N. silvestre* dacă nu și numai prin înfățișarea inflorescenței: florile la vârful ramurilor în raceme scurte și îndesate prin repețitele ramificări ale racemelor, ceea ce pare o *proliferație axilară*, prin urmare un fenomen teratologic.

**N. armoracoides** Tausch in Flora 1840 vol. 2. p. 707 (Consp. p. 52). — Locuri mlăștinoase. Dealu-Mare la Valea Călugărească; Brăila, Măcin în ostrovurile dunărene.

**N. austriacum** Crantz stirp. austr. vol. 1 p. 15 tab. 2 (Consp. p. 53).—Govora; Curtea-de-Argeș; Agiud, Slănic.

**N. pyrenaleum** R. Br. hort. kew. vol. 4 p. 110 ed. 1812 (Consp. p. 53).—Malurile Dunărei în Teleorman pe la Zimnicea și Bragadiru.

**Barbarea vulgaris** R. Br. l. c. p. 109 (Consp. p. 53).—Adiț. vulgar *Bărbușoară*. Severin pe dealurile vecine (pl. indig. 1899); Dobrovăț și Codăești în Vaslui.

**Turtitis glabra** L. spe. p. 930 (Consp. p. 53). — Livezi, poeni. Curtea-de-Argeș; pe Argeș la gura Budei; Slănic.

**Arabis alpina** L. spe. p. 298 (Consp. p. 54). — Poeni, vâlcele sub-alpine. Pe muntele Suru în Argeș (pl. indig. 1899); Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901); la Negoiu pe Paltina; Parângu pe Mirul-Mare.

Adiție:

\* *var. γ. nana* Baumg. enum. transs. vol. 2 p. 268 (1816). — Buceci pe piscurile Caraimanului (pl. indig. 1901 p. 3).

**A. hirsuta** Scop. fl. carn. p. 39 ed. 1772 (Consp. p. 54). Adiț. sinonimu *A. constricta* Griseb. spicil. rumel. vol. 1 p. 249. Livezi, poeni. Curtea-de-Argeș pe dealuri; Buceci în valea Jepilor (pl. indig. 1901).

β *Hornungiana* Grec. consp. p. 55. **A. Hornungiana** Schur enum. transs. p. 43 (1866). Adiț. sinonimu *A. hirsuta c. comosa* Borb. «arabis» în termés. 1878 p. 151.

**A. petrogena** Kern. œst. bot. zeit. 1863 p. 141 (Consp. p. 55). — Pe stânci în văi montane și umbroase. Pe Lotru la Voineasa, Vidra; Cheea-Argeșului pe la Cetatea Vlad Țepeș, în abundență, pe unde și forma *multijuga* Borb. sec. Porciu diagn. p. 20; Buceci în valea Jepilor și la Bicaz pe Piatra-Corbinei (pl. indig. 1900).

Observația din Conspect pusă la această specie să se corecteze astfel:

Se referă la tipul de *A. arenosa* Scop.; însă adevărata formă a speciei lui Scopoli, *cu florile mici și lilacine* cum este cea din Europa occidentală, nu se observă la aceea din părțile noastre ale cărei flori sunt *mai măricele, albe sau cam persicine*.

**A. Hallerii** L. spe. p. 929 (Consp. p. 55). — Buceci în valea Jepilor (pl. indig. 1901).

**A. ovlrensis** Wulf. ap. Jacq. collect. vol. 1 p. 196 (Consp. p. 56). — Stânci alpine. Parângu pe Găuri la Piatra-Tăiată; pe Năgoiu și Paltina; Buceci sus în valea Cerbului (pl. indig. 1901).

**A. Turrita** L. spe. p. 930 (Consp. p. 56). Buceci, pe stânci în valea Jepilor (pl. indig. 1901) și la Urlătoare.

**Cardamine hirsuta** L. spe. p. 915 (Consp. p. 56). — Livezi, poeni montane. Năgoiu pe la stâna Podeanului și pe Paltina; Bușteni (pl. indig. 1901); Slănic pe albia Slănicului; Ceahlău.

**C. impatiens** L. spe. p. 914 (Consp. p. 57). — La locuri umede tinnoase. Cheea-Argeșului pe la Cetatea Vlad Țepeș; Predeal în valea Roșnovei; Buceci în valea Jepilor (pl. indig. 1901).

**C. gelida** Schott œst. bot. zeit. 1855 p. 145 (Consp. p. 57). Stânci pe piscuri alpine. Parângu în suișul pe Găuri, frecuent; muntele Suru în Argeș (*C. resedifolia* var. *gelida* Grec. pl. indig. 1899 p. 3).

**C. rivularis** Schur verh. siebenb. ver 1853 p. 61 (Consp. p. 57). — Adiț. sinonimu *C. pratensis* var. *alpina* Andræ bot. zeit 1853 p. 414. Livezi montane. Surul în Argeș (pl. indig. 1899); Buceci în valea Peleșului (pl. indig. 1900).

**C. pratensis** L. spe. p. 915 (Consp. p. 57). — Livezi la locuri umede apătoase. Parângu în suișul pe Găuri; Caracăl; Alexandria pe la pădurea Nanov (pl. indig. 1900); Piatra-Neamțu (pl. indig. 1901).

β. *Hayneana* Welw. ap. Rchb. fl. germ. excurs. p. 676 (Consp. p. 57). — Predeal în valea Roșnovei (pl. indig. 1900).

**Dentaria glandulosa** W. et. Kit. pl. rar. hung. vol. 3 tab. 272 (Consp. p. 58). — Pe Argeș la poalele muntelui Glodu-Mare zăvoiuil Padina; Buceci în valea Jepilor (pl. indig. 1901); Bicaz pe Bîtca-Vacei (pl. indig. 1900) și pe la Biserici în Neamțu (pl. indig. 1901); Ceahlău.

**D. bulbifera** L. spe. p. 912 (Consp. p. 58). Adiț. vulgar: *Col-*

*țîșor*. În pădurea Căldărușani și la Paserea în Ilfov; în pădure la Dobrovăț și Codăești distr. Vaslui.

**Hesperis alpina** Schur verh. sieben. ver. 1853 p. 66 (Consp. p. 58).—Adiț. sinonimii *H. Kladni*, *H. glabra*, *H. moniliformis* Schur enum. transs. p. 51 și 52 (1866). Buceci pe Caraimanu sus (pl. indig. 1901).

**H. nivea** Baumg. enum. transs. vol. 2 p. 278 (Consp. p. 59).—Locuri umede pe lângă păriuri. Predeal în valea Roșnovei (pl. indig. 1900) și pe Prahovița la vale.

**H. matronalis** L. spe. 927 (Consp. p. 59).—Adiț. sinonimii *H. silvestris* Crantz stirp. austr. vol. 1 p. 32; *H. matronalis* β *silvestris* DC. prodr. vol. 1 p. 189; *H. inodora* L. l. c.; Jacq. fl. austr. tab. 347; *H. matronalis* var *integrifolia* Neilr. sec. A. Knapp pfl. galiz. u. bukow. p. 304.—Vulgur *Mirodea. Sibilog.*

Adiție :

\* β. *hortensis*. *H. matronalis* var. α. DC. prodr. vol. 1 p. 189.

În grădini de țară la Curtea-de-Argeș, frecventă, sub numele de *Liliacele* și *Liliac-franțozesc*, numire rău dată, de oarece în celelalte părți din țară Liliac-Franțozesc este *Syringa sinensis* Willd.

**H. runcinata** W. et Kit. pl. rar. hung. vol. 2 tab. 200 (Consp. p. 59).

Această specie, comparativ cu precedenta, la care foile sunt ovato-lanceolate întregi, acuminate, dentate, caulul glabru sau cu peri ramoși scurticei, diferă doar prin foile sale ovato-lanceolate acuminate, neregulat incis-dentate sau runcinate spre bază, cele inferioare chiar lirate, caulul glabru sau cu peri simpli glanduliferi învestit: ambele cu silicele glabre.

Adiție :

\* β. *Steveniana*. **H. Steveniana** DC. syst. vol. 2 p. 452 (1821); ej. prodr. vol. 1 p. 189; Boiss fl. orient. vol. 1 p. 233. *H. matronalis* β *lusus* b. Ledeb. fl. ross. vol. 1. p. 172: *siliquis glanduloso-pilosis, foliis inferioribus runcinato-pennatifidæ*, ceea ce n'ar fi exact dupe alți autori. Dupe Aug. P. de Candolle silicele acestuia sunt hispide; dupe Boissier silicele sunt glabre sau hispidule; după A. Grisebach în Aug. Kanitz reliq. grisebachianæ an. 1882 p. 55 silicele tinere sunt hispidule—deosebiri slabe de a constitui din aceasta o specie proprie și totul se confundă cu *H. runcinata* W. et Kit. — Comana.

**Sisymbrium Columnæ** Jacq. fl. austr. vol. 4 tab. 323 (Consp. p. 60).—Regiunea stepelor, tărâm fertil. Hagieni, Țândărei în Ialomița; Constanța pe malurile despre vii (pl. indig. 1900).

Adiție după aceasta :

\* 3<sup>b</sup>. **S. Irlo** L. spe. p. 921; Jacq. fl. austr. tab. 322; DC. prodr. vol. 1 p. 192; Rchb. syn. p. 52; Ledeb. fl. ross. vol. 1 p. 179; Rchb.

icon. fl. germ. vol. 2 fig. 4408. — ☉ Mai-Iulie. Locuri fertile. Dealu-Mare la Valea Călugărească.

**S. paunicum** Jacq. collect. vol. 1 p. 70 (Consp. p. 60).—La locuri inculte. Constanța spre Murfatlar (pl. indig. 1900). rd

**S. strictissimum** L. spe. p. 922 (Consp. p. 60).—Poeni, văi umbroase montane. Slănic; Ceahlău pe la Schitul Durău.

**Arabidopsis Thaliana** Schur enum. transs. p. 55 (Consp. p. 60).—Câmpuri la locuri inculte. Hagieni, Țândărei în Ialomița; Petroiu distr. Brăila (pl. indig. 1901).

Adiție:

\* *var. simplex* Grec. pl. indig. 1901 p. 3.—Câmpuri, locuri aprice, Viziru distr. Brăila (pl. indig. l. c.); Cotoarca în Ialomița.

Cu portul micșior și subțirel, ca 8—9 cent. înălțime, caul simplu scapiform sau monofil, racema paucifloră.

**Erysimum Wittmanni** Zaw. enum. pl. galiz. et bukow. p. 194 (Consp. p. 61). — Pe muntele Suru în Argeș (*var. Czetzianum* Schur; Grec. pl. indig. 1899); Ceahlău (pl. indig. 1899) și pe muntele Petricica la Piatra-Neamțu.

**E. exaltatum** Andr. in Bess. enum. pl. volh. podol. bess. p. 71 et 83 n°. 1554 (Consp. p. 62).—Comana; Brănești, Paserea; Botoșani (pl. indig. 1899); Iași (pl. indig. 1901); Măcin distr. Tulcea (pl. indig. 1899).

**E. diffusum** Ehrh. Beitr. vol. 7 p. 157 (Consp. p. 63).—Brănești, Paserea; Iași pe la Copou și Tuzla distr. Constanța (pl. indig. 1900). v

**E. repandum** L. spe. p. 923 (Consp. p. 63).—Măcin spre Ghecet (pl. indig. 1899 și spre Greci; malurile Dunărei la Brăila.

**Syrenia cuspidata** Rchb. fl. germ. excurs. p. 688 (Consp. p. 63).—Bârlad pe Dealu-Mare (pl. indig. 1900).

**Conringia orientalis** Andr. ap. DC. prodr. vol. 1 p. 508 (Consp. p. 64).—Locuri fertile, tufărișe. Măcin calea spre Greci (pl. indig. 1900).

**Kernera saxatilis** Rchb. fl. germ. excurs. p. 669 (Consp. p. 64).—Buceci în valea Babelor la Urlătoare pe sus (pl. indig. 1900) și pe Caraimanu (pl. indig. 1901); la Negoiu pe Lespezi.

**Cochlearia Armoracia** L. spe. p. 904 (Consp. p. 65).—Curtea-de-Argeș, în locuri virane și păragini, frecventă; nu însă afară de oraș.

**Lunaria rediviva** L. spe. p. 911 (Consp. p. 65).—În munții Slănicului pe Șandru; Ceahlău, pe valea Isvoru-Alb în fund.

Subt. genul *Alyssum*, consp. p. 60 n° 2, în loc de *A. saxatile* L. să se zică:

2. **A. Arduini** Fritsch excurs. fl. æster. p. 253. *A. saxatile* Sturm deutsch. fl. fasc. 66; Koch syn. p. 63; Rchb. icon. fl. germ. vol. 2 fig. 4280; Schlechtd. et Langeth. deutsch. fl. vol. 14 fig. 1382; Grec. consp. p. 66

și plant vasc. ceahl. p. 21-non L.— 4 Mai-Iulie. Locuri tari sau pietroase, stânci montoane. Valea Jiului pe la Lainici, Păiuș; cheile Barnarului în Suceava; Ceahlău stâncile la Boambe; Iași pe dealul Miroslava.—Cel din Dobrogea de la Măcin se va exclude dintre acestea, trecându-se la cel următor căruia,

În loc de *A. subsinuatum* Borb. (Conspect p. 66 No. 3), să se zică:

3. *A. saxatile* L. spe. p. 980; Arp. de Degen in litt.; Halácsy consp. fl. græc. vol. 1 p. 90. *A. orientale* Ard. specim. alt. vol. 2 p. 32 tab. 15; Boiss. fl. orient. vol. 1 p. 266. *Aurinia orientalis* Griseb. spicil. rumel. vol. 1 p. 272. — 4 Mai. Iunie. Pe locuri pietroase, coastele munților la Vîrciorova (*A. saxatile* L. ex sententia clar. Arp. de Degen et exsic. ! *A. saxatile* b. *subsinuatum* Borb. «arabis s egyeb crucif.» în közlem. XV, 1877 p. 178; Grec., consp. p. 66); munții Dobrogei pe la Măcin, Greci.

*A. repens* Baumg. enum. transs. vol. 2 p. 237 (Consp. p. 67).—Adiț. vulgar *Cincșoară*. Regiune alpină. Parângu în suișul pe Găuri; pe Negoiu și Lespezi distr. Argeș; Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901); Ceahlău (pl. indig. an. 1900).

*A. argenteum* Vitm. summa pl. vol 4 p. 430 (Consp. p. 66).—Pe locuri pietroase, Vîrtejcoi pe dealul Șutu distr. Rîmnicu-Sărat (pl. indig. 1900); Constanța pe la Canara și în dunele despre Tuzla la Techirghiol.

Pentru *A. commutatum* (Consp. p. 67) să se rectifice sinonimii și localitățile indicate, cu excluderea celui de la Măcin și suprimarea lui *A. rostratum* Steveni, precum urmează:

8. *A. commutatum* Simk. bánsági s hunyad. utaz. în közlem XV, 1878 p. 525; Grec. consp. p. 67. *A. montanum* δ. *commutatum* Heuff. enum. pl. banat. p. 22 (1858). *A. rostratum* Rchb. icon. fl. germ. vol. 2 fig. 4272 (1838) et auct. hung. et transsilv. plur.-non Steven in mem. acad. imp. petersb. tom. III, 1810 p. 295 tab. 15. *A. transsilvanicum* Schur. enum. transs. p. 63 (1866).—⊙ s. ⊙ Mai. Iunie. La locuri aprice inculte, mărăciniș, drumuri. Vîrciorova, Severin; Craiova; Iași; Dudeasca în Ialomița; Constanța—și adăugând: Turnu-Măgurele pe malurile Oltului spre Segarcea; Băneasa și Comana în Vlașca; Galaț, Bărboși (*A. rostratum* Grec. consp. p. 67—non Stev).

9. *A. Wierzbichii* Heuff. in Flora ann. 1835 p. 242; ejus enum. pl. ban. p. 22; Rchb. icon. fl. germ. vol. 2 fig. 4272 b; Neilr. diagn. p. 13.—⊙ s. ⊙ Iunie. Iulie. Locuri pietroase pe munții de la Măcin (*A. rostratum* Grec. consp. p. 67 ex parte).

Numirea de *Alyssum minimum* (Consp. p. 68) a se rectifica astfel:

10. *A. desertorum* Stapf. denkschr. acad. viss. wien. 1886 p. 34; Halácsy consp. fl. græc. vol. 1 p. 97. *A. minimum* Willd. spe. pl. vol. 3 p. 464 et auct.; Grec. consp. p. 68-non L.—La localitățile menționate



în Conspect adiție: Cotorca în Ialomița; Brăila pe la comuna Viziru (*A. minimum* Grec. pl. indig. 1901).

*β. ramosissimum* Grec. consp. p. 68 (pro var. *A. minimi*).—Câmpuri. Caracăl (pl. indig. 1901); Brănești, Paserea.

*A. minutum* Schlcht. in herb. Willd. ex Stev. ap. DC. syst. vol. 2 p. 316 (Consp. p. 68).—Pe muntele Carol la Piatra-roșie lângă comuna Jijila aproape de Măcin,

*Draba aizoon* Wahlenb. fl. carpat. p. 193 (Consp. p. 70).—Stânci în regiunea montană alpină. Ceahlău. (pl. indig. 1899).

*Draba carinthiaca* Hoppe în Flora ann. 1823 part. 2<sup>o</sup> p. 34 (Consp. p. 71).—Stânci alpine, pe culmea muntelui Suru în Argeș (pl. indig. 1899) și la Negoiu pe Lespezi; Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901).

Adiție dupe *Draba nemoralis* (Consp. p. 71):

\* 6<sup>b</sup>. *D. muralis* L. spe. p. 643; Sturm deutsch. fl. fasc. 60; Koch syn. p. 70; Rchb. icon. fl. germ. vol. 2 fig. 4325. *D. nemorosa* All. fl. pedem. vol. 1 p. 244 (1785).—○Aprilie-Iunie. La locuri uscate sau pietroase, Comună Argetoaea în Dolj; Sinaia pe stânci la S-ta Ana,

Adiție dupe genul *Draba* (Consp. p. 71):

\* 21<sup>b</sup>. *SCHIEVERECKIA* Adrz. ap. DC. syst. vol. 2 p. 300.

\* 1. *Sch. podolica* DC. syst. vol. 2. p. 300 (1821); ejus prodr. vol. 1 p. 160; Deless. icon. vol. 2 tab. 36!; Ledeb. fl. ross. vol. 1 p. 136; Boiss. fl. orient. vol. 1 p. 291. *Alyssum podolicum* Bess. catal. hort. cremen. 1816 p. 8; A. Knapp pfl. galiz. u. bukow, p. 309 notele 189 și 190. *Draba uralensis* Willd. herb. sec. Ledeb. l. c. *D. podolica* Rupr. *D. Schievereckia* Janka crucif. silicul. in tetmesz. füzet. VII (1863) p. 109.—4. Iulie. August. Locuri pietroase sau aspre pe dealurile de la Stâncă la Ștefănești distr. Botoșani (*Sch. romanica* Procop. Procopov. pl. vasc. de la Stâncă ann. 1901 și exsic.!).

Rară și de însemnat interes sub raportul Florii noastre și al geografiei botanice europice.

*Camellina macrocarpa* Wierzb. ap. Heuff. enum. pl. ban. p. 24 (Consp. p. 72).—Dobrogea septentrională pe la Ciucarova, Babadag.

*Neslia paniculata* Desv. journ. ser. 2<sup>o</sup> p. 162 (Consp. p. 72).—Câmpuri la locuri fertile. Constanța pe la Bostănării și spre Murfatlar (pl. indig. 1900).

*Thlaspi perfoliatum* L. spe. p. 902 (Consp. p. 73).—Câmpuri la locuri fertile, arături. Comuna Petroiu distr. Brăila (pl. indig. 1900); Hagiieni, Țândărei în Ialomița.

*Th. affine* Schott ex Kotschy exsic. 1850 (Consp. p. 73).—Livezi. poeni alpine, subalpine. Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901).

*Th. dauleum* Heuff. enum. banat. p. 25 (Consp. p. 73).—Stânci alpine.—Parângu pe Mândra; Buceci, pe Caraimanu (pl. indig. 1901).

*Iberis saxatilis* L. sp. p. 905 (Consp. p. 73).—Stânci. Munții Pricopanului lângă Măcin.

• *I. semperflorens* L.—Adiț. vulgar : *Lilicele* în grădini la Cârtea-de-Argeș, *Limba-mărei* la București.

*Biscutella laevigata* L. mant. p. 225 (Consp. p. 74).—*a. glabra* Gaud. fl. helvet. vol. 1 p. 235.—Regiune alpină, subalpină. In Negoiu; Buceci, pe stânci la Urlătoare, în valea Jepilor și la Omu (pl. indig. 1899, 1900, 1901); Ceahlău (pl. indig. 1900).

*β. ambigua* Grec. consp. p. 74. *D. ambigua* DC. dissert. tab. 9. *B. hispida* Rchb. icon. fl. germ. vol. 2 fig. 4208. *B. laevigata s. hispidissima* Koch. syn. p. 77.—Stânci montane subalpine. Buceci în valea Ialomiței (pl. indig. 1899); Bicaz pe Piatra-Corbinei (pl. indig. 1900).

*Hutchinsia alpina* R. Br. in. hort. kew. ed. 2<sup>o</sup> vol. 4 p. 82 (Consp. p. 74).—Piscuri alpine. Culmea muntelui Suru (pl. indig. 1899).

*H. brevicaulis* Hoppe ap. Sturm deutsch. fl. fasc. 65 (Consp. p. 74).—Piscuri alpine. Pe Negoiu (pl. indig. an. 1899); Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1899 și 1901).

*Capsella Bursa-pastoris* Moench meth. p. 271 (Consp. p. 74).—Adiție vulgar : *Buriană de friguri*.

Adiție :

\* *var. δ. microcarpa*.—Câmpuri, pe la Burila-Mare în Mehedinț.

Exemplar matur, având siliculele aproape pe jumătate mici comparativ cu ale speciei comune: 0,0015 ca lungime, 0,002 de lățime la partea superioară: aceasta pentru siliculele sale cele mai mari, deplin dezvoltate; florile având sepale și petale, restul ca la forma comună.

Adiție după acesta :

\* *2. C. procumbens* Fries nov. fl. suec. mant. vol. 1 p. 14 (1832); Koch syn. p. 79; Rchb. icon. fl. germ. vol. 2 fig. 4221; Schlechtd. Langeth. deutsch. fl. vol. 15 fig. 1486. *Lepidium procumbens* L. spe. p. 898. *Hutchinsia procumbens* Desv. journ. vol. 3 p. 168; DC. prodr. vol. 1 p. 178. *Thlaspi procumbens* Wallr. sched. crit. p. 349. — ☉ Iunie. Iulie. Locuri umede sărate și cu iarbă mărunțică. Mamaia spre Gargalic distr. Constanța (Grec. pl. indig. 1900 p. 7).

*Æthionema saxatile* R. Br. in. Ait. hort. kew. vol. 4 p. 64 (Consp. p. 75). Adiț. sinonimu *Æ. banaticum* Janka in linnæa 1859 p. 558 (conf. Heuff. enum. banat. p. 26; Neilr. diagn. p. 17; Simk. bánsági s hunyad. akad. közlemén. XV köt. 1878 p. 529).

În genul *Lepidium*, la urmă, adiție :

\* *8<sup>b</sup>. L. sativum* L. spe. p. 899; DC. prodr. vol. 1 p. 204; Koch

syn. p. 77; Rchb. icon. fl. germ. vol. 2 fig. 4212; Boiss. fl. orient. vol. 1 p. 354.—Vulg. *Bruncuț. Caprilon, Cardamè*. În cultura de verdețuri,

*Isatis tinctoria* L. spe. p. 936 (Consp. p. 77).—Bârlad pe la cimitir (pl. indig. 1901); prin grădini rustice la Tulcea și Babadag.

*Diploxaxis tenuifolia* DC. prodr. vol. 1 p. 632 (Consp. p. 80).—Câmpuri, la locuri fertile. Constanța pe la Murfatlar (pl. indig. 1900); Tuzla.

*Raphanus Raphanistrum* L. spe. p. 935 (Consp. p. 80).—Locuri de cultură, țărâm fertil. București spre Chitila; Botoșani (pl. indig. 1900).

*Rapistrum perenne* Berg. phyt. icon. in Desv. journ. vol. 3 p. 160 (Consp. p. 80).—Câmpuri, la locuri inculte. Stepele Tutovei pe la Roșiești; Techirghiol-Movilă.

*Crambe maritima* L. spe. p. 937 (Consp. p. 81).—Năsipuri litorale în dunele mării la Techirghiol, copios.

### FUMARIACEÆ DC.

*Corydalis Marschalliana* Pers. syn. vol. 2 p. 269 (Consp. p. 81).—Păduri, dumbrave. Sinaia; Otopeni în Ilfov; pădurea Arionoaea la Dudeasca în Ialomița; pădurea Crângu lângă Buzău și pădurea Crângu lângă Focșani (pl. indig. 1900); Piatra-Neamțu.

*C. solida* Swartz in swed. botan. vol. 8 p. 531 (1819) et auctor. plur. *C. digitata*. Pers. syn. vol. 2 p. 269; Rchb. icon. fl. germ. vol. 3 fig. 4462 (Consp. p. 82).—Adiț. sinonimu *C. slivnensis* Velen. fl. bulg. p. 20 et exsic.!—Păduri, dumbrave. Bașcov în Dolj (*C. Slivnensis* Grec. pl. indig. 1899 p. 4); lunca Jiului la Craiova (pl. indig. 1899); pe Argeș zăvoiu la Padina în sus de Arefu, Curtea-de-Argeș dealurile Hodiei; Otopeni în Ilfov; pădurea Crângu la Focșani; Moinești la Măgura în Bacău (pl. indig. 1900); Piatra, Varatic și Oglinzi în Neamțu (pl. indig. 1901); Vaslui la Buda, Rafaila.

Adiție :

\* *β. bicalcara* Grec. consp. p. 82. *C. bicalcara* Velen. fl. bulg. p. 20 (1891): Pădurea Arionoaea la Dudeasca în Ialomița.

\* *γ. depauperata* Schur enum. transs. p. 37 (1866). *C. solida* var. *alpina parvula* Schur olim.—Buceci pe Caraimanu sus pe lângă zăpadă, în Mai spre Iunie (pl. indig. 1901), Sinaia pe la Sta Ana; pădurea Arionoaea la Dudeasca (în Martie).

*Fumaria officinalis* L. spe. p. 984 (Consp. p. 83).—Adiț. vulgar: *Curcodană. Iarbă-de-curcă. Săftiră*. Tuferișe pe muntele Pricopan lângă Măcin.

*F. mlerantha* Lagasca elench. hort. madrit. 1816 p. 21 (Consp. p. 83).—Crânguri, prin vii. Slobozia distr. Râmnicu-Sărat (pl. indig. 1901);

Panciu distr. Putna ; Iași pe la Copou (pl. indig. 1900) ; Constanța ; comuna Grivița distr. Tutova (pl. indig. 1901) ; Itești distr. Bacău ; Stația Râșiești, distr. Tutova.

De și numirea de *F. densiflora* dată de Candolle în 1813 este anterioară, totuși autorul în urmă, sub această numire a cufundat și alte specii în afinitate, precum afirmă Fr. Schultz în Archives de Flore ann. 1864 p. 335. De aceea, numirea dată de Lagasca este preferată fiind precisă. Între altele, este în multă afinitate cu *F. prehensilis* Kit. ce există la noi și de unii confundată cu aceasta, de ex. Gren. Godr. fl. fr. vol. 1 p. 68, Griseb. et Sch. iter hung. spe. n<sup>o</sup>. 97, Heuff. enum. banat. p. 15 (ved. Neilreich diagn. p. 8 : *F. rostellata* Knaff). Din parte-ne, n'am putut constata diferențe esențiale specifice între aceste două feluri, ci numai în portul lor : mezlociu, caul mai robust, mai rigid la *F. micrantha* ; caul cu mult mai lung, mai debil și mlădios la *F. prehensilis*.

## VIOLACEÆ Juss.

**V. hirta** L. spe. p. 1324 (Consp. p. 84).—Crânguri 'pe coaste. Câmpina ; Codăești, Dobrovăț distr. Vaslui.

**V. ambigua** W. et Kit. pl. rar. hung. vol. 2 tab. 190 (Consp. p. 84). Crânguri, pe dealul Suțu distr. Râmnicu-Sărat (pl. indig. 1900) ; Galaț pe la Filești ; Târgu-Neamțu (pl. indig. 1899) ; păd. Țugueata distr. Tutova (pl. indig. 1901).

**V. odorata** L. spe. p. 1324 (Consp. p. 85). Crânguri pe la pădurea Otopeni și Andronache în Ilfov ; pe la pădurea Târnăuca în Dorohoi (1901).

**β. glabrior** Stev. sec. Ledeb. (Consp. p. 85).—Pe la păduri, tuferișe. Severin pe dealurile vecine (pl. indig. 1899) ; Zimnicea ; Bârlad pe la pădurea Crângu și 'pe la pădurea Balaurului (pl. indig. 1900) ; Dobrovăț distr. Vaslui ; Iași pe la Valea-Adâncă (pl. indig. 1901) și pe la pădurea Buciumeni (*V. austriaca* Grec. pl. indig. 1900) ; pe Prahova păd. Tinoasa.

**V. alba** Bess. prim. fl. galiz. p. 171 (Consp. p. 85).—Crânguri, mărăcinișuri. Pe Prahova păd. Tinoasa ; Tecuci (pl. indig. 1901) ; Botoșani (pl. indig. 1899).

**V. silvestris** Lam. fl. fr. vol. 2 p. 680 (1778) ; Kit. ap. Schultz oest. flora 1814 vol. 1 p. 423 (Consp. p. 86).—Adiție sinonimu *V. neglecta* M. Bieb. fl. taur. canc. vol. 1 p. 172 (1808).—Pădure, la Podu-Bulgarului distr. Râmnicu-Sărat (pl. indig. 1901) ; Focșani pădurea la Crângu (pl. indig. 1900) ; Dobrovăț, Codăești distr. Vaslui.

**β. Riviniāna** Koch. syn. p. 91 (Consp. p. 86). Buceci în valea Jepilor (pl. indig. 1900 și 1901) ; Dealu-Mare.

**V. mirabilis** L. spe. 1326 (Consp. p. 86). — Pe Prahova pād. Ti-noasa; pād. Andronache în Ilfov plasa Mostiștea la Ștefănești; Dobrovăț, Codăești distr. Vaslui; Babadag, Niculițel, Taița.

**V. canina** L. spe. p. 1324 (Consp. p. 86). — Lângă Rîmnicu-Sărat în pădurea S-tu Joan; Panciu pe dealuri; Vaslui la pădurea Paiu.

β. *montana* Fries. novit. fl. suec. ed. 2<sup>o</sup> p. 273 (Consp. p. 86). — Crânguri, tuferișe. Pitești la Trivale și Oglinzi în distr. Neamțu (pl. indig. 1901); dealurile de la Busnea distr. Iași (pl. indig. 1900); în Putna pe la Trotușani.

**V. pumila** Chaix ap. Vill. pl. dauph. vol. 2 p. 666 (Consp. p. 87). În Ilfov la pădurea Andronache comuna Ștefănești.

**V. elatior** Fries novit. fl. suec. p. 277 (Consp. p. 87). Prin livezi, tuferișe. Buda, Băicoi în Prahova (pl. indig. 1899); pădurea Teișu lângă Roman (pl. indig. 1900).

**V. danubialis** Borb. in 'magyar. növenit. lapp. 1890 p. 79; Grec. consp. p. 87. *V. elatior var. latifolia* Vandas ap. Velen. fl. bulg. p. 52 (1891). *V. Vandasii* Velen. suppl. fl. bulg. p. 641 (1891). — Crânguri, tuferișe. Severin pe la Crihala și Breșnița (pl. indig. 1899); pe lângă Craiova la Mofleni (pl. indig. 1901); pădurea Dascălu-Creața în Ilfov pl. Mostiște; Babadag, Niculițel, Taița.

**V. biflora** L. spe. p. 1326 (Consp. p. 87). — Stânci, văi montane alpine, subalpine. Parângu pe Gruiu (cu *Caltha alpina*); în Argeș pe Surul și Prislopul (pl. indig. 1899) și în valea Caprei; Ceahlău (pl. indig. 1900).

**V. alpina** Jacq. fl. austr. vol. 3 p. 24 tab. 242 (Consp. p. 87). Regiunea alpină. Parângu pe Mirul-Mare; pe Surul și Prislopul (pl. indig. 1899, pe muntele Lespezi și pe Paltina în Argeș; Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901).

**V. declinata** W. et Kit pl. rar. hung. vol. 3 tab. 233 (Consp. p. 88). — Livezi alpine, subalpine. Parângu pe Mirul-Mare; pe Surul și Prislopul (pl. indig. 1899), pe Lespezi și Paltina sub Negoiu; Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901); în munții Slănicului pe Șandru; Predeal, în livezile de la Schit (*forma elata*).

β. *Knechteli* Grec. consp. p. 88. — Stânci, livezi alpine, pe muntele Lespezi sub Negoiu.

**V. saxatilis** Schmidt fl. bohem. p. 257 (Consp. p. 88). — Locuri pietroase, livezi subalpine. Pe Argeș la stația Cumpăna și în Cheea Argeșului pe stânci; Buceci în valea Ialomiței la Schit (pl. indig. 1901); munții Slănicului; la Botoșani pe dealuri (pl. indig. 1899); — *b. alpestris* Grec. consp. p. 89. — Livezi subalpine, rupturi de coaste, pietriș. Pe Argeș la Cumpăna și pe muntele Lespezi; Predeal în livezile de la Schit, valea Roșnovei (*forma procera*); Bușteni; Slănic.

**V. tricolor** L. spe. p. 1326 (Consp. p. 89): — *α. vulgaris* s. *genuina*. Adiție: vulgar *Ghisd*. — Tuferișe, în valea Bahnei lângă Vărciorova; Bicaz; Botoșani, Agaŝton (pl. indig. 1900).

**V. arvensis** Murr. prodr. fl. goetting. p. 73 (Consp. p. 89). Livezi. Govora; Curtea-de-Argeș; Bărlad la Crâng; Comana (*forma elata*).

β *pygmæa* Lindem. fl. cherson. vol. 1 p. 71 (Consp. p. 89). — Locuri aspre inculte. București pe dealul Filaretului (pl. indig. 1901).

## RESEDACEÆ DC.

**Reseda lutea** L. spe. p. 645 (Consp. p. 90). — Adiție: vulgar *Răchie*. *Răchiege*. — Govora; Curtea-de-Argeș pe dealurile orașului; stepele Ialomiței la Hagieni, Tândărei; Murfatlar pe coaste (pl. indig. 1900).

β *ramosissima* Grec. consp. p. 90. — Regiunea stepelor. În Ialomița la Cotorca; Constanța, Techirghiol, frecuent.

**R. inodora** Rchb. icon. fl. germ. vol. 2 fig. 4445 (Consp. p. 90). — Locuri pietroase, pe coastele de la Murfatlar (pl. indig. 1900); Măcin, Satu-Nou, Cerna.

**R. luteola** L. spe. p. 643 (Consp. p. 90). — Adiție: vulgar *Gaude*, Curtea-de-Argeș în oraș pe malurile despre gară.

## POLYGALACEÆ Lindl.

**Polygala major** Jacq. fl. austr. vol. 5 tab. 413 (Consp. p. 91). — Livezi, crânguri la locuri deschise. În Teleorman pe la Bragadiru; Câmpulung; Focșani la pădurea Crângu (pl. indig. 1900); Constanța pe la Canara.

**P. comosa** Schkuhr handb. vol. 2 tab. 296 (Consp. p. 91). — Livezi, crânguri. Severin; Comana; Bărnova distr. Iași (pl. indig. 1900); Sinaia la vale de Isvoru (pl. indig. 1899); Dealu-Mare, Valea Călugărească.

**P. vulgaris** L. spe. p. 986 (Consp. p. 91). — Păsciuni montane alpine și subalpine. La Negoiu pe Lespezi și Paltina; Curtea-de-Argeș pe dealurile Chiriceștilor; Bicaz pe Băta-Vacei (pl. indig. 1900); Buceci în valea Jepilor (pl. indig. 1901).

β. *densiflora* Tausch pl. select. (Consp. p. 92). Livezi subalpine. Predeal; Slănic pe muntele Pufu.

γ. *pseudoalpestris* Godr. fl. jouras. (Consp. p. 92). Livezi subalpine. Predeal sus pe la Schit. (pl. indig. 1900).

**P. amarella** Crantz stirp. austr. ed. 2<sup>o</sup> fasc. 5 p. 438 (Consp. p. 92). — Regiune alpină, subalpină. Buceci pe stânci la Urlătoare (pl.

indig. 1900), sus pe Caraimanu și pe valea Cerbului (pl. indig. 1901); munții Slănicului pe Șandru (pl. indig. 1899).

**P. austriaca** Crantz stirp. austr. ed. 2<sup>o</sup> fasc. 5 p. 439 (Consp. p. 93). Stânci alpine, pe Ceahlău sub Piatra-Lată (pl. indig. 1900).

Asemănările între aceste din urmă două specii sunt în multă legătură și puținele deosebiri constau în flori și în portul caulinar: florile mediocre, având sepalele-aripe ca de 5—7 mm. lungime, caulul simplu, neramificat la *P. amarella* Cr.; florile micuțele, având sepalele-aripe de 3—5 mm. lungime, caulul ramificat la *P. austriaca* Cr. (conf. A. Kern. sched. fl. austro-hung. fasc. 2 n<sup>o</sup> 512 et. 513).

Adiție, după fam. *Polygalaceæ* (Consp. p. 93):

\* XII<sup>b</sup>. FRANKENIACEÆ St. Hil. mém. plac. p. 39.

\* 1<sup>o</sup> FRANKENIA L. gen. n<sup>o</sup> 445.

\* 1. **Fr. pulverulenta** L. spe. p. 474; DC. prodr. vol. 1 p. 349; Ledeb. fl. ross. vol. 1 p. 267; Boiss. fl. orient. vol. 1 p. 779; Gren. Godr. fl. fr. vol. 1 p. 200; Halácsy consp. fl. græc. vol. 1 p. 149. — ☉ Iulie. August. Năsipuri maritime. Capul Midia la Constanța (pl. indig. 1900).

Prima sa aflare în Dobrogea se datorează fraților Sintenis.

## DIANTHACEÆ Ach. Rich.

**Dianthus superbus** L. fl. suec. p. 146 (Consp. p. 93) — Adiție : vulgar *Iperige* (în Transs.). — Livezi montane. Bușteni pe muntele Zamura (pl. indig. 1901); munții Slănicului pe Pufu și Șandru; Bicăz (pl. indig. 1899) și la Buhalnița pe Chica-Baiului (pl. indig. 1900 și 1901).

**D. spiculifolius** Schur enum. transs. p. 98 (Consp. p. 94). Adiție : vulgar *Barba-ungurului* (în Transs.). — Pe muntele Surul (pl. indig. 1899) și pe Negoiu în Argeș; Buceci în valea Cerbului sus (pl. indig. 1901).

Numirea de *D. petræus* W. et Kit. (Consp. p. 94) să se rectifice astfel:

4. **D. integripetalus** Schur enum. transs. p. 98 (1866); Simk. enum. transs. p. 121. *D. petræus* W. et Kit. pl. rar. hung. vol. 3 tab. 222 (1812)-non. M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 1 p. 328 (1808). *D. Kitaibelii* Janka sec. Pancici nov. elem. ad. fl. princip bulg. p. 18 (1886). — Buceci, pe stânci în valea Cerbului sus spre Omu (pl. indig. 1901) și Caraimanu.

**D. glacialis** Hænke ap. Jacq. collect. vol. 2. p. 84 (Consp. p. 94). — Regiunea alpină. Parângu; Surul; Negoiu; Buceci la Omu (pl. indig. 1899), încă și pe pisurile Caraimanului (pl. indig. 1901 și Marcel Br. exsic. an. 1906 !)

**D. Henterei** Hentff. ap. Griseb et Sch. iter hung. p. 303; Porciu diagn. p. 40 (Consp. p. 95).—Stânci în Cheea-Argeşului; valea Jiului la Păiuş şi Lainici.

**D. deltoides** L. spe. p. 586 (Consp. p. 95).—Galaş pe coastele de la Bărboşi (pl. indig. 1900).

**D. guttatus** M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 1 p. 328 şi vol. 3 p. 300 (Consp. p. 95).—Craiova pe la pădurea Palelula (pl. indig. 1899); Bârlad pe la pădurea Crângu (pl. indig. 1901); Burdujeni, Dorohoi (pl. indig. 1899); Dobrogea în cuprinsul Greci, Cerna, Cârjelari.

Adiţie dupe acesta :

\* **11<sup>b</sup>. D. pratensis** M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 1 p. 324 (1808) şi vol. 3 p. 298 (1819); DC. prodr. vol. 1 p. 358. *D. Segueri* var. *γ*. Ledeb., fl. ross. vol. 1 p. 277 ex parte.—4 Iulie. August. Locuri aride sau pietroase. Constanţa la Alacapû prin Valul-Traian, pe la Palazu şi Horoslar (Grec. pl. indig. 1900 p. 10).

**D. glabriusculus** Kit. in linnæa vol. 32 (1862) p. 528. (Consp. p. 95).—Livezi submontane, la Tarcău distr. Neamţu pl. indig. 1899; pădurea Rediu distr. Botoşani (pl. indig. 1900).

**D. transsilvanicus** Schur enum. transs. p. 95 (Consp. p. 96).—Crânguri, mărăciniş. Brăneşti spre pădurea Pustnicu.

**D. compactus** Kit. ap. Schult. æst. fl. ed. 1814 vol. 1 p. 654 (Consp. p. 96).—Pe muntele Prislopu în Argeş (pl. indig. 1899) şi pe Paltina; Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901); Bicaz pe plaiurile Sima (pl. indig. 1899).

**D. pseudobarbatus** Bess. ap. Rchb. fl. germ. excurs. p. 805 (Consp. p. 97).—Livezi, locuri aprice. Dealu-Mare la Valea Călugrească; Bacău la Isovoare, Botoşani şi Dobrogea pe la Măcin (pl. indig. 1899); stepele Ialomiţei pe la Cotorca; Adjud.

Adiţie, dupe acesta (Consp. p. 97):

\* **16<sup>b</sup>. D. polymorphus** M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 1 p. 324 (1808) şi vol. 3 p. 298 (1819); DC. prodr. vol. 1 p. 356 exclus. var. *β*; Ledeb. fl. ross. vol. 1 p. 276 exclus. var. *β*; Rchb. icon. fl. germ. vol. 6 fig. 5017 b; Boiss. fl. orient. vol. 1 p. 511; Velen. fl. bulg. suppl. 1 p. 50.—4 Iunie. Iulie. Stepele Dobrogei la Constanţa spre Palazu (pl. indig. 1900 p. 10).

**D. Carthusianorum** L. spe. p. 586 (Consp. p. 97): *α. saxigenus* Schur enum. transs. p. 93 (1865). *D. Carthusianorum* L. *α. pratensis* Neilr. diagn. p. 21 (= *D. Carthusianorum* L. sec. Sturm deutsch. fl. fasc. 27 şi Rchb. icon. fl. germ. vol. 6 fig. 5019 e). *D. marisensis* var. *lævigatus* Simk. enum. transs. p. 118. *D. puberulus* var. *lævigatus* Porc. diagn. p. 39 (Grec. consp. p. 97 şi în pl. vasc. ceahl. p. 24). — Adiţie: vulgar *Caramfile* (Mehed.)—Livezi montane. Păiuş, Lainici; Pre-



deal; Buceci în valea Albă și în valea Cerbului (pl. indig. 1901); Schitul Tarcău (Marc. Br.) și la Schitul Durău (Grinț. exsic!)

*β. reflexus* Neilr. diagn. p. 21 (Consp. p. 97).—Livezi. Govora; Chițila, București pe la Șosea; Comana; Slănic.

*γ. puberulus* Simk. közlem. XV<sub>1</sub>(1878) p. 531 et exsic! (Consp. p. 97).—Căldărușani în Ilfov (pl. indig. 1901); Curtea-de-Argeș în livezile de la Valea Calului; Pitești la Trivale.

**D. tenuifolius** Schur. œst. bot. zeit. 1858 p. 22 (Consp. p. 97).—Livezi, stânci, în regiunea alpină. Pe muntele Lespezi la Negoiu; Buceci pe Caraimanu și în valea Cerbului (pl. indig. 1901); Ceahlău (pl. indig. 1900).

Numirea de *D. sabuletorum* Heuff. (Consp. p. 98 n<sup>o</sup>. 19) se va rectifica astfel :

**19 D. giganteiformis** Borb. in magyar. tudo. akad. közlem. 1875 p. 75. Sinonimi: *D. sabuletorum* Heuff. enum. ban. p. 32. (1858); A. Kern. in sched. ad fl. austro-hung. fasc. 2 p. 67; Grec. consp. p. 98-non Willk. (1852) nec alior. *D. diutinus* Rchb. icon. fl. germ. vol. 6 fig. 5017 (1844)-non Kit. in Schult. oest. fl. ed. 1814. *D. Carthusianorum γ. arenarius* Neilr. diagn. p. 21 etc.—Livezi, locuri nășipoase în regiunea câmpiană. Calafat, Cetate (pl. indig. 1899); Caracăl, Preajba (pl. indig. 1900); Bragadiru în Teleorman; Comana; Ivești distr. Tecuci.

**D. capitatus** DC. catal. hort. monsp. 1813 p. 103 (Consp. p. 99).—Livezi, tuferișe. Zimnicea, Bragadiru; Bârlad la pădurea Crângu (pl. indig. 1900); Greci pe dealuri.

Adiție dupe acesta:

\* **21<sup>b</sup>. D. Vandasii** Velen. fl. bulg. suppl. p. 47 (1898).—4 Iunie. Iulie. Livezi, la locuri deschise, comuna Dioști în Romanaț (Grec. pl. indig. 1900 p. 10).

Descrierea dată de autor în opera sa citată este destul de amănunțită, recomandând-o celor ce vor avea nevoie spre consultare.

**D. giganteus** D'Urv. enum. pl. archipel. p. 45 (Consp. p. 99).—Adiție sinonimu *D. biternatus* Schur enum. transs. p. 94 (1866).—Locuri pietroase. În Parângu pe la poale; Râmnic (pl. indig. 1900); Cheea-Argeșului; Greci, Măcin.

**D. Pseudo-Grisebachii** Grec. consp. p. 100.—Locuri joase salifere Lunca Calmățuiului pe la Caragelele distr. Buzău.

**D. pallens** Sibth. et Sm. fl. græc. vol. 1 p. 286 (Consp. p. 101).—Câmpuri la locuri fertile. Stepele Ialomiței la Fetești, Hagieni; Constanța (pl. indig. 1900); Techirghiol-Movilă.

**Gypsophila muralis** L. spe. p. 583 (Consp. p. 102).—Câmpuri, arături, miriști. Govora; Curtea-de-Argeș până în Corbeni; Pitești; Brăila; Măcin, Greci, Babadag; Constanța, Techirghiol.

**G. paniculata** L. spe. p. 583 (Consp. p. 102).—Câmpii, în stepele Ialomiței pe la Hagieni, Țândărei.

**G. transilvanica** Spreng. neue endeck. 1 p. 300 (Consp. p. 103). Stânci, în regiunea alpină. Negoiu (pl. indig. 1900) și pe Lespezi; Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901); în culmea Ceahlăului (pl. indig. 1899).

**Saponaria officinalis** L. spe. p. 584 (Consp. p. 103). Adiție: vulgar *Floarea-călugărului*. Govora; Curtea-de-Argeș.

**Cucubalus baccifer** L. spe. p. 591 (Consp. p. 103).—Tuferișe, crânguri, garduri de mărăcini. Pădurea Arionoaea la Dudeasca în Ialomița; Slănic.

**Heliosperma quadrifidum** Rchb. rept. herb. p. 206 (Consp. p. 104).—Stânci în văi alpine, subalpine. Parângu pe Mirul-Mare; Negoiu pe Lespezi, în valea Caprei, pe Buda și în Cheea-Argeșului; Buceci pe Caraimanu și în valea Cerbului sus (pl. indigene 1901); în Ceahlău (*H. alpestris* Grec. pl. indig. 1900 p. 12-non Jacq.—sed in herbario sub nom. *H. quadrifidum* Rchb. positum).

**Silene Otites** Sm. fl. brit. vol. p. 496 (Consp. p. 104. — Stepele Ialomiței pe la Hagieni, Țândărei.

**β. macrophylla** Otth ap. DC. prodr. vol. 1 p. 369 (Consp. p. 104).—Crânguri, margini de păduri. Iași pe dealuri (pl. indig. 1901).

**S. densiflora** D'Urv. enum. pl. archipel. p. 47 (Consp. p. 105).—Locuri aspre. Constanța pe malul mării spre vii (pl. indig. 1900), Techirghiol-Movilă.

**S. acaulis** L. spe. p. 603 (Consp. p. 105).—Regiunea alpină, pe Parângu în Gorjiu; pe Surul și Negoii în Argeș (pl. indig. 1899); Buceci pe Caraimanu și la Omu (pl. indig. 1899 și 1901); Ceahlău (pl. indig. 1900).

**S. dnuarica** Spreng. syst. veg. vol. 2 p. 405 (Consp. p. 105).—Regiunea alpină, pe muntele Paltina lângă Negoii în Argeș.

**S. venosa** Gilib. fl. lithuan. vol. 5 p. 165 (Consp. p. 106).—Livezi, locuri deschise. Govora; Curtea-de-Argeș; Azuga, Bușteni (pl. indig. 1901); Zimnicea, Bragadiru; București la Șosea; Bicaz, Piatra-Neamțu (pl. indig. 1900).

**β. Antelopum** Grec. consp. p. 106. **Cucubalus Antelopum** Vest ap. Rchb.—În regiunea montana subalpină. În Parângu pe Mirul-Mare; pe Lespezi și Paltina sub Negoii, valea Budei și pe Arefu în Argeș; Predeal; Buceci la Urlătoare și pe Caraiman (pl. indig. 1901).

**γ. oleracea** Fic. ap. Rchb. (Consp. p. 106).—Locuri pietroase sau aspre. Govora; în Argeș pe Arefu pe sus; Bufta, Chitila (pl. indig. 1901); Constanța la Murfatlar pe coaste (pl. indig. 1900).

**S. Zawadzki** Herb. in Zawad. fl. galiz. et bukow. p. 191 (Consp. p. 106). Regiunea alpină, pe stânci. Rarău pe Piatra-Zimbrului și pe Pietrile-Doainnei; Ceahlău (pl. indig. 1900).

**S. nemoralis** W. et Kit. pl. rar. hung. vol. 3 tab. 249 (Consp. p. 108).—Tuferișe și păduri montane. Buceci la Urlătoarele (pl. indig. 1900); Predeal; Oteștii-de-Sus distr. Oltu; Govora pe măgura Mătușea-Floarea; Curtea-de-Argeș pe dealurile Hodiei; pe muntele Secu-Buhalniței subț Ceahlău.

**S. viridiflora** L. spe. p. 597 (Consp. p. 108).—Tuferișe. Brănești, Paserea.

**S. livida** Willd. enum. hort. berol. p. 474 (Consp. p. 108).—Livezi, locuri cu iarbă. Slănic pe muntele Pufu.

**S. nutans** L. spe. p. 596 (Consp. p. 109).—Livezi în regiunea montană și submontană. Pe Lotru la Voineasa valea Voinășiei; Dealu-Mare la Valea Călugărească; Bicaz (pl. indig. 1900); Piatra-Neamțu pe Cozla și Pietricica.

**β. transsilvanica** Grec. consp. p. 109. **S. transsilvanica** Schur œster. bot. zeit. an. 1858 p. 22 et p. 286.—Stânci montane subalpine și aproape alpine. Pe Lotru sus la Vidra pe Pleșiu-Tâmpei; pe Argeș la Cumpăna în valea Caprei, valea Budei, Cheea-Argeșului și Curtea-de-Argeș pe dealurile Hodiei; munții Negoilului pe Lespezi și Paltina; Bușteni pe muntele Zamura (pl. indig. 1901); Slănic pe muntele Șandru; Ceahlău.

Numirea de *Silene spergulfifolia* M. Bieb. (Consp. p. 109) se va înlocui cu cea următoare:

**13. S. supina** M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 1 p. 338 (1808); DC. prodr. vol. 1 p. 381; Ledeb. fl. ross. vol. p. 322; Lindem. fl. cherson. vol. 1 p. 89; Boiss. fl. orient. vol. 1 p. 614. **S. spergulfifolia** Rchb. icon. fl. germ. vol. 6 fig. 5101 «plantă ă Transilvania ad Talmaci, Boitza lecta», Grec. consp. p. 109-non M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 3 p. 305 (1819).—4 Iunie. Iulie. Locuri montane pietroase cu tuferișe. Vârciorova spre Gura-Văei; munții Măcinului spre Greci (pl. indig. 1900).

**S. longiflora** Ehrh. Beitr. vol. 7 p. 144 (Consp. p. 110).—Câmpuri, la locuri aprice. Stepele Ialomiței pe la Cotorca, Fetești, Hagieni; pe coaste la Cosmești distr. Tecuci (pl. indig. 1900) și pe la Oltenesti distr. Fălciu; Bârlad pe Dealu-Mare și la stația Roșești.

**S. viscosa** Pers. syn. vol. 1 p. 497 (Consp. p. 111).—Câmpuri goale, în stepele Ialomiței pe la Țândărei, Hagieni.

**S. chlorantha** Ehrh. Beitr. vol. 7 p. 146 (Consp. p. 110).—Livezi, tuferișe. Pe la stația calei ferate Roșiești distr. Tutova.

**S. Lerchenfeldiana** Baumg. enum. transs. vol. 1 p. 398 (Consp. p. 110).—Stânci abrupte, crăpături de stânci în văi montane subalpine. Pe Lotru la Voineasa.

**S. viscosa** Pers. syn. vol. 1 p. 497 (Consp. p. 111).—Stepele Ialomiței la Hagieni, Țândărei.

*S. dichotoma* Ehrh. Beitr. vol. 7 p. 144 (Consp. p. 111). Câmpuri, liyezi, căi rurale. Govora ; Dudeasca, Cotorca în Ialomița.

*S. conica* L. spe. p. 598 (Consp. p. 112). — Câmpuri. Segarcea în Dolju.

*S. subconica* Priv. în Flora an. 1835 p. 334 (Consp. p. 112). — Locuri pietroase. Munții Pricopanului la Măcin și Greci prin crângurile de la poale (pl. indig. 1899).

*Melandrium pratense* Röhl deutsch. fl. p. 274 (Consp. p. 112). — Livezi. Govora ; Curtea-de-Argeș ; Dudeasca pe la pădurea Arionoaiei în Ialomița ; Constanța spre Alacapă (pl. indig. 1900).

*M. silvestre* Röhl deutsch. fl. p. 274 (Consp. p. 112). — Păduri montane. Slănic pe muntele Șandru ; gura Tarcăului (pl. indig. 1899).

*M. nemorale* Rchb. fl. germ. excurs. p. 824 (Consp. p. 113). — Păduri, văi montane subalpine umede umbroase. Parângu la poalele Mîrului-Mare ; pe Argeș în valea Caprei, în valea Budei și pe muntele Paltina ; Predeal în valea Roșnovei până sus pe Urzicar (pl. indig. 1900).

*Agrostemma Coronaria* L. spe. p. 625 (Consp. p. 114). — Crânguri, tuferișe. Curtea-de-Argeș dealurile Chiriceștilor ; Dudeasca pe la pădurea Arionoaiei în Ialomița ; Dobrogea la Greci în lunca Plopilor.

### ALSINACEÆ Bartl.

*Cerastium anomalum* W. et Kit. pl. rar. hung. tab. 22 (Consp. p. 114). — Locuri joase umede. Caracăl (pl. indig. 1900) ; Brănești.

*C. trigynum* Vill. pl. dauph. vol. 3 p. 645 (Consp. p. 114). — În regiunea alpină. Culmea Parângului ; Negoiu pe Lespezi ; Buceci la Omu (pl. indig. 1901).

*C. banaticum* Heuff. enum. banat. p. 41 (Consp. p. 115). — Adiție sinonimii *C. filifolium* Vest în Flora an. 1820 p. 353, *C. grandiflorum* var. *filifolium* Fenzl în Ledeb. fl. ross. vol. 1 p. 414, *C. grandiflorum* var. *banaticum* Rochel pl. rar. banat. p. 33 tab. 2 fig. 6 (1828). — Stânci montane, pe valea Lotrului sus la Voineașa spre Vidra.

*C. elliatum* W. et Kit. pl. rar. hung. vol. 3 tab. 225 (Consp. p. 115). — Adiție sinonimii *C. strictum* Wahlenb. carpat. princip. p. 138-non Haenke, *C. repens* Heuff. enum. ban. p. 41 ; Schur enum. transs. 124-non L. Livezi montane alpine, subalpine. Negoiu pe Lespezi ; Buceci (pl. indig. 1901) ; Parângu pe Găuri în pogorâș.

*C. Lerechenfeldianum* Schur enum. transs. p. 122 (Consp. p. 115). — Adiție sinonimu *C. arvense* α. *strictum* Porciu pl. faner. năseud. p. 180-non Haenke. — Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1900 și 1901).

Speciile de *Cerastium* din Consp. p. 116 sub<sup>t</sup> n<sup>o</sup>. 7, 8 și 9 se vor rectifica în numirea lor precum urmează (ved. Grec. pl. vasc. ceahl. p. 26):

7. *C. alpinum* L. spe. p. 628; Rchb. fl. germ. excurs. p. 797 (exclus. synon.); ejus icon. fl. germ. vol. 6 fig. 4977; Koch syn. p. 135. *C. alpinum*  $\alpha$ . *hirsutum* Fenzl in Ledeb. fl. ross. vol. 1 p. 411; Gren. Godr. fl. fr. vol. 3 p. 271; Grec. pl. vasc. ceahl. p. 26.—Vulg. *Cornuț*.—  
4 Iul. August.—Stânci pe piscurile alpine. Godeanu distr. Mehedinț; Parângu pe Pâcleșu; Surul (pl. indig. 1899); Negoiu pe Lespezi în Argeș; Păpușa în Muscel; Buceci pe Caraimanu; Pietra-Mare la Predeal; Ceahlău (pl. indig. 1899 și 1900).

$\beta$ . *glabrum* Willd. spe. pl. vol. 2 p. 815 (1799); Simk. enum. transs. p. 134. *C. alpinum*  $\beta$ . *glabratum* Wahlenb. fl. lapp. p. 136 (1812). *C. glabratum* Hartm. pl. skand. p. 181; Sturm deutsch fl. fasc. 64; Koch syn. p. 135. *C. petrosum* et *C. acutifolium* Schur enum. transs. p. 122.—Stâncile de la Panaghia pe Ceahlău (Grec. pl. vasc. ceahl. p. 26).

$\gamma$ . *lanatum* (Lam. encycl. vol. 1 p. 680 pro spec.) Koch syn. p. 135; Rchb. icon. fl. germ. vol. 6 fig. 4976. *C. villosum* Baumg. enum. transs. p. 424. *C. laniferum* Schur enum. transs. p. 123, —Godeanu pe culme; Parângu; Negoiu; Buceci pe Caraimanu și la Omu; Pietra-Mare; Ceahlău.

$\delta$ . *squalidum* Ram. act. acad. paris. 1826 p. 158; Gren. Godr. fl. fr. 1 p. 271. *C. alpinum*  $\delta$ . *glutinosum* Koch syn. p. 135 excls. synonymum *C. Soleirolii* Ser. sed nec *C. glutinosum* Fries. *C. viscosissimum* Schur enum. transs. p. 123.—În Buceci pe Caraimanu și la Omu (*C. Soleirolii* Grec. consp. p. 116 și pl. indig. an. 1899 și 1901-non Ser. in Duby bot. gall. p. 87); în Ceahlău pe stâncile de la Panaghia (Grec. pl. vasc. ceahl. p. 26) și la Stânca-Pustnicului; pe Negoiu în Argeș (an. 1907).

*Cerastium Soleirolii* Ser., care există în Corsica și Sardinia, dupe Grenier și Godron ține de *C. arvense* L. ca *varietate*; dupe Gürke (ved. C. Richter pl. europ. vol. 2 p. 220) se referă la *C. Thomasii* Ten. Dăr. *C. squalidum* Ram. se zice a fi identic cu *C. atratum* Lapeyr. hist. abr. pyren. p. 265 (1813) tot dupe Gren. Godr. l. c.

*C. transsilvanicum* Schur in vehr. siebenb. ver. 1851 p. 118 (Grec. Consp. p. 116).—Negoiu (pl. ind. 1900); Buceci pe Caraimanu (p. ind. 1900).

*C. vulgatum* L. spe. p. 627:— $\alpha$  *hirsutum* Fries nov. ed. 2<sup>o</sup> p. 125 (ved. Grec. consp. p. 117).—Vârciorova în valea Bahnei; pădurea Cotmeana în Argeș; pe Lotru la Voineasa și Vidra; pe Argeș în valea Caprei și la Cumpăna; Predeal.

*var.  $\delta$ . alpinum* Sturm deutsch. fl. fasc. 63; Koch syn. p. 134; Ledeb. fl. ross. 1 p. 409. (ved. Grec. consp. p. 117).—Buceci pe Caraimanu sus (pl. indig. 1901).

*var.  $\epsilon$ . lancifolium* Schur (Consp. p. 118).—Adiție sinonimii: *C. tri-*

*viale* var. *elatus* Peterm. fl. lipsc. p. 329 (1838) și *C. triviale* var. *nemorale*. Uechtr. æst. bot. Zeit. 1868.

**C. brachypetalum** Desp. in Pers. syn. vol. 1 p. 520: — β. *tauricum* (Spreng. syst. veget. vol. 2 p. 419 pro spec.) Grec. consp. p. 118. — Govora; Tinoasa.

**C. viscosum** L. spe. p. 627 (exclus. synonym.). *C. glomeratum* Thuill. fl. paris. p. 226 (Consp. p. 118). — Ogoară, porumbiști. Severin; pe Prahova la Tinoasa.

**C. bulgaricum** Uechtr. æst. bot. zeit. 1876 p. 221 (Grec. consp. p. 119). — Adîț. *C. ramosissimum* Boiss. voy. bot. tab. 31 (= *C. Riæi* Desmoul.) var. *bulgaricum*: având la maturitate pedicelele fructifere erecto-patente stricte — și nu resfrânte.

**Malachium aquaticum** Fries fl. halland p. 77 (Grec. consp. p. 119). Vârciorova, Severin (pl. indig. 1900); Govora pe valea Hinței; Curtea-de-Argeș; pe Prahova la Tinoasa; păraul Cotorceanca în Ialomița; Bușteni (pl. indig. 1901); Slănic.

**Stellaria Reichenbachii** Wierzb. in Rchb. deutsch. fl. vol. 6 p. 34-sed in icon. deest (Consp. p. 120). Adîție sinonimu *S. Pseudo-Malachium* Schur. enum. transs. p. 117. Voineasa în valea Jidoaei; pe Argeș în valea Caprei și în valea Budei; Buceci în valea Jepilor și la Urlătoare (pl. indig. 1901); Slănic pe Șandru.

**S. media** Vill. pl. dauph. vol. 3 p. 615 (Consp. p. 120). Curtea-de-Argeș prin gropi și șanțuri ude. — Florile a 5 stamine.

β. *neglecta* Weihe in Bluff. et Fingerh. comp. 1 p. 560 (Consp p. 120). Pădurea Comana (pl. indig. 1900).

Mai crescută, dar mai flacidă, foile mai mari, petalele mari așa că egalez și chiar întrec sepalele; florile a 10 stamine.

γ. *pallida* Piré bul. soc. bot. belg. II (1863) p. 43 (Consp. p. 121). *Alsine pallida* Dumort. fl. belg. (1827). *Stellaria Borwiana* Jord. pugil. p. 33 (1852); Halácsy consp. fl. græc. 1 p. 229; Boreau fl. centr. fr. 2 p. 104. *S. apetala* Auct.-non Ucria in Röm. arch. I p. 68 (1796). — Curtea-de-Argeș în zăvoi și prin gropi ude; București în locuri umbroase umede.

**S. Holostea** L. spe. p. 503 (Consp. p. 121. — Adîție: vulgar *Coada-găineii*. *Iarba fetei*. Păduri. Govora în valea Hinței; valea Dâmboviței pe la Isoarele.

**S. graminea** L. spe. p. 604 (Consp. p. 121). — Livezi. Caracăl (pl. indig. 1900); Voineasa, Vidra; Govora; Curtea-de-Argeș; pe Argeș la Cumpăna și în Cheea-Argeșului; Slănic.

**S. glauca** Wither. bot. arrang. vol. 2 p. 240 (Consp. p. 121). — Locuri joase umede tinoase în valea Argeșului la gura Budei; Dorohoi; Burila-Mică (Mehedinț).

**S. uliginosa** Murr. prodr. stirp. goetting. p. 55 (Cons. p. 121).—Locuri joase umede. Slănic pe muntele Dobrului.

**Mœhringia trinervia** Clairv. man. herbor. p. 150 (Consp. p. 122).—Vulgar *Merinană*.—Păduri, dumbrave. Pe Argeș în valea Caprei și în valea Budei; Buceci la poalele Caraimanului (pl. indig. 1901); Căldărușani; Slănic.

**M. Grisebachii** Janka nov. turcic. brev. spe n° 22 (Consp. p. 122).—Adiție la sinonimie: *M. villosa* β. *tenuifolia* Reichard-sed non *M. villosa* Fenzli.—Stânci pe muntele Pricopanului lângă Măcin (pl. indig. 1899).

**M. muscosa** L. spe. p. 515 (Consp. p. 122).—Stânci alpine, subalpine. Pe munții Surul și Prislopul în Argeș (pl. indig. 1899); Buceci în valea Jepilor pe Caraimanu (pl. indig. 1901).

**Arenaria multicaulis** L. spe. p. 605 (Consp. p. 123).—Stânci pe piscuri alpine. Parângu la Găuri pe Piatra-Tăiată; Negoiu; Buceci la Omu (pl. indig. 1901).

**A. biflora** L. mant. p. 71 (Consp. p. 123).—Stânci alpine la locuri umede, isvoare. Parângu pe Mirul-Mare.

**Sagina Linnœi** Presl reliq. Hænke. 2 p. 14 (Consp. p. 124).—Regiunea alpină pe tapete de Muschi. Parângu pe Mândra și Prislopu.

**S. procumbens** L. spe. p. 185 (Consp. p. 124).—Stânci, lespezi, în locuri umede sau ude. Pe Lotru sus la Vidra pe Pravățu; pe Argeș la Cumpăna în valea Caprei și pe Buda; Ceahlău (pl. indig. 1900); București pe un vechiu tapet de Muschi la loc umed umbros în grădina mea, de sine ivit și se perpetue de mai mulți ani.

**Alsine verna** Bartl. beitr. vol. 2 p. 63 (Consp. p. 126).—Stânci alpine pe tapeturi de Muschi și prin fisuri. Parângu la Găuri pe Piatra-Tăiată; Buceci în valea Ialomiței și pe Caraimanu; Ceahlău (pl. indig. 1899).

β. *Gerardii* Grec. consp. p. 127. A. *Gerardii* Wahlenb. carpat. princip. p. 132. Regiunea alpină. Parângu pe Mândra și Miru-Mare; pe Suru (pl. indig. 1899) și pe Negoiu în Argeș; Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1900). Ceahlău (pl. indig. 1900).

γ. *nivalis* Fenzl in Ledeb. fl. ross. vol. 1 p. 348 (Consp. p. 127).—Buceci pe culmea Caraimanului la 2400 m. altit. pe lângă zăpadă (pl. indig. 1901).

**A. recurva** Wahlenb. veget. helvet. p. 87 (Consp. p. 127).—Regiunea alpină, pe Surul (pl. indig. 1899) și Negoiu în Argeș (an. 1907); piscurile Caraimanului (pl. indig. 1901).

**Cherleria sedoides** L. spe. p. 608 (Consp. p. 127).—Stânci pe piscurile alpine superioare. Negoiu; Buceci la Omu (pl. indig. 1899) și pe Caraimanu (pl. indig. 1901).

Adiție dupe genul *Cherleria*:

\* 10<sup>b</sup>. BUFONIA L. gen. n. 225.

\* 1. **B. tenuifolia** L. spec. p. 179; Koch syn. p. 117; Ledeb. fl. ross. vol. 1 p. 341; Rchb. icon. fl. germ. vol. 6 fig. 4899; Boiss. fl. orient. vol. 1 p. 665; Velen. fl. bulg. p. 95. **B. annua** DC. prodr. vol. 1 p. 388. **B. parviflora** Griseb. spicil. rumel. vol. 1 p. 197 (1843).—☉ Iunie. Iulie. Locuri pietroase sfărâmate. sau țărânate. Murfatlar pe coaste (pl. indig. 1900).

**Spargula arvensis** L. spec. p. 630 (Consp. p. 128).—Locuri joase năsipose, la Vlădeni distr. Botoșani.

**Spargularia medla** Pers. syn. vol. 1 p. 504 (Consp. p. 128).—Locuri joase salifere, în stepele Ialomiței pe la Cotorca; Tuzla în Dobrogea.

**S. marginata** Boiss. fl. orient. vol. 1 p. 733 (Consp. p. 128).—Locuri joase năsipose salifere. Tuzla (pl. indig. 1900); Greci, Măcin pe valea Slatina.

**S. rubra** Pers. syn. vol. 1 p. 504 (Consp. p. 128). — Pe coastele muntelui Arefu; prundiș pe albia Slănicului.

#### PARONYCHIAEÆ St. Hil.

**Paronychia cephalotes** Stev. ap. Boiss. fl. orient. vol. 1 p. 743 (Consp. p. 130).—Adiție: sinonimu *P. hungarica* Griseb. spicil. rumel. vol. 1 p. 215 (1843). Locuri pietroase uscate, pe muntele Pricopanului lângă Măcin.

**Herniaria glabra** L. spe. p. 317 (Consp. p. 160).—Tărâm prundos. Bicaz spre Gura Neagrei (pl. indig. 1900).

**Herniaria incana** Lam. encycl. méth. vol. 3 p. 124 (Consp. p. 160):—**α. angustifolia** Fenzl in Ledeb. fl. ross. vol. 2 p. 160.—Stepele Ialomiței pe la Hagieni, Țândărei; Constanța spre Tuzla (pl. indig. 1900).

**β. latifolia** Fenzl in Ledeb. l. c.—Tărâm năsipos pe coaste rupte, la Comana.

**Scleranthus verticillatus** Tausch in Flora ann. 1829 ergänzbl. p. 50 (Consp. p. 131).—Loc năsipos, prundos. Slănic.

**S. neglectus** Rochel ap. Baumg. enum. transs. vol. 3 p. 345 (Consp. p. 132).—Adiție: sinonimii *S. marginatus* Guss. prodr. fl. sicil. p. 486 (1827). *S. perennis β. confertiflorus* Boiss. fl. orient. vol. 1 p. 751 (1867). Culmea alpină, pe Buceci la Omu (pl. indig. 1899 și 1901).

**S. uncinatus** Schur verh. siebenb. ver. 1851 p. 10 (Consp. p. 132).—Ceahlău, stâncile la Șea; pe Lotru la Voineasa și Vidra.

#### ELATINACEÆ Cambess.

**Elatine Alsinastrum** L. spe. p. 520 (Consp. p. 132).—Heleșteul Co-lentinei la Buftea.



## HYPERICACEÆ Lindl.

**Hypericum perforatum** L. spe. p. 1104 (Consp. p. 132).—Livezi, poeni. Govora; Curtea-de-Argeș, Albești; Bârlad la Dealu-Mare (pl. indig. 1901); Greci pe dealuri; Techirghiol-Movilă.

*β. veronense* Rchb. (Consp. p. 133).—Craiova în lunca Jiului.

**H. commutatum** Nolte nov. fl. holsat. p. 69 (Consp. p. 133).—Livezi, poeni. Slănic pe la poalele muntelui Pufu.

**H. quadrangulum** L. spe. p. 1104 (Consp. p. 133).—Livezi montane, pe Paltina în Argeș, în valea Caprei și pe Argeș până la Corbeni; munții Slăniculu până pe Șandru; Ceahlău.

**H. tetrapterum** Fries novit. fl. succ. ed. 1<sup>o</sup> p. 94 (1814). Consp. p. 133.—Livezi montane. Bicăz pe Bâta-Vacei (pl. indig. 1900).

\*  $\times$  *H. quadrangulo-tetrapterum* Rchb. icon. fl. germ. vol. 6 fig. 5178 (1844).—Livezi montane, la Slănic.

**H. androsemifolium** Vill. pl. dauph. vol. 4 p. 502 (Consp. p. 134).—Regiunea alpină. În Parângu pe Gruiu și Miru-Mare; la Negoiu pe Lespezi și Paltina; pe culmea Surului (pl. indig. 1899); Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901).

**H. transsilvanicum** Celak. œst. bot. zeit. 1874 p. 138 (Consp. p. 134).—Stânci alpine, pe muntele Zănoaga în Argeș (pl. indig. 1899); munții Slănicului pe Șandru.

Pentru descrierea amănunțită a acestei specii să se cerceteze în Porciu *diagn. plant. fanerog. și criptog. vasculare transsilvane errata et addenda* p. 351.

**H. montanum** L. spe. p. 1105 (Consp. p. 134).—Locuri deschise, tuferișe. Slănic; Ceahlău (pl. vasc. ceahl. p. 27).

**H. hirsutum** L. spe. p. 1105 (Consp. p. 134).—Crânguri, margini de păduri. Govora la măgura Mătușea-Floarea; Curtea-de-Argeș pe dealurile Hodiei; Căldărușani; Buceci pe la Urlătoarele și în valea Jepilor (pl. indig. 1901); Mănăstirea Suzana în Prahova; Slănic; Măcin spre Greci (plante indig. 1899).

**H. elegans** Steph. in Willd. spe. pl. vol. 3 p. 1469 (Consp. p. 134).—Câmpuri, locuri inculte și aspre. Comana (N. Jacobescu exsic. !); Hagieni, Țândărei în Ialomița; Vaslui și la comuna Ciurea distr. Iași (pl. indig. 1901); Măcin spre Greci (pl. indig. 1899); Constanța spre vii (pl. indig. 1900); Techirghiol-Movilă.

## GERANIACEÆ DC.

**Geranium phæum** L. spe. p. 953 (Consp. p. 135).—Adiție: vulgar *Andrișea* și celor următori. Păduri. Pe muntele Zănoaga în Argeș (pl.

indig. 1899) și pe Paltina; Curtea-de-Argeș pe dealurile Hodiei; Brănești pădurea Pustnicu și Cernica; muntele Socu la Buhalnița (pl. indig. 1900) și pe Petru-Vodă în Neamțu; Slănic; Ceahlău (pl. indig. 1901).

**G. pratense** L. spe. p. 954 (Consp. p. 135). — Livezi, la locuri umede. Poalele Bucecilor și valea Prahovei la Bușteni, Azuga (pl. indig. 1901); pe Lotru la Voineasa și Vidra; Slănic (pl. indig. 1899); muntele Petru-Vodă în Neamțu.

Adiție dupe acesta:

\* 3<sup>b</sup>. **G. asphodeloides** Willd. spec. pl. vol. 3 p. 704 (1800); DC. prodr. vol. 1 p. 642; Boiss. fl. orient. vol. 1 p. 878; Halácsy consp. fl. græc. vol. 1 p. 294. **G. fasciculatum** Pancici in exsic. ! — 4 Iunie. Iulie. Crânguri, mărăcinișuri, la poalele muntelui Pricopanului la Măcin (pl. indig. 1899).

Ca și cel precedent, din categoria celor perenici cu pedunculele biflore și cele fructifere deflexe adesea glandulifere, însă nu pe atât de viguros, dar amintind portul de *G. pyrenaicum* L. prin statura și foile sale. Diferă de acesta prin rizoma sa groasă, scurtă, boantă, cu lungi fibre radicale groase, fusiforme și fără scuame; prin petalele sale îndoit de mari, obovate întregi, — nu bilobate; — diferă de *G. pratense*, între altele, cu osebite prin semințele sale reticulat cutate sau scobite, — nu netede sau foarte subtil-punctulate.

**G. alpestre** Schur enum. transs. p. 135 (Consp. p. 135). — Livezi, poeni montane alpine, subalpine. În Parângu pe Păcleșu și Gruiu; în Argeș pe Prislopul și Surul (pl. indig. 1899), la Negoiu pe Lespezi și Paltina; Predcal pe Urzicarul (pl. indig. 1900); Bușteni, Poeana-Țapului, în valea Jepilor și în valea Babelor (pl. indig. 1901); munții Slănicului pe Șandru.

**G. palustre** L. amœnit. vol. 4 p. 323 (Consp. p. 136). — La locuri ude în părțile montane. Azuga, Bușteni (pl. indig. 1901); Monăstirea Suzana în Prahova; comuna Mosoarele distr. Bacău; poalele Ceahlăului (pl. indig. 1899) și pe Petru-Vodă în Neamțu.

Adiție dupe acesta:

\* 5<sup>b</sup>. **G. cœrulatatum** Schur enum. transs. p. 136 (1866); Simk. enum. transs. p. 161; Z. Panțu contrib. fl. Bucecilor în anal. acad. române seria II tom. 29 secț. științ. p. 298 tab. II! optime. **G. aconitifolium** Kotschy zool. bot. geselsch. 1853 p. 64, etiam Schur l. c. — 4 Iulie. August. Regiunea alpină, în Buceci pe Caraimanu (aflat de Altea-Sa Regală Prințul Carol în anul 1906 <sup>9</sup>/<sub>10</sub> Iulie).

Rarissimă specie, până acum cunoscută numai în o singură localitate din șirul Carpaților, anume pe Piatra-lui-Crai partea despre Transilvania la Vlădușca. — Salutând-o la noi pe Buceci, aducem laudă Augustului-Explorator.

**G. sanguineum** L. spe. p. 958 (Consp. p. 136). — Livezi, crânguri, poeni. Curtea-de-Argeș; Comana; Câmpulung.

**G. columbinum** L. spe. p. 956 (Consp. p. 137). — Livezi. Curtea-de-Argeș; Câmpulung; Câmpina; Dealu-Mare.

**G. divaricatum** Ehrh. Beitr. vol. 7 p. 164 (Consp. p. 137). — Măcin pe la poalele Pricopanului.

**G. lucidum** L. spe. p. 955 (Consp. p. 137). — Măcin la poalele Pricopanului; Greci, Niculițel, Alibeichioi.

**G. Robertianum** L. spe. p. 956 (Consp. p. 138). — Păduri umbroase. Lainici; valea Lotrului la Vidra, Voineasa; Govora; Cheea-Argeșului și în văile de la stația Cumpăna; Buceci în valea Jepilor și la Urlătoarele (pl. indig. 1901); Căldărușani; Brănești, pădurea Pustnicu și Cernica; Monăstirea Agapia; lunca Siretului la Vădeni distr. Brăila.

**Erodium cicutarium** L'Hérit. in Ait. hort. kew. ed. 1 vol. 2 p. 414 (Consp. p. 138). — Adiție: vulg. *Năprasnică*. Locuri aspre, culte sau inculte. Calafat (pl. indig. 1889); Govora; Curtea-de-Argeș; Măcin, Greci.

#### LINACEÆ Lindl.

**Linum flavum** L. spe. p. 399 (Consp. p. 139). Livezi la Botoșani și pe la Curtești (pl. indig. 1899 și 1900).

**L. tauricum** Willd. enum. hort. berol. 1809 p. 399 (Consp. p. 139). — Adamclisi în Dobrogea (pl. indig. 1900 leg. W. Knechtel).

**L. hirsutum** L. spe. p. 398: *var. glabrescens* Rochel pl. rar. banat. p. 27 solum nomen (Consp. p. 139). Lunca Oltului la Rîmnic. (pl. ind. 1899); Odobești pe la Cetățuia lui Crăciun (pl. indig. 1900); Brănești.

**L. nervosum** W. et Kit. pl. rar. hune. tab. 105 (Consp. p. 140). — Zimnicea, Bragadiru în Teleorman.

**L. austriacum** L. spe. p. 399 (Consp. p. 140). — Zimnicea, Bragadiru, Tulcea (pl. indig. 1899).

**L. perenne** L. sp. p. 397 (Consp. p. 140). Curtea-de-Argeș, Albești.

**L. alpinum** Jacq. enum. stirp. vindob. p. 54 et 229: *var. elatius* Wahlenb. (Consp. p. 140). Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901); Surul, Prislopul. în Argeș (pl. indig. 1899) și Negoiu pe Lespezi.

#### OXALIDACEÆ Lindl.

**Oxalis Acetosella** L. spe. p. 620 (Consp. p. 141). Govora în valea Ilinței; pe Argeș la Cumpăna pe Capra și Buda; Bicaz pe Băta-Vacei (pl. indig. 1900); Ceahlău.

## MALVACEÆ R. Br.

***Althæa officinallis*** L. spe. p. 966 (Consp. p. 142). Curtea-de-Argeş; Cotorca în Ialomiţa (Grinţ. exsic.); Brăila în ostrovu Chiciu-Măcinului.

***A. taurinensis*** DC. prodr. 1 p. 436 (Consp. p. 142).—La Possada pe lângă calea şoselei (pl. indig. 1889 leg. W. Knechtel).

***A. cannabina*** L. spe. p. 966 (Consp. p. 142). — Zimnicea, Bragadiru în Teleorman; Cotorca în Ialomiţa; Alacapù distr. Constanţa (pl. ind. 1900); Greci calea spre Măcin.

***A. pallida*** W. et Kit. pl. rar. hung. tab. 47 (Consp. p. 142).—Zimnicea, Bragadiru în Teleorman; Greci pe dealuri distr. Tulcea; Techirghiol.

***Lavatera thuringiaca*** L. spe. p. 972 (Consp. p. 143).—Govora spre măgura Mătuşea-Floarea; Curtea-de-Argeş, Albeşti; Bârlad la Crângu (pl. indig. 1901).

***Malva silvestris*** L. spe. p. 969 (Consp. p. 143).—Govora pe valea Hinţei; Curtea-de-Argeş, Albeşti, Corbeni.

***M. rotundifolia*** L. spe. p. 969 (Consp. p. 143). — Govora; Curtea-de-Argeş.

***M. borealis*** Wallm. in Liljebl. sw. fl. ed. 3 p. 317 (Consp. p. 144). — Pe lângă locuinţe, pe la garduri. Curtea-de-Argeş.

Cu cea precedentă în multă asemănare: diferă prin florile sale mai mici ale căror petale întrec cu puţin caliciul şi prin carpelele sale pe dos reticulat-cutate cu marginea denticulată, — nu netede şi tomentulate.

***Hibiscus ternatus*** Cav. dissert. 3 p. 172 tab. 64 (Consp. p. 144). Govora; Curtea-de-Argeş, Albeşti, prin porumbişti.

***Abutilon Avicenne*** Gært. fruct. 2 p. 251 (Consp. p. 144). — Comuna Cârnogi distr. Ilfov (pl. indig. 1901).

## TILIACEÆ Juss.

***Tilia tomentosa*** Moench verz. bäume weissenst. p. 136 (Consp. p. 145).—Govora; Curtea-de-Argeş; Iaşi (pl. indig. 1899); Greci pădurea Luncaviţa.

***T. vulgaris*** Heyne arzn. gew. vol. 3 tab. 47 (Consp. p. 145).—Buzău la pădurea Crângu (pl. indig. 1900).

Adiţie după *T. flava* Woln. (Consp. p. 146):

\* **5<sup>b</sup>. *T. obliqua*** Host sec. Rchb. fl. germ. excurs. p. 829 (1832) et icon. fl. germ. vol. 6 fig. 5146.—5 Iunie. Iulie. Pădurca Nanov lângă Alexandria distr. Teleorman (pl. indig. 1900 p. 14).

Arbor de talie mediocră, ramurile pendule, foile lung petiolate, verzi şi concolore, limbul şi petiolul cu totul glabre ci numai în axila nervu-

rilor costale pe pagina dorsală cu câte un micșor stof de peri păsloși palizi, limbul foilor ovat acuminat cu marginea serată, baza foarte oblică, prea puțin cordată sau necordată și serată; pedunculii foarte lungi a 3—5 flori, bracteele oblungi puțin late, oblice la bază și îndepărtate de insertia pedunculului lor; petalele ovate și unghiuculate; fructele rotunzioare.

Specimenele noastre au fost confruntate cu cele obținute dela K. Re-chinger culese din arborul clasic ce există în grădina autorului chiar, lângă Viena. Această specie stă alături de *T. flava* Wolny ca afinitate și grupare.

#### AMPELIDACEÆ Ach. Rich.

**Vitis vinifera** L. spe. p. 293 (Consp. 146). — *Vița selbatică, Vița de pădure, Levrusca. Aguridarul.* — Govora, pe la mătura Mătușea-Floarea și în vecinătăți; Curtea-de-Argeș pe dealurile vecine.

#### ZYGOPHYLLACEÆ DC.

**Tribulus terrestris** L. spe. p. 554 (Consp. p. 147). — Adiție: vulgar *Colții-babei.* — Locuri aprice, drumuri, tărâm humifer. Comuna Cotorca în Ialomița; Hagieni, Țândărei; Constanța spre bostănării; Techirghiol-Movilă.

#### RUTACEÆ DC.

**Haplophyllum suaveolens** Ledeb. fl. ross. vol. 1 p. 491 (Consp. p. 148). — Câmpurile goale, la locuri aprice, tărâm humifer. Brăila (pl. indig. 1901); stepele Ialomiței la Fetești, Hagieni; Măcin, Greci pe dealuri.

**Dictamnus Fraxinella** Pers. syn. vol. 1 p. 464 (Consp. p. 148). — Tot pe la Vârciorava (pl. indig. 1900); pădurea Bârnova distr. Iași (pl. indig. 1901) pădurea Bude, Rafaila distr. Vaslui.

#### ACERACEÆ Lindl.

**Acer campestre** L. spe. p. 1494 (Consp. p. 149). — Păduri în regiunea dealurilor și a câmpiilor. Govora; Plocești, Crivina; pădurea Ario-noaea la Cotorca în Ialomița; Dobrogea septentrională, frecuent.

**A. platanoides** L. spe. p. 1496 (Consp. p. 149). — Păduri. Curtea-de-Argeș; în Dobrogea pădurea Taița, Cocoși, Nicolîțel. — Sporadic.

**A. Pseudoplatanus** L. spe. p. 1495 (Consp. p. 149). — Păduri, tuferișe în regiunea montană, locuri pietroase. Călimănești, Cozia; în Cheea-Argeșului și la Cumpăna, a rar.

**A. tataricum** L. spe. p. 1495 (Consp. p. 149). Păduri în regiunea meridională a țării. La Făurei în Putna; Arionoaea la Cotorca; Dobrogea septentrională și în cele lalte părți din țară.

## CLASA II

### Dicotiledoane Dialipetale Perigine și Epigine

#### CELASTRACEÆ R. Br.

**Evonymus europæus** L. spe. p. 286 var.  $\alpha$ . (Consp. p. 150). Păduri. Govora; Curtea-de-Argeș; Cotorca pe la pădurea Arionoaea în Ialomița; tuferișe pe malul mării la Techirghiol-Movilă: var.  $\beta$ . *pubescens* Steph. enum. stirp. mosq. n° 154 (1792); Grec. consp. l. c. *E. bulgaricus* Velen. fl. bulg. p. 116. *E. europæus*  $\beta$ . *scabridum* Degen.

**E. verrucosus** Scop. fl. carn. ed. 1 p. 166 (Consp. p. 150). — Păduri. Govora; Călimănești, Cozia; Cotorca la pădurea Arionoaea.

În Conspect la p. 150 de intercalat după *Evonymus verrucosus*:

\* 2<sup>b</sup>. **E. nanus** M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 3 p. 160 (1819); DC. prodr. vol. 2 p. 4; Ledeb. fl. ross. vol. 1 p. 499; Boiss. fl. orient. vol. 2 p. 9. *Cneorum tricoccum* Guldenst. reiss. russl. u. im caucas. gebürge vol. 1 p. 422 (1787)-non L.—† Mai. Iunie. În pădure la Bălteni distr. Vaslui, aflat de I. Constantineanu.

Arbust scundicel, ca 25 cent. înălțime, are ramurile stricte, dens foliate și glabre; cele tinere cu mulți anguli subțiri, cele vechi verucoase. Foile glabre, înguste oblunglanceolate sau lineare chiar (25 mm. lungime, 3 mm. lățime), sesile, însă îngustate la bază ca și la vârf, marginea revolută și subtil denticulată spre vârf. Florile, în felul celor de *E. verrucosus* ca făptură și culoare, sunt asemenea dispuse în cime axilare 1-3-flore și întrec lungimea foilor încă pe atât. Fructul asemenea capsulă a 4 lobi ce au angulul dorsal mai proeminent sau cam aripat, nu obtus; arila îmbrățișază sămânța sa aproape pe jumătate.

Prezența acestui arbust în România este ceva extra-rar sub raportul Florei europene, nefiind cunoscut nicăieri în părțile acestui continent. Până acum este cunoscut în ținutul Cabardah din Circasia, aflat la început de Guldenstaedt și mai în urmă de Steven; aria sa geografică din Caucazia face o săritură peste toată Rusia meridională unde nu este aflată și peste Marea-Neagră ca să apară la noi în Moldova. Vom vedea asemenea și o altă specie caucaziană, *Saxifraga Huetiana* Boiss., făcând asemenea săritură

din aria sa geografică și stabilindu-se tot în Moldova, în munții Slănicului unde, dela aflarea sa, în anul 1880, de către Dr. D. Brânză, este și se perpetue, cu toată viața sa de plantă ierbacee anuală.

### RHAMNACEÆ R. Br.

**Rhamnus cathartica** L. spe. p. 279 (Consp. p. 151). — Păduri în regiunea inferioară. Cotorca la pădurea Arionoaea în Ialomița.

**Rh. Frangula** L. spe. p. 280 (Consp. p. 151). — Brănești la pădurea Pustnicu în locuri joase umede chiar pe lângă marginea lacului Pustnicu aproape de apă; la pădurea Slobozeanu ocolul Tisău distr. Buzău pe culmea argiloasă a dealurilor (N. Iacobescu exic.!).

De însemnat descinderea acestuia din regiunea dealurilor mari în regiunea inferioară a țerei și tocma pe lângă apă.

### TEREBINTHACEÆ Juss.

**Rhus Cotinus** L. spe. p. 383 (Consp. p. 151). — Pe dealurile pietroase la Dimitrești distr. Râmnicu-Sărat (pl. indig. 1901); Greci distr. Tulcea.

• **Rh. Typhina** L. (Consp. p. 152). — În cultură și pribeag. Curtea-de-Argeș; comuna Larga distr. Dorohoi (pl. indig. 1900); Greci în Dobrogea (vulg. *Oțetar*).

### LYTHRARIACEÆ Lindl.

**Lythrum Salicaria** L. spe. p. 640 (Consp. p. 152). — Adit. vulgar *Calbășoară*. Govora; Curtea-de-Argeș, Albești, Oești.

**L. virgatum** L. spe. p. 642 (Consp. p. 152). — Locuri joase umede, Cotorca în distr. Ialomița; Brăila în ostrovu Chiciu-Măcinului.

### CRASSULACEÆ DC.

**Rhodiola rosea** L. spe. p. 1465 (Consp. p. 152). — Stânci alpine. Pe Parângu; Negoiu (pl. indig. 1900) și pe Paltina; Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901); Ceahlău pl. indig. 1899 și 1900).

Am arătat în lucrarea «Plantele vasculare ale Ceahlăului etc.» p. 28 că diferența ce pune A. Kerner între specia sa zisă *Rh. Scopoli* și între *Rh. rosea* L. constă numai în aparența foilor mai îngroșate de cum e

la specia legitimă linneană din Lapponia, ceea ce nu constituie un caracter fix și de valoare specifică.

**Sedum maximum** Sut. *pl. helvet.* vol. 1 p. 270 (Consp. p. 153).—Stânci, locuri aspre seci. Bicăz pe muntele Cosmița (pl. indig. 1900); Piatra-Roșie la Hasanlar plasa Măcinului.

**S. purpurascens** Koch syn. p. 284 (Consp. p. 153).—*β. albiforum* Koch. Locuri pietroase pe muntele Arefu în Argeș; Broșteni pe Barnaru.

**S. Fabaria** Koch syn. ed. 1 p. 258 et ed. 2<sup>o</sup> p. 284 exclus. synonymum (Consp. p. 153).—Stânci montane alpine, subalpine. Pe muntele Suru (pl. indig. 1899), Negoiu pe Lespezi și pe Paltina în Argeș; Sinaia la S-ta Ana (pl. indig. 1901); Ceahlău (pl. vasc. ceahl. p. 28).

**S. alpestre** Vill. prosp. p. 49 (Consp. p. 154).—Stânci alpine. În Parângu pe Păcleșu și la Vidra pe Pravățu; în Negoiu pe Lespezi; Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901).

**S. acre** L. spe. p. 619 (Consp. p. 154).—Pe locuri tari, aspre, prundoase. Căineni-din-Argeș (pl. indig. 1899); Brănești pe lângă calea ferată; Dorohoi (pl. indig. 1901); poalele Ceahlăului.

**S. boloniense** Lois. not. p. 71 (Consp. p. 154).—Locuri tari prundoase. Vișani distr. Iași (pl. indig. 1900); Ceahlău (pl. indig. 1899).

**S. neglectum** Ten. fl. napol. vol. 4 p. 250 (Consp. p. 154).—Stânci, locuri pietroase. Munții Măcinului (pl. indig. 1899).

**S. glaucum** W. et Kit. pl. rar. hung. tab. 181 (Consp. p. 155).—Locuri pietroase, stânci montane. Pe Lotru sus la Vidra pe Pravățu; Căineni-din-Argeș (pl. indig. 1899); pe Argeș la stația Cumpăna în valea Caprei și pe Buda; Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901; Rarău.

**S. atratum** L. spe. p. 1673 (Consp. p. 155). Buceci la Omu și pe Caraimanu (pl. indig. 1901); Ceahlău la Piatra-Detunată (pl. vasc. ceahl. p. 29).

**S. annuum** L. spe. p. 620 (Consp. p. 155).—Stânci calcare, prundiș. Pe Lotru la Voineasa valea Jidoaea; la Negoiu pe Lespezi și pe Paltina, stația Cumpăna în valea Caprei și pe Buda; Buceci în valea Jepilor (pl. indig. 1901).

**Sempervivum assimile** Schott œst. bot. woch. 1853 p. 19 (Consp. p. 156).—Stânci subalpine. Buceci la Urlătoare și în valea Cerbului sus (pl. indig. 1899 și 1901).

**S. Heuffeli** Schott œst. bot. zeit. 1852 p. 18 (Consp. p. 156).—Stânci alpine, subalpine. Pe muntele Negoiu (*S. hirtum* Grec. pl. indig. an. 1900); pe Paltina în Argeș și în Cheea-Argeșului pe înălțimile Arefului.

**S. soboliferum** Sims. botan. magaz. tab. 1457 (Consp. p. 157). Stânci montane. Bicăz pe Piatra-Corbinei și pe Ceahlău (pl. indig. 1899 și 1900, *S. hirtum* Grec. pl. indig. 1901); Cheile Barnarului pe stânci (*S. hirtum* Grec. consp. p. 156-non L.)



## PAPILIONACEÆ L.

Adiție, la început, înaintea genului *Genista* (Consp. p. 157):

\* 1. SAROTHAMNUS Wimm. fl. v. schles. p. 278.

\* 1. *S. vulgaris* Wimm. fl. v. schles. ed. 1<sup>o</sup> p. 278 (1832); Koch syn. ed. 2<sup>o</sup> p. 166 sine descriptione; Gren. Godr. fl. fr. vol. 1 p. 348; Neill. diagn. p. 33. *S. scoparius* Koch syn. ed. 1<sup>o</sup> p. 152. *Spartium scoparium* L. spe. p. 996. *Genista scoparia* Lam. encycl. méth. vol. 2 p. 623-non Vill. *Cytisus scoparius* Link enum. hort. berol 2 p. 241; DC. prodr. vol. 2 p. 154; Rchb. icon. fl. germ. vol. 22 tab. 31 fig. 4 et 5. 5 Mai. Iunie. Crânguri lângă pădurea Nemțianca la Tecuci, calea ce duce spre Cosmești (P. Enculescu).

*Genista sagittalis* L. spe. p. 998 (Consp. p. 157).—Crânguri pe dealul Hușilor la Fălticeni.

*G. albida* Willd. spe. pl. vol. 3 p. 942 (Consp. p. 157).—Locuri pietroase, pe munții de la Greci, în Dobrogea (pl. indig. 1899).

*G. oligosperma* Grec. consp. p. 158. *G. tinctoria* var. *oligosperma* Andræ bot. zeit. 1853 p. 440.—Stânci, păsciuni, în regiunea alpină. Parângu pe Gruiu; Negoiu pe Lespezi și Paltina; Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901); Predeal pe Urzicaru la linia de frontieră (pl. indig. 1900); munții Slănicului pe Pufu și pe Șandru.

*G. tinctoria* L. spe. p. 998 (Consp. p. 158).—Livezi, crânguri. Govora: Curtea-de-Argeș până în Corbeni; Slănic pe dealurile vecine în jos.

β. *elatior* Rchb. icon. fl. germ. vol. 22 tab. 37 fig. 3 (Consp. p. 158) — Livezi pe muntele Arefu în Argeș.

γ. *latifolia* DC. (Grec. consp. p. 159). — Crânguri la pădurea Cotmeana (Argeș).

*G. ovata* W. et. Kit. pl. rar. hung. vol. 1 tab. 84 (Consp. p. 159). — Tuferișe în părțile montane pietroase. Vârciorova în valea Bahnei; Băca-de-Aramă.

*Cytisus nigricans* L. spe. p. 1041: var. β. *sericeus* Rochel (Consp. p. 160). Locuri aride. Curtea-de-Argeș pe dealurile Chiriceștilor; Păiuș, Lainici în Gorj.

*C. leucanthus* W. et. Kit. pl. rar. hung. vol. 2 tab. 132 (Consp. p. 160).—Livezi, tuferișe. Burila-mică în Mehedinț; Govora pe măgura Mătușea-Floarea; Strihareț în distr. Oltu (pl. indig. 1899).

NB. Var. β. a acestuia (Consp. p. 160) să se rectifice precum urmează:

β. *pallidus* Schrad. in DC. prodr. vol. 2 p. 155 (1825); Grec. pl. vasc. ceahl. p. 29. *C. pallidus* Kit. iter Bereg. inedit.; Briquet monogr. cytis. p. 174; Velen. fl. bulg. suppl. p. 70. *C. austriacus* β. *pallidus* Rchb.

icon. fl. germ. vol. 22; Neilr. diagn. p. 34. *C. leucanthus* b) *obscurus* Rochel pl. rar. ban. tab. 13 fig. 29 (1828). *C. banaticus* Griseb. et Sch. iter. hung. spe. n° 4 (1852): *forma floribus terminales lateralesque*. — *C. Rochelii* Wierzb. ap. Griseb. et Sch. l. c. spec. n° 7: *forma floribus terminales pallides*; F. Schultz. herb. nom. No. 2153! *C. capitatus* Heuff. enum. ban. p. 50 (1858)-non L.—Adiție: crânguri. Piatra-Neamțu pe muntele Cozla (pl. vasc. ceahl. p. 29).

**C. Heuffeli** Wierzb. in Flora 1845 tom. 1 p. 320 (Consp. p. 160) cu suprimarea sinonimilor de *C. leucanthus* β. *pallidus* Schrad. și *C. austriacus* b) *pallidus* Rchb. și Neilr. Adiție: Câmpulung pe la Flămânda; Urziceni, Speteni, Dudeasca, Cotorca în Ialomița; pe dealuri la Panciu, Crucea-de-jos distr. Putna (pl. indig. 1899); Monăstirea Mera în Putna (pl. indig. 1900); Valea-Găleanului în Bacău și Dealu-Mare la Bârlad (pl. indig. 1901).

β. *argenteus* Grec. consp. p. 161.—Cotorca, Dudeasca pe la pădurea Arionoaea distr. Ialomița.

**C. aggregatus** Schur enum. transs. p. 149; Porciu diagn. p. 58 (Consp. p. 161). — Tuferișe, rărișuri. Pe lângă calea ferată Buftea-Periși; stepele Ialomiței pe la Fetești, Hagieni; pe la pădure lângă Săscut în Putna (pl. indig. 1899).

**C. hirsutus** L. spe. p. 1042 (Consp. p. 161).—Tuferișe. Govora, Călimănești; Mizil pe dealuri; Urziceni, Speteni în Ialomița; Monăstirea Mera și la Vidra în Putna (pl. indig. 1900 și 1901); Tarcău; Fălticeni (pl. indig. 1901); Curtea-de-Argeș pe dealurile vecine; Peatra-Neamțu pe Petricica.

Specia *C. leucotrichus* Schur. (Consp. p. 162) se va pune ca *varietate* sub *C. hirsutus* cu sinonimia următoare:

β. *leucotrichus* Schur verh. siebenb. ver. 1859 p. 60. *C. hirsutus* L. Schur rundreisse siebenb. p. 6 (1859). *C. leucotrichus* Fuss transs. excurs. p. 154 pro spec. dubia; Simk. enum. transs. p. 172 pro spec. propria. *C. hirsutus* subspec. *a*: *leucotrichus* Aschers. u. Gräbn. mittel. europ. vol. 6 part. 2° p. 317. *C. hirsutus* 6° subspec. *hirsutus* Briquet cytis. p. 170 (1894).—Tuferișe, margini de păduri, în regiunea dealurilor. Vârciorova și dealul Stârminei în Mehedinț (*C. elongulus* Grec. consp. p. 162-non W. et Kit.); Mihăești, Furnicoși în Muscel; valea Dâmboviței; valea Pravei pe la Poana.

Varietate de puțină diferență, de forma tipică a speciei, diferență ce constă în indumentul său de peri albi drepți și mai dens, atât pe ramurile tinere, pe foliolele foilor cât și pe fructe; apoi, și în ramurile sale mult mai lungi, adesea arcuat aplecate, cu înfățișare de lungi raceme. Unele specimene au legumenii în mare parte subarcuați, a secrete, ceea ce corespunde cu *C. falcatus* W. et Kit.

*γ. alpestris* Grec. consp. p. 162. *C. alpestris* Schur enum. transs. p. 148 (1866). *C. polytrichus* b). *alpestris* Simk. enum. transs. p. 137. *C. hirsutus* sub spec. *b. ciliatus*, 2<sup>o</sup> var. *alpestris* Aschers. u. Gräbn. mitt. europ. vol. 6 part. 2<sup>o</sup> p. 320.—Specimenele din Ceahlău (Grec. consp. p. 162).

*C. elongatus* W. et Kit. pl. rar. hung. vol. 2 tab. 183 (Consp. p. 162).—Locuri pietroase pe coastele munților lângă Vârciorova : de astă-dată alte specimene noi, din anul 1907 și caracteristice.

Nu numai eu, dar și alți botaniști—precum am văzut din plantele schimbate—am luat oarecare specimene de *C. leucotrichus* drept *C. elongatus* W. et Kit. cu privire la ramuri; însă, acum am putut constată asupra noilor exemplare de la Vârciorova că acestea au ramurile lungi dar subțiri, indumentul lor, al pețiolilor, foliolelor și calicelui constă din peri scurți, moi și adpresi; pe când la *C. leucotrichus* rămurile lungi dar mai groase, indumentul lor mai dens și hispid, pețiolii, foliolele și caliciul cu peri lungi, mult mai denși și patuli sau resfirați.

*Ononis hircina* Jacq. hort. vindob. vol. 2 p. 40 tab. 93 (Consp. p. 163).—Livezi, tuferișe. Slănic; Măcin spre Iglița (vulg. *Dermotin*).

*Trigonella Bessariana* Ser. in DC. prodr. vol. 2 p. 181 (Consp. p. 166).—Livezi. Cotorca, Dudeasca în stepele Ialomiței.

Adiție:

\* 4. *T. gladiata* Stev. catal. hort. gorenk. 1808 p. 112; M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 2 p. 222; DC. prodr. vol. 2 p. 182; Koch syn. p. 181 exclus. synonym.; Ledeb. fl. ross. vol. 2 p. 531; Rchb. icon. fl. germ. vol. 22 tab. 56 fig. 1 et 2; Velen. fl. bulg. suppl. p. 76.—☉ Iunie. Iulie. Locuri pietroase, tărâm calcar, pe coastele dealurilor la Murfatlar și spre Alacapù distr. Constanța (pl. indig. 1900 p. 16 leg. D. Bartolomeu).

*Melilotus alba* Desr. ap. Lam. encycl. méth. vol. 4 p. 63 (Consp. p. 166).—Livezi, poeni. Govora; Curtea-de-Argeș, Albești, Corbeni; Zimnicea; pe Prahova la Tinoasa; Constanța, Măcin, Greci; Techirghiol.

\* *β. micrantha*.—Locuri joase. Cositeni distr. Râmnicu-Sărat.

Plantă cu portul rigid și cam bășos (virgat); florile și fructele pe jumătate mai mici de cum ale speciei propriie.

*M. officinalis* Desr. l. c. (Consp. p. 167).—Adiție : vulg. *Sufulg*. Livezi, poeni. Govora; Curtea-de-Argeș; stepele Ialomiței la Fetești, Hagiieni; Constanța pe la vii.

Adiție, dupe *Melilotus macrorrhiza* (Consp. p. 167):

\* 4. *M. dentata* Pers. syn. vol. 2 p. 348 (1807); DC. prodr. vol. 2 p. 186; Koch syn. p. 182; Ledeb. fl. ross. vol. 2 p. 535; Boiss. fl. orient. vol. 2 p. 108; Rchb. icon. fl. germ. vol. 22 tab. 80 fig. 1. *Trifolium dentatum* W. et Kit. pl. rar. hung. vol. 1 p. 41 tab. 42 (1800). *Trifolium*

*Melilotus dentata* Sturm deutsch. fl. fasc. 15.— ☉ Iunie-Septemvre. Locuri joase, sărate, umede, la Măcin pe lângă balta Iglîța.

**Trifolium alpestre** L. spe. p. 1082 (Consp. p. 167).—Livezi, poeni. Piatra-Neamțu ; Miclești distr. Vaslui (pl. indig. 1901).

*β. brevifolium* Boiss. fl. orient. vol. 2 p. 114 ; Grec. pl. indig. 1901 p. 8. *T. alpestre β. incanum* Halácsy consp. fl. græc. vol. p. 377 ex parte. Livezi, Dealu-Mare la Valea Călug. ; comuna Vidra în Putna (pl. indig. 1901).— Foile eliptico-oblungi, mai scurte de cum la specia proprie : 15—20 mm. în lungime și ușor încănunțite pe desubt, caulul scurt.

**T. sarosiense** Hazl. ejisz. magyar. p. 76 (Consp. p. 168).—Livezi, pe muntele Pufu la Slănic ; Dealu-Mare la Valea Călugărească.

**T. expansum** W. et Kit. pl. rar. hung. vol. 3 tab. 237 (Consp. p. 168).—Livezi, poeni. Govora, stația balneară despre hotelu No. 3 ; Brănești, Păsărea ; Râmnicu-Sărat spre Crângu.

**T. pratense** L. spe. p. 1082 (Consp. p. 169).—Livezi, poeni Govora ; Curtea-de-Argeș până la Corbeni și pe Argeș în sus ; Slănic ; Măcin, Greci.

*γ. frigidum* Gaud. fl. helvet. vol. 4 p. 582 (Consp. p. 169).—Păscuni, stânci, în regiunea alpină la poalele Negoifului, pe Lespezi și pe Clăbucetu.

**T. pannonicum** Jacq. obs. bot. vol. 2 p. 21 tab. 42 (Consp. p. 170).—Livezi, poeni. Govora stația balneară spre piscul Rădache ; Brănești ; Slănic.

**T. arvense** L. spe. p. 1083 (Consp. p. 171).—Adiție : vulg. *Cher-cară. Coada-măței*.—Livezi. Govora ; Curtea-de-Argeș până în Corbeni ; Focșani ; Brăila ; Măcin, Turcoaea ; Techirghiol-Movilă.

\* Adiție dupe *Trifolium resupinatum* (Consp. p. 172):

§ 2<sup>b</sup>. Florile scurt pedicelate și nebracteolate așezate în capitule pedunculate terminale unele axilare ; istmul caliciului fără proeminență inelară, glabru și deschis, lipsit de părositate, tubul oarecum regulat neghebos și nevesiculos, a 5 nervuri longitudinale ; corola dupe înflorire devine scarioasă, dosul vexilului ușor carinat ; legumenul lungicel, a 2 4 semințe, inclus, stipitat și cu stil scurt uncinat (*Lupinaster* Koch).

\* 18<sup>b</sup>. **T. romanicum** Brânza pl. nouă din român. în analele acad. române ser. 2<sup>o</sup> tom. XXV p. 153 (1903) cu icoană !— 4 Iunie. Iulie. Păscuni subalpine prin tufăriile de *Vaccinium* pe muntele Nemira, 1500 m. alt., aproape de Slănic ; însă a rar.

Rizomă noduroasă, în parte și rămoasă, radicanță, din care răsar rădăcini tuberos-îngroșate, lungi, conoide, unele articulate. Foile inferioare reduse și constând numai în stipul vaginiform ; cele superioare sunt digitat-5-foliolate, foliolele oblung-lanceolate la vârf acute sau obtuse, subțirel și dens serulate ; capitulele terminale pedunculate nebracteate, cele axilare în parte stau ascunse în axila foaii, pedunculele pubescente, flo-

rile albicios-gălbenui, caliciul pe jumătatea corolei, dinții săi lanceolato-subulați sunt aproape egali și cu puțin mai lungi de cât tubul (Autorul).

Aduce mult cu *T. Lupinaster* L. de care diferă prin portul său mult mai mănușel (tenue) în toate părțile sale, dar diferă mai ales prin rădăcinile tuberoase ce are.

**T. repens** L. spe. p. 1080 (Consp. p. 172).—Livezi, locuri cu iarbă. Govora; Curtea-de-Argeș până în Corbeni și la Cumpăna; comuna Vidra în Putna (pl. indig. 1901); Cotorca în Ialomița; Măcin, Greci.

Numirea de *T. pallescens* Schreb. (Consp. p. 173) se va desființa, înlocuind-o precum urmează:

**21. T. glareosum** Schleich. catal. ed. 1821 p. 35. *T. caespitosum* β. *glareosum* Ser. in DC. prodr. vol. 2 p. 200. *T. caespitosum* Sturm deutsch. fl. fasc. 15-non Reyn. sec. Koch. syn. p. 192. *T. pallescens* Auct. transs. *T. repens* b. *glareosum* Simk. enum. transs. p. 183. *T. glaciale* Porc. magyar. növen. lap. 1885 p. 126. — 4 Iulie. August. Stânci și păsciuni alpine. În Argeș la Negoiu pe Lespezi; Păpușea; Buceci pe Costila și Caraimanu (*T. pallescens* Grec. consp. p. 173-non Schreb. ap. Sturm deutsch. fl. fasc. 15 ann. 1804); Buceci (*T. pallescens* β. *glareosum* Grec. consp. p. 173 sec. exicc. Simonkay); Buceci în valea Ialomiței la Schit (*T. pallescens* Grec. pl. indig. 1899 p. 6); Buceci pe vârful Caraimanului și la Omu (*T. pallescens* β. *glareosum* Grec. pl. indig. 1901 p. 8).

Cercetând mai în urmă și comparând planta carpatică cu *T. pallescens* Schreb. din alpii Tirolului, am putut constata diferențe destul de vădite spre a le separa în specii caracteristice. Planta noastră, *T. glareosum* Schleicher, se apropie cu osebire de *T. repens* L. prin caulii proștrați radicanți și prin stipulii scarioși, abruptcuspidati; totuși diferă de acesta prin florile alb-gălbenui, nu de un alb-rumen; prin corola mult mai mare și de patru ori mai lungă de cât caliciul.—Prin caulii proștrați radicanți, prin foliolele obcordate și prin stipulii scarioși abrupt cuspidati diferă cu totul de *T. pallescens* Schreb., dar la flori aduce cu acesta.

**T. badium** Schreb. ap. Sturm deutsch. fl. fasc. 16 (Consp. p. 173).—Plaiuri alpine. Pe muntele Surul în Argeș (pl. indig. 1899); Negoiu; Buceci la Obârșia-Ialomiței (pl. indig. 1901).

A rectifică numirea de *T. agrarium* (Consp. p. 174 No. 26) astfel:

**26. T. aureum** Poll. palat. vol. 2 p. 344 (1776); Vill. pl. dauph. vol. 3 p. 492; Gren. Godr. fl. fr. vol. 1 p. 424; Boiss fl. orient vol. 2 p. 153. *T. agrarium* Schreb. ap. Sturm. deutsch. fl. fasc. 16 (1804); Koch syn. p. 194; Rchb. icon. fl. germ. vol. 22 tab. 119-non L. — 4 Iunie. Iulie. Livezi, poeni, tuferișe, în regiunea montană. Pe Jiu la Lainici; în Parângu pe Prislopu; Olănești, Călimănești; Curtea-de-Argeș, Corbeni, muntele Ghițu, Cheea-Argeșului pe la Cetatea Vlad-Țepeș, la Cumpăna pe valea Budei

și pe muntele Paltina; Câmpulung, Sturzeni; Predeal, Bușteni, Sinaia; Vărzărești distr. Râmnicu-Sărat; Slănic; în Suceava la Broșteni și pe Stănișoara.

A rectifica și numirea de *T. procumbens* (Consp. p. 174 astfel :

**27. *T. agrarium*** L. spe. p. 1087; Poll. palat. vol. 2 p. 342; Gren. Godr. fl. fr. vol. 1 p. 423; Boiss. fl. orient. vol. 2 p. 153; Halácsy consp. fl. græc. 1 p. 406. *T. procumbens* Smith engl. fl. vol. 3 p. 51 (1825); DC. prodr. 1 p. 205 (exclus. variet.); Grec. consp. p. 174-non L. *T. campestre* Schreb. ap. Sturm deutsch. fl. fasc. 16 (1804). *T. procumbens* *α. majus* Koch syn. p. 174; Ledeb. fl. ross. vol. 1 p. 557; Rchb. icon. fl. germ. vol. 22 tab. 121.— ☉ Iunie. Iulie. Livezi, locuri cu iarbă, pomării, tuferișe. Specie întinsă. Baea-de-Aramă, Padeș, Tismana; Govora, Olănești Râmnic; Curtea-de-Argeș, Albești, Corbeni; Netoți, Alexandria în Teleorman; Titu, Ciocănești, Periș, Brănești; Focșani; Bicăz (*T. procumbens* Grec. pl. indig. 1900 p. 17); Broșteni, Dealu-Ursului, schitul Rarău în Suceava; Vaslui, Rafaila; Brăila; Babadag, Alibeichioi; Techirghiol-Movilă, Tuzla.

*β. minus* Gren. Godr. fl. fr. vol. 1 p. 424. *T. procumbens* Schreb. ap. Sturm deutsch. fl. fasc. 16-non L. *T. pseudoprocumbens* Gmel fl. baden. vol. 3 p. 240 (1808). *T. procumbens* *β. minus* Koch syn. p. 194; Rchb. icon. fl. germ. vol. 22 tab. 122; Schlechtd. Langeth. deutsch. fl. vol. 23 fig. 2405 tab. II<sup>o</sup>; Grec. consp. p. 174. Locuri uscate aspre, prundiș, tuferiș. Vârciorova, în valea Bahnei; Râmnic și dealurile Guranului; Călimănești; Periș în lunca Ialomiței pe la Pârlita; în Dobrogea pe la Isaccea, Cocoși.

Apoi, adiție :

\* **28. *T. procumbens*** L. spe. p. 1088; Poll. palat. vol. 2 p. 345; Gren. Godr. fl. fr. vol. 1 p. 423; Boiss. fl. orient. vol. 2 p. 154; Halácsy consp. fl. græc. vol. 1 p. 407. *T. filiforme* Koch syn. p. 195 sec. Sturm deutsch. fl. fasc. 16 (1804); Rchb. icon. fl. germ. vol. 22 tab. 120 fig. 1-non L.— ☉ Iunie-Septemvrie. Locuri cu iarbă. Măgurelele-Otetelișan; Pitești la Trivale.

***Doryenium pentaphyllum*** Scop. fl. carniol ed. 2<sup>o</sup> p. 87 (Consp. p. 174).—Adiție : vulgar *Fălcată. Sulițică. Trifoiul-caprelor.*

*α. patentipilosum* Ledeb. (Grec. Cons. p. 175).—Livezi, poeni. Govora spre măgura Mătușea-Floarea; Brănești spre pădurea Pustnicu; Greci.

*β. adpressipilosum* Ledeb. (Consp. p. 175).—Livezi. Curtea-de-Argeș și pe dealurile vecine; Brănești; Slănic.

***Lotus corniculatus*** L. spe. p. 1092 (Consp. p. 175).—*α. vulgaris* Ledeb. fl. ross. vol. 1 p. 516.—Livezi. Curtea-de-Argeș și pe dealurile vecine; Măcin, Greci.

*β. alpinus* Baumg. (Grec. consp. p. 176).—Pe muntele Paltina în Argeș; Predeal în livezile despre Schit și sus pe Clăbucetu-Taurului; Slănic pe muntele Șandru; Ceahlău (pl. indig. 1901).

**Glycyrrhiza echinata** L. spe. p. 1046 (Consp. p. 176). — Locuri joase subsalse. Buzău spre Crângu (pl. indig. 1900); Cotorca-Mare în Ialomița; Brăila în ostrovul Chiciu-Măcinului; Măcin în luncă la Turcoaea, copios.

**Galega officinalis** L. spe. p. 1062 (Consp. p. 177). — Locuri joase cam umede. Govora; Călimănești; Curtea-de-Argeș; Brănești; Cotorca în Ialomița; Brăila; Măcin spre Iglița și Carcaliu; Techirghiol spre dune.

**Robinia Pseudacacia** L. spe. p. 1043 (Consp. p. 177). — Adiție: vulgar *Arcaș* (Transs.). — Govora; Curtea-de-Argeș; Dobrogea în plantații întinse.

**Oxytropis sericea** Simk. enum. transs. p. 186 (Consp. p. 178). — Piscuri alpine superioare. Buceci la Omu (pl. indig. 1899); Ceahlău (pl. indig. 1901).

**O. campestris** DC. astragal. p. 59 n° 10 (Consp. p. 178). — Stânci, păscuni alpine. Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901); Ceahlău pe platoul de la Șea (Grinț. anu 1906) și pe Panaghia (pl. indig. 1901).

**Oxitropis pilosa** DC. astragal. p. 73 n° 27 (Consp. p. 178). — În regiunea stepelor, locuri aprice. Hagieni, Țândărei distr. Ialomița; Movileni distr. Tecuci (pl. indig. 1901).

**O. carpatica** Uechtr. œst. bot. zeit. 1864 p. 216 (Consp. p. 178). — Piscuri alpine, pe Negoiu (pl. indig. 1900); Bucegi la Omu (pl. indig. 1899 și 1901).

**Phaca frigida** L. syst. natur. ed. X p. 1173 (Consp. p. 178). — Piscuri alpine. Buceci în valea Cerbului sus (pl. indig. 1901) și la Obârșia-Ialomiței

**Astragalus alpinus** L. spe. p. 1070 (Consp. p. 179). — Piscuri alpine. Ceahlău (pl. indig. 1901); la Negoiu pe muntele Lespezi.

**A. australis** Rchb. fil. icon. fl. germ. vol. 22 tab. 131 fig. 3 et 4 (Consp. p. 179). — Piscuri alpine. Buceci la Omu (pl. indig. 1901); Ceahlău (pl. indig. 1900).

**A. oroboides** Hornem. fl. dan. vol. 8 tab. 1396 (Consp. p. 179). — Piscuri alpine. Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901).

**A. Onobrychis** L. spe. p. 1070: — *a. vulgaris* Ledeb. (Consp. p. 179). — Livezi, fânețe, la locuri uscate. Govora; Curtea-de-Argeș; Adjud; Măcin, Văcăreni distr. Tulcea.

**β. brevifolius** Grec. consp. p. 180. — Livezi. Botoșani (pl. indig. 1901).

**γ. linearifolius** Ledeb. fl. ross. 1 p. 608 (Consp. p. 180). **A. linearifolius** Pers. syn. vol. 2 p. 336 (1808). Câmpina (pl. indig. 1899); Botoșani pe la pădurea Verona (pl. indig. 1900).

**δ. stenophyllus** Grec. consp. p. 180. **A. dacicus** Heuff. enum. pl. ban. p. 57 (1858). Mult mănunțel (tenue) în toate părțile sale comparativ cu varietățile precedente și cu care uneori se confundă prin individe intermediu. Locuri aprice sterile. Constanța, câmpu de la Alacapă spre Nasarcea (pl. indig. 1900); Isaccea, Ghecet, Jijila.



**A. virgatus** Pall. astrag. tab. 18 (Consp. p. 180).—Tulcea.

**A. dasyanthus** Pall. iter. vol. 3 p. 749 (Consp. p. 181).—Tărâm fertil, tuferișe. Bârlad în grădina publică și pe dealul Țugueata (pl. indig. 1901).

**A. vesicarius** L. spe. p. 1071 (Consp. p. 180).—Locuri petroase sau pârânoase. Galaț pe coastele de la Țiglina (pl. indig. 1899); Murfatlar.

Adiție dupe acesta :

\* **7<sup>b</sup>. A. subulatus** M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 2 p. 193 (1808) și vol. 3 p. 492 (1819):—*var γ. tataricus* DC. prodr. vol. 2 p. 284; Ledeb. flora rossica vol. 1 p. 631; Lindem. fl. cherson. vol. 1 p. 156.—4 Mai. Iunie. La Murfatlar pe coastele pietroase vecine (pl. indig. 1900).

**A. austriacus** L. spe. p. 1070 (Consp. p. 180).—Stepele Ialomiței pe la Hagieni, Țândărei.

**A. asper** Jacq. icon. rar. vol. 1 tab. 33 (Consp. p. 181).—Locuri aprice inculte și în regiunea stepelor. Adjud pe lângă calea ferată; în Ialomița pe la Hagieni, Țândărei.

**A. Cicer** L. spe. p. 1067 (Consp. p. 181).—Livezi, tuferișe. Curtea-de-Argeș; Brănești; Slănic; Iași (pl. indig. 1900).

**A. glycyphyllos** L. spe. 1073 (Consp. p. 181).—Livezi, locuri fertile. Govora; Curtea-de-Argeș; Albești; Slănic.

**A. monspessulanus** L. spe. p. 1072. *A. Wulfenii* Griseb. et Sch. iter hung. spec. n<sup>o</sup> 12-non Koch (Consp. p. 182).—Locuri pietroase sau aspre aprice, tuferișe, Constanța spre Anadolchioi, spre Techirghiol și pe la Murfatlar pe coaste.

**Coronilla varia** L. spec. p. 1048 (Consp. p. 182).—Livezi. Govora; Curtea-de-Argeș, Corbeni și în Cheea-Argeșului pe stânci; Brănești, Paserea; Brăila; Măcin, Greci; Constanța pe la Alacapù (pl. indig. 1900).

**C. elegans** Pancici fl. serb. ann. 1874 et exsiccata ab ipso auctor! (Consp. p. 182).—Pădurea Pustnicu lângă Brănești în Ilfov (Grec. în consp. addiț. p. 833 an. 1908); pădurea Muncelu la Străoanii-de-Sus în Putna (pl. indig. 1901); păduri în Dealu-Mare la Valea-Călugărească.

**Onobrychis sativa** Lam. fl. fr. vol. 2 p. 652 (Consp. p. 183).—Livezi, pe la Panciu și la Ceardac în Putna, de sine.

**O. montana** DC. fl. fr. vol. 4 p. 611 (Consp. p. 183).—Stânci, locuri cu iarbă în regiunea subalpină quasi alpină. Buceci în valea Ialomiței la Obârșie și pe Caraimanu (pl. indig. 1899 și 1901); Ceahlău (pl. indig. 1901).

Atât în Conspect cât și în Plantele vasculare ale Ceahlăului am dat pe *O. transsilvanica* Simk. ca sinonim sau același cu *O. montana* DC. de oarece comparând planta carpatică cu aceea din Alpii Delfinatului, ai Helveției și Austriei nu se constată diferențe specifice patente spre a le considera specii deosebite, pentru că cea carpatică ar avea legumenii mai puțin pubescenti și colții lor ceva mai mici, ceea ce o aseamănă cu *O. sativa*.



**O gracillis** Bess. enum. pl. podol. volh. p. 74 n° 927 (Consp. p. 184).—Locuri aspre, în regiunea stepelor. Pe coastele Ialomiței la Urziceni spre Speteni și Borănești; Constanța spre Murfatlar (pl. indig. 1900).

**Hedysarum obscurum** L. syst. nat. ed. X p. 1171 (Consp. p. 184).—Stânci, păsciuni alpine. La Negoiu pe muntele Lespezi; Buceci pe Caraimanu și la Omu (pl. indig. 1901).

**Vicia segetalis** Thuill. fl. paris. p. 367 (Consp. p. 184). — Livezi, locuri ierboase. Curtea-de-Argeș pe Sânicora; Brănești pe la pădurea Cernica; pădurea Tinoasa pe Prahova.

**V. grandiflora** Scop. fl. carn. ed. 2<sup>a</sup> vol. 2 p. 65:—β. *sordida* Grec. consp. p. 185.—Livezi. Govora; Curtea-de-Argeș; Brănești, Ștefănești în Ilfov; Odobești, Panciu.

**V. serratifolia** Jacq. flora austr. append. tab. 8 (Consp. p. 186). — Livezi, tuferișe. Tismana (pl. indig. 1901).

**V. septium** L. spe. p. 1038 (Consp. p. 186).—Tuferișe, pe la pădurea Paltinu în Râmnicu-Sărat; Panciu; Slănic.

**V. pisiformis** L. spe. p. 1034 (Consp. p. 187).—Crânguri. Călimănești, Cozia; Slănic.

**V. cassubica** L. spe. p. 1035 (Consp. p. 187).—Pe la păduri, crânguri. Curtea-de-Argeș pe dealurile Rugetului; Dealu-Mare la Valea Călugărească; Comana la Dadilov.

**V. villosa** Roth. tentam. fl. germ. vol. 2 p. 182 (Consp. p. 187).—Livezi, crânguri. Govora; Curtea-de-Argeș; Brănești, Pantelimon, Cernica; Cotorca, Dudeasca în Ialomița; Slănic.

Adiție:

\* β. *gracillima*. — Scundică, abia ca 20—30 cent. înaltă. Caulul subțire, flexuos, rigid; foile arcuat desfășurate, a 7—8 părechi foliole mănușe: cele mai mari nu trec lungimea de 1 cent. pe aproape lățimea de 2 mm. și sunt lineare, acute și acuminate. Toată planta abundent și hirsut păroasă. La locuri aprice deschise. Brănești.

**V. varia** Host fl. austr. vol. 2 p. 332 (Consp. p. 188).—Livezi, crânguri. Govora, Călimănești; Curtea-de-Argeș la Valea Calului; Ștefănești pe la pădurea Andronache; Brănești.

**V. Cracca** L. spe. p. 1035 (Consp. p. 188).—Livezi, crânguri. Govora; Curtea-de-Argeș, Albești; Panciu în Putna; Slănic pe muntele Pufu.

**Ervum tetraspermum** L. spe. p. 1039 (Consp. p. 189). — Livezi, crânguri. Govora; Ștefănești pe la pădurea Andronache în Ilfov; Slănic în părțile de la vale.

**E. hirsutum** L. spe. p. 1039 (Consp. p. 189). — Livezi, crânguri. Govora; Curtea-de-Argeș; pădurea Andronache în Ilfov.

\* β. *microphyllum*. — Crânguri. Brănești spre pădurea Cernica.

Cu totul mănunțel (*tenuis*) în toate părțile sale verzi: caul, foi și foliole; florile și fructele întocmai cum ale formei specifice.

**Lathyrus Aphaca** L. spe. p. 1029 (Consp. p. 190). — Livezi, tuferișe pe la comuna Gogoși și pe la Burila-Mică în Mehedinț.

**L. hirsutus** L. spe. p. 1032 (Consp. p. 190):—*α. uniflorus* (constans). Livezi. Curtea-de-Argeș pe Sânicora.

**L. tuberosus** L. spe. 1033 (Consp. p. 191).—Livezi, tuferișe. Govora; Curtea-de-Argeș (vulg. *Făscuță*); Isaccea, Greci, Țiganca.

**L. pratensis** L. spe. p. 1033 (Consp. p. 191).—Govora; Curtea-de-Argeș; Brănești; Predeal; Slănic; Greci pe lângă păduri.

**L. platyphyllus** Retz. prodr. fl. scand. ed. 2<sup>o</sup> n<sup>o</sup> 882 (Consp. p. 191).—Crânguri, tuferișe. Govora; Curtea-de-Argeș la Valea-Calului; Brănești; Slănic; comuna Trestiana în Dorohoi.

**Orobis versicolor** Gmel. syst. veget. vol. 2 p. 1108 (Consp. p. 192).—Adiție ca sinonimic: *O. lacteus* M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 2 p. 152 (1808).—Câmpuri, tuferișe. Constanța spre Murfatlar.

**O. laevigatus** W. et. Kit. pl. rar. hung. vol. 3 tab. 243 (Consp. p. 193).—Livezi, tuferișe. Predeal pe coastele despre Schit.

**O. aureus** Stev. in ind. 3<sup>o</sup> hort. petropol. 1837 p. 42 (Consp. p. 192).—Crânguri, tuferișe, pe la pădurea Pustnicu lângă Brănești și la pădurea Andronache în Ilfov.

**O. variegatus** Ten. prodr. fl. napol. 1 p. 62 (Consp. p. 192).—Păduri umbroase. Govora, Călimănești; Ciorogârla, Bragadiru în Ilfov; Comana la Padina-lui-Vasile (pl. indig. 1900); Brănești în pădurea Cernica; Vidra în Putna; Schitul Țâbucani în Neamț; Botoșani (pl. indig. 1890).

Primul său nume ar fi *Orobis venetus* Mill. dict. ed. 8<sup>o</sup> n<sup>o</sup> 8 (1768). La forma specifică proprie caliciul este pubescent, legumenul linear oblung și mănunțel glandular. Există și forma cu caliciul și legumenul cu totul glabre: *O. variegatus* β. *banaticus* Heuff. enum. ban. p. 61, sinonim cu *O. vernus* b) *latifolius* Rochel pl. rar. ban. fig. 36 și *O. rigidus* Lang. ap. Rochel l. c. p. 54.

**O. vernus** L. spe. p. 1028 (Consp. p. 193).—Păduri. Dealu-Mare; Brănești; Piatra-Neamț.

**O. niger** L. spe. p. 1028 (Consp. p. 193).—Păduri umbroase. Govora; Curtea-de-Argeș pe dealurile Hodiei; pădurea Pustnicu, Cernica și la Ciorogârla în Ilfov; Schitul Țâbucani în Neamț.

## DRUPACEÆ DC.

**Amygdalus nana** L. spe. p. 677 (Consp. p. 194). — Stepele Ialomiței și ale Brăilei, pe la Cotorca în crânguri și pe la Rușefu.

**Prunus insititia** L. spe. p. 680 (Consp. p. 195).—Adiție vulg. *Crichin*.

**P. spinosa** L. spe. p. 681.— $\beta$ . *brachypoda* Borb. (Consp. p. 195).—Prin vii la Constanța (pl. indig. 1900).

Caracteristic prin fructele sale ceva mai mari de cum la forma comună a speciei și cam eliptice, aducând întru câtva cu acelea de *Prunus insititia*; foile și rămurile peste tot dens păroase, peri scurți și moi, totul cu aspectul velutin (Grec. pl. indig. 1900 p. 17).

$\gamma$ . *dasyphylla* Schur (Consp. p. 195). — Crânguri, tuferișe. Brănești; Dudeasca, Cotorca în Ialomița; Comana.

Florile și foile apar împreună (*coætaneis*); foile obvers-lanceolate sau cam obovate, la început velutin-păroase, apoi glabre; fructele globoase.

**Cerasus avium** Moench meth. p. 672 (Consp. p. 196).—Păduri în regiunea dealurilor submontane, sporadic. Curtea-de-Argeș frecuent; Govora spre măgura Mătușea-Floarea a rar.

**C. chamæcerasus** Lois. in Duham. arbr. ed. nov. 5<sup>o</sup> p. 29 tab. 5. *C. pumila* Pall. iter. vol. 1 p. 153 (1771) et auct. plur.-non L. (Consp. p. 197).—Crânguri, mărăcinișuri, în stepele Ialomiței pe la Dudeasca spre pădurea Arionoaia.

**Padus Mahaleb** Grec. consp. p. 197.—Adiție: vulgar *Antep*.—Tuferișe pe coastele de la Murfatlar; Greci pe Țuțuiatu și Taița.

### SANGUISORBACEÆ Lindl.

**Poterium polygamum** W. et Kit. pl. rar. hung. vol. 2 tab. 198 (Consp. p. 98).—Livezi, tuferișe. Vârciorova; Govora; Bârlad la Crângu (pl. indig. 1901).

Adiție :

\* *var. minor* Ullepitsch sec. exsic. ab ipso auctore — Livezi, pe la comuna Pârscovu distr. Buzău (pl. indig. 1900).

**Alchemilla vulgaris**  $\alpha$ . L. spe. p. 178 (Consp. p. 198). — Livezi montane. Valea Jiului pe la Lainici (pl. indig. 1901); Parângu; Curtea-de-Argeș pe dealurile Hodiei, Corbeni, valea Argeșului la gura Budei și sus pe Paltina; Monăstirea Șoveja în Putna; Sălnic; Bicz (pl. indig. 1901) și pe Petru-Vodă în Neamțu.

**A. alpestris** Schm. fl. bohem. cent. 3 p. 88 (Consp. p. 198).—Adiție: sinonimu *A. vulgaris*  $\beta$ . L. spe. p. 178.—Livezi subalpine. Predeal, Azuga, Bușteni (pl. indig. 1900).

Adiție dupe *Alchemilla montana* Willd. (Consp. p. 199);

\* **4<sup>b</sup>. A. flabellata** Buser in bull. soc. dauph. 2<sup>o</sup> série 1892 p. 101. *A. pubescens* Koch syn. ed. 2<sup>o</sup> p. 256-non M. Bieb. nec. Lam. dict. illustr. p. 340 (1791). *A. pubescens*  $\delta$ . *flabellata* Burnat fl. alp. marit. vol.

3 p. 140. *A. montana* Lus. 2:  $\alpha$ . *flabellata* Aschers. et Græbn. mitt. europ. vol. 6 p. 403 (1902). *A. hybrida* A. Kern. sched. fl. austr.-hung. fasc. 3 p. 10 (1883)-non L.—4 Iunie. Iulie. Livezi alpine. Parângu la Găuri pe suiş (1800 m.); Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901) și Piatra-Arsă; Ceahlău (pl. indig. 1900).

Între cele precedente diferă prin forma lobilor foilor a pulpane cuneiforme, — iar nu rotunzi sau ovali, — separați prin câte o spintecătură profundă ce trece de  $\frac{1}{4}$  din lățimea limbului și în care parte lobi sunt întregi și numai pe marginea periferiei sunt dentați, dinții ușor conivenți; foile pe pagina superioară verzi și cu peri sporadici, pe cea inferioară și mai ales pe nervure dens păroase și cu aspectu subsericeu; pedicelele florale păroase. În multă asemănare cu cea următoare care diferă prin lipsa cu totul de peri și prin dinții lobilor cam divergenți.

Numirea de *A. fissă* (Consp. p. 199) se va rectifica astfel:

5. *A. glaberrima* Schmidt fl. bohem. incho. cent. 3 p. 89 (1794). Sinonim *A. fissă* Schummel in Wimm. et Grab. fl. siles. vol. 1 p. 136 (1827); Sturm deutsch. fl. fasc. 56; Koch syn. p. 256; Schlechtd. Langeth. deutsch fl. vol. 25 fig. 2544 exclus. synonymis. *A. pyrenaica* Dufour; Gren. Godr. fl. fr. vol. 1 p. 565 (1848).—4 Iulie. August. Regiunea alpină. Buceci pe Caraimanu (Consp. l. c. și pl. indig. 1901); în Parângu pe Mirul-Mare.

Adiție:

\* 6. *A. alpina* L. spe. p. 170 exclus. var.  $\beta$ ; DC. prodr. vol. 2. p. 589; Sturm deutsch. fl. fasc. 51; Koch syn. p. 257; Ledeb. fl. ross. vol. 2 p. 30; Gren. Godr. fl. fr. vol. 1 p. 564.—4 Iunie. August. Regiunea alpină, pe Ceahlău (Grec. pl. indig. 1900 p. 18 și pl. vascul. céahl. p. 32; adusă de Gh. Grințescu în anii 1899, 1900 și 1905).

## ROSACEÆ Juss.

*Spiræa ulmifolia* Scop. fl. carn. vol. 1 p. 349 tab. 22 (Consp. p. 200).—Stânci, tuferișe, în regiunea montană. Pe Lotru la Voineasa și Vidra; Cheea-Argeșului, multă, și în valea Caprei; Buceci la Urlătoarele și pe Caraiman (pl. indig. 1900 și 1901); Petru-Vodă în Neamțu.

*S. crenata* L. spe. p. 701 (Consp. p. 200).—Tuferișe și păduri pe coaste aspre sau pietroase. Greci pe Pricopan, Țuțuiașu și Taița (vulg. acolo *Tavalga*).

*S. Aruncus* L. spe. p. 702 (Consp. p. 200).—Ceahlău, livezile pe Izvorul-Alb, frecventă.

*S. Ulmaria* L. spe. p. 702 :— $\alpha$ . *denudata* Koch syn. p. 231 (Consp. p. 201).—Stânci tuferișe în regiunea montană. Voineasa; Cheea-Argeșului și în sus la Cumpăna pe valea Budei și pe valea Crepei; Slănic.

*β. discolor* Koch l. c. (Consp. l. c.)—Crânguri, tuferișe. Păiuș; Voineasa; Slănic.

**S. Filipendula** L. spe. p. 436 (Consp. p. 201). — Livezi în părțile dealurilor. Govora; Curtea-de Argeș până la Corbeni; Odobești, Panciu.

**Dryas octopetala** L. spe. p. 717 (Consp. p. 201).—Regiunea alpină. Piscurile Podeanului la Negoiu (pl. indig. 1899) și pe Lespezi; Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901); Ceahlău (pl. indig. 1899 și 1900).

**Geum Aleppicum** Jacq. icon. rar. tab. 93 (Consp. p. 202). Livezi montane. Pe Argeș sus la Cumpăna la gura Budei în liveze, puțin; Slănic mult; Bicaș (pl. indig. 1899).

**G. rivale** L. spe. p. 717 (Consp. p. 202).—Tuferișe în văile montane umede umbroase. Pe Lotru la Voineasa, Vidra; pe Argeș la Cumpăna în valea Caprei și în valea Budei, pe Negoiu la poalele Podeanului; Predeal pe Clăbucetu-Taurului; Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901).

**G. montanum** L. spe. p. 717 (Consp. p. 202).—Stânci, livezi în regiunea alpină. Pe Culmea Parângului pe la 2020 m.; pe Negoiu și Zănoaga în Argeș (pl. indig. 1899), pe Lespezi și Paltina; Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901); Ceahlău (pl. indig. 1900).

**G. reptans** L. spe. p. 717 (Consp. p. 203).—Piscurile alpine superioare. Negoiu; Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901).

**Fragaria collina** Ehrh. Beitr. vol. 7 p. 26 ann. 1792 (Consp. p. 203).—Adiție: sinonimu *F. viridis* Duchesne hist. natur. des fraises p. 135 (1766) numire de și anterioară, totuși negeneralizată față de numirea dată de Ehrhart și în uz de autorii urmași. *F. campestris* Stev. in bull. soc. natur. mosc. tom. 19 part. 2<sup>o</sup> p. 176 (1856). — Adiție: Brănești pe la pădurea Cernica; Panciu; Bârlad.

**F. elatior** Ehrh. Beitr. vol. 7 p. 23 ann. 1792 (Consp. 203). Adiție, sinonimu *F. moschata* Duchesne l. c. p. 145 (1766).

**Comarum palustre** L. spe. p. 718 (Consp. p. 204).—Locuri umede: tinoase. Comănești distr. Bacău.

**Potentilla supina** L. spe. p. 711 (Consp. p. 204). — Locuri joase umede sau scurse. Roșiori în Teleorman; pe la pădurea Dascălu-Creața în Ilfov plasa Mostiște.

**P. Anserina** L. spe. p. 710:—*α. discolor* Wallr. sched. crit. 1 p. 236 (Consp. p. 204).—Locuri joase, pe lângă părâuri. Govora pe valea Hinței; Curtea-de-Argeș; Vaslui (pl. indig. 1900).

*β. concolor* Wallr. l. c. (Consp. l. c.). — Mărășești distr. Putna (pl. indig. 1900); Ceamurile-de-Sus lângă Tulcea (pl. indig. 1899).

**P. recta** L. spe. p. 711 (Consp. p. 205).—Livezi, crânguri. Comuna Brazi distr. Prahova (pl. indig. 1899); Bârlad la pădurea Balaurului (pl. indig. 1901); Buda, Rafaila distr. Vaslui (pl. indig. 1900); Greci.

**P. obscura** Willd. spe. pl. vol. 2 p. 1100 (Consp. p. 205).—Adiție: sinonimu *P. corymbosa* Moench meth. suppl. p. 279 (1802). *P. leucotricha* Borb. pro parte ap. Aschers. u. Græbn. mitt. europ. vol. 6 p. 785, și cu rectificarea: Lehm. monogr. • potent. p. 82.—Adiție: Curtea-de-Argeș, Albești; Slănic.

**P. pilosa** Willd. spe. pl. vol 2 p. 1100 (Consp. p. 205). Livezi, tuferișe. Curtea-de-Argeș pe dealuri; Odobești; Cotorca; Botoșani pe dealuri (pl. indig. 1900); Slănic pe muntele Pufu; Constanța prin vii.

**P. astrachanica** Jacq. icon. rar. 1 tab. 92 (Consp. p. 206).—Locuri pietroase sau aspre. Munții Măcinului la poale (pl. indig. 1899); Constanța spre vii (pl. indig. 1900).

**P. taurica** Willd. in mag. d. geselsch. naturf. freunde zu berlin p. 291 (Consp. p. 206).—Câmpuri, locuri pietroase. Constanța spre Kislea.

Numirea de *Potentilla læta* Rchb. (Consp. p. 206) se va rectifica astfel:

8. **P. pedata** Willd. enum. hort. berol. suppl. p. 38 (1809); Nestl. mono. potentill. tab. 7; Halácsy consp. fl. græc. vol. 1 p. 509. *P. hirta* v. *pedata* Lehm. revis. potentil. p. 86. *P. læta* Rchb. fl. germ. excurs. p. 595 (1833); Zimmet. in A. Kern. sched. fl. austro-hung. spe n<sup>o</sup> 825. *P. hirta* Sturm deutsch. fl. fasc. 91; Koch syn. p. 237; Lehm. monogr. gen. potentill. p. 88 tab. 8! et auct. plur. non L. *P. hirta* β. *pinnatifida* et var. *subsericea* Griseb. spicil. fl. rumel. vol. 1 p. 97. — 4 Iunie. Iulie. Locuri pietroase la Castelul Genovez lângă Ienissala distr. Tulcea (consp. p. 206); Greci pădurea Taița; stepele Ialomitei pe la Hagieni, Țândărei.

În Conspect am și făcut observația că exemplarele noastre zise *P. læta* Rchb., prin aspectul și morfologia externă, nu difer întru nimic de exemplarele scundace de *P. pedata* Nestl. astfel cum sunt distribuite de V. Engelhardt în 1897 și culese lângă Triest la Santa-Saneta. De aceea, cu toată competența cunoscută a lui Zimmerer în materie de Potentille, după care ne am condus la numirea acestei specii, astăzi revenim la modul nostru de vedere, sprijinit fiind și de acela al eminentului confrate Dr. Eug. Halácsy din Viena.

**P. canescens** Bess. prim. fl. galiz. vol. 1 p. 330 (Consp. p. 207).—Câmpii. Ploști, Buda pe lângă calea ferată (pl. indig. 1899); Brănești.

**P. argentea** L. spe. p. 712 (Consp. p. 207).—Locuri cu iarbă, pe lângă căi urbane și rurale.—Govora; Curtea-de-Argeș; Ștefănești pe la pădurea Androoache în Ilfov.

β. *impolita* Wahlenb. carp. princip. p. 155 (1814) et auct. pl. *P. neglecta* Baumg. enum. transs. vol. 2 p. 63 (1816). *P. incanescens* Opiz. nat. tausch. p. 136 (1824). *P. albo-villosa* Schur enum. transs. p. 191 (1866).—Locuri aprice, locuri deschise. Comana.

Adiție:

\* *γ. dissecta* Wallr. sched. crit. p. 237 (1822).—Livezi în parcul de la Șosea în București.

**P. microdons** Schur: — *β. cano-viridis* Grec. consp. p. 207. *P. collina* var. *cano-viridis* Schur æst. bot. zeit. 1859 p. 208.—Locuri uscate, aspre sau pietroase. Curtea-de-Argeș pe Sânicora; Bârlad la Crângu (pl. indig. 1901).

**P. chrysanth** Trevir. ind. semin. h. vratisl. 1818 p. 5 (Consp. p. 207).—Tuferișe pe locuri pietroase. Tot la Vârciorova pe Bahna la gura Cero-vățului (în anul 1907).

*β. thuringiaca* Grec. consp. p. 208. **P. thuringiaca** Bernh. ap. Link. enum. hort. berol. vol. 2 p. 64.—Regiunea alpină. Parângu pe Prislopu și Miru-Mare; Negoii pe Lespezi; Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901 și *forma incinso-dentata* Marc. Br. anu 1906); Ceahlău (pl. indig. 1900).

**P. patula** W. et Kit. pl. rar. hung. vol. 2 tab. 194 (Consp. p. 208).—Locuri ierboase deschise. Odobești; Cotorca pe la pădurea Arionoea în Ialomița.

**P. rubens** Crantz stirp. austr. fasc. 2 p. 75 (Consp. p. 208).—Locuri ierboase deschise, petriș cu iarbă mănuntă. Călărași; Râmnic; Pitești pe la Stâncei (pl. indig. 1901); Bușteni (pl. indig. 1899), Sinaia (Mrc. Br. în 1906); Buda, Ploești.

**P. aurea** L. cent. 2<sup>o</sup> in amœnit. acad. vol. 4 p. 316 (Consp. p. 208).—Regiunea alpină. Rarău, Pietrile-Doamnei; Ceahlău (pl. indig. 1899 și 1900).

**P. maculata** Pourr. mém. acad. toulous. vol. 3 p. 316 (Consp. p. 209).—Regiunea alpină superioară. Buceci la Omu (pl. indig. 1901); Negoii pe muntele Lespezi.

**P. arenaria** Borkh. in fl. der wetter. vol. 2 p. 248 (Consp. p. 209).—Adiție: sinonimu *P. incana* Mœnch meth. suppl. p. 249 (1802).—Locuri uscate și cam cu petriș. Onești distr. Bacău; Iași dealurile la Păcurari și pe la Botoșani (pl. indig. 1900 și 1901); Măcin pe munții Pricopanului.

**P. alba** L. spe. p. 713 (Consp. p. 210).—Crânguri, locuri ierboase. Dealurile la Valea-Mare lângă Pitești (pl. indig. 1901); Câmpulung; Brănești pe la pădurea Cernica; Cotorca pe la pădurea Arionoea în Ialomița; Comănești în Bacău; dumbrava de la Petricani în Neamțu (pl. indig. 1900)

**P. chrysocraspeda** Lehm. semin. hort. hamburg. 1849 etiam revis. potentill. p. 160 tab. 154 (Consp. p. 210).—Livezi, păsciuni în regiunea alpină. Parângu pe Mirul-Mare; Surul; Negoii (pl. indig. 1899 și 1900), pe Lespezi și Paltina în Argeș; Buceci (pl. in lig. 1900); Slănic pe muntele Șandru.

*β. minor* Boiss. fl. orient. vol. 2 p. 725 (Consp. p. 210).—Culmea Bucecilor la Omu (pl. indig. 1899).

**P. micrantha** Ram. ap. DC. fl. fr. vol. 4 p. 468 (Consp. p. 201).—

Tuferișe, pe coastele dealurilor la Baea-de-Aramă (pl. indig. 1900); pe muntele Clăbucetu în Argeș.

**P. silvestris** Neck. delic. gallo belg. p. 222 (Consp. p. 210).—Lizezi, crânguri, tuferișe alpine, subalpine. Pe muntele Paltina și Arefu în Argeș; Slănic pe muntele Pufu și pe Șandru; Bicaz (*P. Tormentilla* Grec. pl. indig. 1900).

**Rubus saxatilis** L. spe. p. 708 (Consp. p. 211).—Văi, vâlcele în regiunea alpină. Negoii; Buceci sus pe Valea-Cerbului (pl. indig. 1901); Ceahlău la Șea (pl. indig. 1900).

**R. caesi**us L. spe. p. 706 (Consp. p. 211).—Tuferișe, marginea pădurilor, drumuri. Govora; Curtea-de-Argeș, Albești; Focșani, Odobești; Măcin, Greci.

**R. agrestis** W. et Kit. pl. rar. hung. vol. 3 tab. 268 (Consp. p. 212).—Brăila în Ostrovul Chiciu-Măcinului, Măcin, Turcoaia.

**R. tomentosus** Borkh. in Roem. neu-magas. bot. st. 1:—*α. canescens* Grec. consp. p. 213.—Crânguri, pe la pădurea Andronache lângă Ștefănești și pe la pădurea Pustnicu la Brănești; Măcin, Greci.

*β. glabratus* Godr. monogr. p. 27 ex descriptione (Consp. p. 213).—Crânguri pe la pădurea Andronache; Comana.

Adiție:

\* *γ. Barthianus* Borb. ex Bænitz herbar. europ. prospect ann. 1892 p. 2 n°. 6597 solum nomen. Planta nostra cum speciminibus ab J. Barth è Transsilvania comparata exacte conjungitur.—Locuri deschise. Comana, calea ferată spre Gurbanu. Intermediară celor două precedente varietăți *α, β*.

**R. Radula** Weihe et Nees rubr. germ p. 89 (Consp. p. 213).—Crânguri în regiunea montană la Călimănești.

**R. hirtus** W. et Kit. pl. rar. hung. vol. 2 tab. 114 (Consp. p. 213).—Tuferișe, păduri, în văi montane. Voineasa pe valea Jidoaea; Cheea-Argeșului și în sus la Cumpăna în valea Caprei și pe muntele Lespezi la Negoii; Predeal (pl. indig. 1899); Slănic.

**R. Idæus** L. spec. p. 707 (Consp. p. 213).—Tuferișe în părțile montane subalpine. Voineasa în valea Jidoaea; Cheea-Argeșului, la Cumpăna și pe muntele Lespezi în Argeș; Monăstirele Cheea și Suzana în Prahova; Slănic.

**Rosa austriaca** Crantz stirp. austr. vol. 1 p. 86 (Consp. p. 214).—Adiție: vulgar *Ruxandre*.—Câmp, pe la mărăciniș. Dealu-Mare la Valea-Călugărească; Băneasa, Herăstrău; Cotorca în Ialomița.

**R. canina** L. spe. p. 714 (Consp. p. 215).—Crânguri, și mărăciniș, pe lângă căi. Curtea-de-Argeș, Albești.

Din grupa *Canine nude* sau *leiofile*, zise încă *Lutetianæ transitoriae isodontæ* (Crép.). Ramicielele florale foarte scurte, orizontale, cu totul glabre și inermes: *var. leioclada*; foliolele ovate lăticele, ne-





lucioase și simplu-serate (isodonte); cele petiolurile cu totul glabre; receptaculul (fructul) ovoid cam prelung — nu globos; pedunculii scurticei: ei și receptaculii neglanduloși; stilurile pėjoase.

**R. dumalls** Bechst. forstbot. p. 241 (Consp. p. 215). — Mărăciuiș, Curtea-de-Argeș; Piatra-Neamțu pe Petricica; Dealu-Mare.

Din grupa *Canine biserate* (Crép.), stilurile pėjoase (ved. Grec. Consp. l. c.).

**R. bisserrata** Méral fl. paris. p. 190 (Consp. p. 216). — Crânguri, mărăciuiș. Țâbucani distr. Neamțu; Dealu-Mare la Valea-Călugărească.

Din aceeași grupă cu precedentă (ved. Grec. l. c.) de care abia diferă, doar prin sepelele sale glanduloso-ciliate și prin florile sale câte 2—4 la extremitatea ramurilor florente—iar nu solitare.

**R. dumetorum** Thuill. fl. paris. p. 250 (Consp. p. 216).—Crânguri, mărăciuișuri, margini de pădure. Govora; Craiova în lunca Jiului; Brănești.

Din grupa *Caninelor pubescente* (Crép.—ved. Grec. consp. l. c.); apoi Adiție:

\* *δ. hemitricha* Rip. ap. Déséglise catal. raison. gen. rosier; Borb. ros. p. 427 și 436. — Locuri aprice aspre cu tuferișe. Pe malurile mării la Techirghiol-Movilă și pe marginea lacului în fața stabilim. balnear.

Stilurile alburii lanate, reunite; fructul ovoid sau cam globos stacoziu, glabru, sepelele reflexe, pedunculii cam scurticei egalez stipulii, glabri cum și fructul; foliolele foilor ovate, cam acute, pe desubt pubescente pe coastă și nervure, marginile biserate, denticulele glandulifere, petiolurile pubescente, glanduloase și aculeolate.

Și dupe aceasta, adiție:

\* **9<sup>b</sup>. R. transsilvanica** Schur enum. transs. p. 202 (1866); Simk. enum. transs. p. 210; Borb. prim. ros. hung. p. 400 (1880); Braun in A. Kern. sched. ad fl. exic. austro-hung. n<sup>o</sup> 1264. *R. andegavensis* Bast. var. *transsilvanica* Sabransky exsic. in Dörfler tauschanst. ann. 1909. *Rosa andegavensis* var. *bihariensis* Borb. l. c. p. 399 et 403.—4 Mai. Iunie. Craiova în lunca Jiului.

Din grupa *Caninelor hispide* (Déséglise).

Arbust ca de 1 m.—1,50 având ramurile de un roșu închis, cele bătrâne aproape lipsite de ghimpi: aceștia puternici, dilatați la bază, ascuțiți și la vârf curbați. Foliolele eliptice, subbiserate, cele inferioare mici și cam rotunde, seraturele tuturilor înclinate și curbate, petiolii aculeați; petiolii cât și foliolele glabre, netede și concolore; stipulii ovați, acumi-nați și glanduloși. Florile de un roz purpuriu, odorifere, au laciniiile caliciului pinatifide și aproximativ cât corola în lungime; pedunculii, receptaculul și laciniiile caliciului cu glandule măricele stipitate și în amestec cu glandule mici sesile.

În loc de *Rosa adenophora* ca specie (Consp. p. 218 n<sup>o</sup>. 14) se va pune:

\* 14. *R. alpina* L. spe. p. 703 typica, ex Willd. spe. pl. vol. 2 p. 1076: «folia glabra»; Koch syn. ed. 2<sup>o</sup> p. 248 var.  $\alpha$ ; Schlechtd. Langeth. deutsch. fl. vol. 25 fig. 2625. *R. alpina* a) *atrachophylla* Borb. prim. ros. hung. p. 527.— 4 Iunie. Iulie. Stânci, locuri pietroase montane subalpine. Valea Roșnovei la Predeal (pl. indig. 1900); Piatra-Neamțu pe muntele Cozla sus pe la pădure.

Arbust scundac, ca 30—50 cent. înălțime. Trunchiul și ramurile având epidermul cu numeroase lenticile și *cu totul lipsite de ghimpți*, ramurile purpurine și scurte. Foile 2—3-jugate, foliola terminală mai mare (0<sup>m</sup>,02—0<sup>m</sup>,03 lung. pe 0<sup>m</sup>,01—0<sup>m</sup>,013 lățime), cele laterale, mai ales cele de la bază mai mici, cam oblung-eliptice sau ovale, simplu serate, pe a locuri cu serratură 2-serulate: toate discolore și glabre pe pagina superioară, *glauce și glabre pe cea inferioară sau ușior păroase numai pe nervura principală cu peri culcați*; pețiolul comun asemenea glabru, uneori cu câțiva perișori glandulari foarte rari și scurți; stipulii celor mai tinere ușior dilatați și la bază cunești. Florile axilare, *pedunculii și receptaculii cu totul glabri*, netezi, de un oacheș-purpuriu; *sepalele mult mai lungi cât corola, foliaceu dilatate la vârf și întregi, cu totul glabre pe fața dorsală, persistente și la fructificare conivente*; petalele purpurii, însă gălbînicioase în partea unghiculară, inodore; fructul roșiu, elipsoid și ușior atenuat spre extremități; *pedunculii ușior arcuato-nutanți* (Grec. pl. indig. 1900 p. 19).

$\beta$ . *adenophora*.—*R. adenophora* Kit. in Schult. œster. fl. vol. 2 ann. 1814 p. 69; Borb. prim. ros. hung. p. 528; Grec. consp. p. 218.—Huc. pertinet etiam *R. alpina forma adenosepala* Borb. l. c. p. 529 et *forma stenodonta* Borb. l. c. p. 30.—Stânci subalpine. Pe Lotru la Voineasa valea Jidoaea, Vidra; Cheea-Argeșului și sus la Cumpăna pe valea Caprei; Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901); Predeal pe valea Roșnovei (pl. indig. 1900); pe muntele Cozia (*R. adenophora*  $\beta$ . *balsamea* s. *recurva* Grec. consp. p. 218 sec. Borb. ex descriptione: *foliola utrinque pubescentia*); Ceahlău.

Diferă de forma tipică lineană prin pedunculii, receptaculii și sepalele sale învestite cu denși peri setiformi glanduliferi (ved. Grec. consp. p. 218).

*R. spinosissima* L. spe. p. 705 (Consp. p. 219).—Caracal prin vii (pl. indig. 1900); Greci pe dealuri (Dobrogea).

*Agrimonia Eupatoria* L. spe. p. 643 (Consp. p. 219). Livezi, poeni. Govora; Curtea-de-Argeș, Albești; Sinaia; Slănic.

*A. odorata* Mill. dict. ed. 8<sup>o</sup> n<sup>o</sup> 3 (1768); Ait. hort. kew. ed. 1<sup>o</sup> vol. 2 p. 130 (1789); DC. prodr. vol. 2 p. 588; Koch syn. p. 245; Boiss. fl. orient. vol. 2 p. 728; Schlechtd. Lang. deutsch. fl. vol. 25 fig. 2620.

*A. procera* Wallr. in linnæa vol. 14 p. 373 (1840). Consp. p. 219.—Poeni, tuferișe. Valea Lotrului; Sinaia; Slănic pe muntele Pufu; Constanța în vii (pl. indig. 1900); Techirghiol-Movilă pe malul mării.

**Aremonia agrimonoides** Neck. elem. n° 768 (Consp. p. 219).—Păduri, tuferișe, crânguri; în regiunea dealurilor. Otelești-de-Sus pe la pădure distr. Oltu; Valea-Popei în Muscel (pl. indig. 1901).

### POMACEÆ Lindl.

**Cratægus monogyna** Jacq. fl. austr. vol. 3 tab. 292 (Consp. p. 220):—*var. a. glabrescens* Grec. l. c.—Govora; Curtea-de-Argeș, Albești; Predeal în valea Roșnovei (pl. indig. 1900); Brănești.

β. *hirsuta* Grec. consp. p. 220.—Severin; Govora; Burdujeni (*Cr. monogyna var. kyrtostyla* Grec. pl. indig. 1899).

γ. *fissa* Bosc ap. DC. prodr. vol. 2 p. 628 (1825). *Mespllus fissa* Lam. encycl. méth. vol. 4 suppl. p. 72 (1817). *Cratægus laciniata* Stev. ap. Bess. enum. pl. volh. podol. bess. p. 58 (1822); Grec. consp. p. 220-non Ucria in Rœm. arch. vol. 1 p. 169 (1796). Coaste tari și pietroase. Vârciorova pe Bahna și spre Schela-Cladovei (*C. laciniata* Grec l. c.); Comana spre valea lui Balotă (pl. indig. 1900).

**C. pentagyna** W. et Kit. in Willd. spe. pl. vol. 2 p. 1006 (Consp. p. 220).—Crânguri, margine de pădure la Brănești.

**C. nigra** W. et Kit. pl. rar. hung. vol. 1 tab. 61 (Consp. p. 220).—păduri și pe la margini. Comana (pl. indig. 1900).

Florile pentagine, fructele mature negre; rămurelele, pedunculii și receptaculul cu abundenți peri împăsliți, foile glabre pinat-laciniate.

**Cotoneaster integerrima** Medik. gesch. d. botan. p. 84 (Consp. p. 221).—Regiunea alpină. Buceci pe la Schitul Ialomiței (pl. indig. an. 1899); Ceahlău stâncile subt Piatra-Lată; Tismana pe Cioclovina.

Genul **Pyrus** (Consp. p. 221), dupe adevărata ortografie etimologică, să se scrie **Pirus**, numire de origină celtică și nu elină.

**Malus communis** Lam. illustr. vol. 1 p. 435 (Consp. p. 222).—

Adiție:

\* *var. semperflorens*.—Măr ce înflorește de două ori pe an. La Curtea-de-Argeș în grădina episcopiei, un bătrân pom ce, cum ni s-a spus, datează încă din anul 1859. Noi am cules rămuri înflorite în Iulie la S-tu Ilie, a doua oară a înfloririi sale.

**Sorbus Aucuparia** L. spe. p. 683 (Consp. p. 222).—Păduri, tuferișe, în părțile montane. Govora dealurile despre măgura Mătușea-Floarea foarte rar; valea Oltului și pe Lotru la Voineasa; Cheea-Argeșului și la Cumpăna pe valea Caprei; Greci păd. Taița.

Numirile *Sorbus Aria* Crantz și *S. intermedia* Schult (Consp. p. 223) de înlăturat și înlocuite precum urmează:

\* 4. *S. Mougeoti* Soyer-Willm. et Godr. în bull. soc. bot. de france vol. 5 p. 447 (1858); A. Kern. sched. fl. exsic. austro-hung. fasc. 7 n° 2445. *S. Aria* Crantz stirp. austr. ed. 1<sup>o</sup> fasc. 2 p. 46 ex parte, tab. 2 fig. 2 (1763)-non *Cratægus Aria* L. spe. ed. 1<sup>o</sup> p. 475 (1753). *S. scandica* var. *Mougeoti* Nym. consp. p. 241; Zabel handb. laubholzben. p. 198. *Pirus intermedia* Schult. æster. fl. ed. 2<sup>o</sup> vol. 2 p. 61 (1814)-non Ehrh. beitr. vol. 4 p. 20 (1789). *Aria intermedia* Schur enum. transs. p. 207 (1866). *Pirus Mougeoti* Aschers. u. Graebn. mitt. europ. vol. 6 part. 2<sup>o</sup> p. 93 (1906).—‡ Mai. Iunie. Păduri montane, submontane. Câmpulung, Valea-Mare în Muscel (*S. Aria* și *S. intermedia* Grec. consp. p. 223); Iași pe la Răpedea (*S. intermedia* Grec. 1. c.); valea Oltului pe la Căineni.

Arborce cu puțin diferă de *S. intermedia* Ehrh. propriul zis: prin statura sa mediocră, mai scundă și chiar a de arbust — iar nuașii de înalt 10—17 m. ca cel lalt; — prin foile sale mai prelungi, eliptice sau cam ovate, îndoit de lungi pe cât de late (0<sup>m</sup>,07—0<sup>m</sup>,10 lungime, pe 0<sup>m</sup>,035—0<sup>m</sup>,055 lățime) vârful rotund, baza întreagă cuneată, marginea incins-dentată, dar spre bază pinat-lobată în lobi profunzi, parareli, ovato rotunzi, antrorsi și ușor incis-dentați; indumentul lor tot asemenea alb sau alburiiu-tomentos pe pe desubt, iar pagina superioară de un verde închis glabrescentă sau araneoasă. Fructul globoid roșu, în grosime ca 1 cent. în diametru.

#### CENOTHERACEÆ Ach. Rich.

*Epilobium angustifolium* β. L. spe. p. 493 (Consp. p. 223).—Păduri în regiunea montană și submontană. — Pe Lotru la Voineasa; Govora; Curtea-de-Argeș dealurile la Rîpa-cu-brazi; Cheea-Argeșului și la Cumpăna; Mănăstirea Cheea și Suzana în Prahova; munții Slănicului.

*E. Dodonæi* Vill. prosp. p. 45 (Consp. p. 223).—Prundurile apelor în văile montane inferioare. Valea Oltului la Călimănești; Valea Argeșului pe la Albești, Oești; Bușteni, Sinaia (pl. indig. 1899) valea Slănicului.

*E. hirsutum* α. L. spe. p. 494 (Consp. p. 224). — Pe locuri joase umede sau pe lângă cursul apelor. Govora valea Hinței; Curtea-de-Argeș. Corbeni; Predeal (pl. indig. 1899); Brănești; Cotorca în Ialomița; Agiud.

Adiție:

\* β. *subglabrum* Koch syn. p. 265.—Crivina pe la pădurea Tinoasa,

*E. parviflorum* Schreb. spicil. fl. lipsc. p. 146 (Consp. p. 224). — Locuri joase ude sau scurse, pe lângă cursul apelor. Govora; Curtea-de-Argeș; Brănești; Crivina pe la pădurea Tinoasa; Cotorca în Ialomița; Slănic; Ceahlău; Piatra-Neamțu.

**E. montanum** L. spe. p. 494 (Consp. p. 224).—Păduri în regiunea montană și submontană. Voineasa în valea Jidoaea; Govora; pădurea Cotmeana în Argeș (pl. indig. 1899); pe Argeș la Cumpăna în valea Caprei și pe Arefu; Piatra-Neamțu pe Cernegura (pl. indig. 1900) și pe muntele Petru-Vodă.

**E. lanceolatum** Seb. et Maur. fl. romana prodr. p. 138 tab. 1 fig. 2 (Consp. p. 225).—Coastele montane la Brezoiu în Vâlcea.

**E. collinum** Gmel. fl. baden. vol. 4 p. 265 (Consp. p. 225).—Locuri pietroase, stânci cu răși de tuferișe. Curtea-de-Argeș pe dealurile vecine, Cheea-Argeșului și la Cumpăna; pe Teleajen la Cheea; Slănic; valea Jiului pe la Păiuș, Lainici.

**E. roseum** Schreb. spicil. fl. lipsc. p. 147 (1771); Sturm deutsch. fl. fasc. 81; Koch syn. p. 267; Gren. Godr. fl. fr. vol. 1 p. 580; Boiss. fl. orient. vol. 2 p. 749; Schlechtd. Langeth. deutsch. fl. vol. 22 fig. 2266; Grec. consp. p. 225. **E. tetragonum** L. spe. p. 494 sec. Halácsy consp. fl. græc. vol. 1 p. 555.—Locuri pietroase cu tuferișe. Vârciorova pe valea Bahnei; valea Oltului la Cozia spre Brezoiu; Predeal; munții Slănicului.

**E. tetragonum** L. spe. p. 494; Sturm deutsch. fl. fasc. 81; Koch syn. p. 267; Gren. Godr. fl. fr. vol. 1 p. 579; Boiss. fl. orient. vol. 2 p. 748. Nym. consp. p. 247; Grec. consp. p. 225. **E. adnatum** Griseb. botan. zeit. tom. 10 p. 854 (1852); Halácsy consp. fl. græc. vol. 1 p. 554.—Locuri umede sau scurse. Crivina la pădurea Tinoasa; Brănești, pădurea Pustnîcu; Curtea-de-Argeș la Valea-Calului.

Aceste din urmă două specii intră în categoria celor *s i n s t i g m a t i c e* (stigmele reunite în capitul), având caulii a câte 2 sau 4 dungi subțiri ce se lasă din limbul, petiolul sau nervura mediană a foilor; tulpina radicală boantă și lipsită de stoloni, semințele subtil-papilate. Însă, aceea cu bobocii florali aplecați (nutanți) și foile pețiolate sau atenuate în scurt petiol urmează să poarte numele *E. roseum* Schreb. după autorii ce citarăm; pe când Haussknet și Halácsy o consideră a fi adevăratul *E. tetragonum* L.; iar aceea ce are bobocii florali erecți și foile sesile, al căror limb se prelinge direct pe caul în dungi subțiri, «substanța sua foliaceea adnato-decurentia», urmează să poarte numirea *E. tetragonum* L. după autorii supracitați, pe când Haussknet și Halácsy nu o consideră drept adevăratul *E. tetragonum* L. și adoptează numirea de *E. adnatum* Griseb.

**E. trigonum** Schrank bayer. fl. vol. 1 p. 644 (Consp. p. 226).—Locuri umede sau tinoase pe lângă apșoare în regiunea montană. Valea Argeșului la Cumpăna pe valea Caprei și pe Buda; Predeal în valea Roșnovei.—Ca numire mai veche ar fi **E. alpestre** Jacq. enum. h. vind. p. 239 (1762).

**E. obscurum** Schreb. spicil. fl. lipsc. p. 147 (Consp. p. 226).—Locuri umede păduroase, în munții Slănicului.

**E. palustris** L. spe. p. 495 (Consp. p. 226). — Păduri montane în locuri tinoase. În munții Slănicului.

**E. alsinefolium** Vill. prosp. p. 45 (Consp. p. 226). — Regiunea alpină. Parângu la Găuri; Negoiu (pl. indig. 1899).

**E. alpinum** L. spe. p. 495 (Consp. p. 226). — Regiunea alpină. Parângu pe Mândra; Negoiu (pl. indig. 1899).

**Circœa lutetiana** L. spe. p. 12 (Consp. p. 227). — Păduri în regiunea montană și submontană. Govora; Curtea-de-Argeș pe dealurile vecine și în valea Argeșului până la Cumpăna; munții Slănicului.

**C. intermedia** Ehrh. Beitr. vol. 4 p. 42 (Consp. p. 227). — Păduri montane subalpine în regiunea Coniferelor. Voineasa în valea Jidoaei; Sinaia; Slănic pe muntele Dobrului.

**C. alpina** L. spe. p. 12 (Consp. p. 228). — Stânci alpine și subalpine în văi umede umbroase. Parângul spre culmea Mirului-Mare; valea Argeșului la Cumpăna; pe Negoiu (pl. indig. 1899) și pe muntele Lespezi; munții Slănicului; Ceahlău (pl. indig. 1900).

**Trapa natans** L. spe. p. 175 (Consp. p. 228). — Adiție: vulgar *Ciulină*. *Ciulină*. *Coada-boului*. *Șulină*. În bălțile dunărene la Galați în Brateș, la Măcin în bălțile Carcaliu și Iglița; lângă București pe Colentina în heleșteul din Fundeni-Mărcuța.

#### HALORAGIACEÆ Ach. Rich.

**Myriophyllum spicatum** L. spe. p. 1410 (Consp. p. 428). — În ape limpezi stagnante, și în bălți. Brăila; pe Bistrița la Săvinești distr. Bacău (pl. indig. 1900); pe Colentina în heleșteul Bufta și în cel din Fundeni-Mărcuța.

#### RIBESIACEÆ Endl.

**Ribes Grossularia** L. spe. p. 291: — *α. glanduloso-setosum* Koch syn. p. 292 (Consp. p. 229). — Stânci montane alpine și în văi subalpine. La Negoiu pe muntele Lespezi și în valea Caprei la Cumpăna; Buceci la poalele Caraimanului; Ceahlău pe stâncile de la Boambe.

**R. alpinum** L. spe. p. 291 (Consp. p. 229). — Stânci alpine. Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901); sus pe Lotru la Vidra.

**R. petræum** Wulf. ap. Jacq. miscell. vol. 2 p. 36 (Consp. p. 229). Stânci alpine. Ceahlău (pl. indig. 1900 și Grinț. exsic. în 1906).

#### SAXIFRAGACEÆ DC.

**Saxifraga aizoon** Jacq. fl. austr. vol. 5 p. 18: — *α. brevifolia* Sternb. (Consp. p. 230). — Buceci la Omu (pl. indig. 1901); Ceahlău (pl. indig. 1899).

*β. recta* Ser. in DC. prodr. vol. 4 p. 19 (Consp. p. 230).—Regiunea alpină. Negoiu (pl. indig. 1900); Ceahlău (pl. indig. 1899 și 1900).

*γ. intacta* Willd. enum. h. berol. vol. 1 p. 75 (Consp. l. c.).—Regiunea alpină. Parângu la Găuri pe Piatra-Tăiată; pe Surul și Prislopul în Argeș (pl. indig. 1899) și la Negoiu pe Lespezi; Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1899 și 1900).

*S. cultrata* Schott Nym. Ky. analecta p. 23 (Consp. 231). — Stânci alpine. Surul și Prislopul în Argeș (pl. indig. 1899); Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901); Ceahlău (pl. indig. 1900).

*S. demissa* Schott oest. bot. zeit. ann. 1859 p. 8 (Consp. 231). — Stânci alpine. Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901).

*S. luteo-viridis* Schott oest. bot. zeit. ann. 1851 p. 65 (Consp. p. 231). — Stânci alpine. Negoiu pe muntele Lespezi; Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901); Ceahlău (pl. indig. 1900).

*S. Baumgartenii* Schott oest. bot. zeit. ann. 1857 p. 126 (Consp. p. 231) — Stânci, pe piscurile alpine. Ceahlău (pl. indig. 1901).

*S. oppositifolia* L. spe. p. 575 (Consp. p. 232). — Stânci, pe piscurile alpine. Parângu pe Mândra; Negoiu; Buceci la Omu (pl. indig. 1899). Ceahlău (pl. indig. 1901).

*S. alzoides* L. spe. p. 576 (Consp. p. 232). — Stânci, în regiunea alpină. Parângu; Negoiu (pl. indig. 1900); Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901).

*S. bryoides* L. spe. p. 572 (Consp. p. 232). — Regiunea alpină. Surul și Prislopul (pl. indig. 1899); Negoiu și pe Lespezi; Buceci la Omu (pl. indig. 1899 și 1901); Parângu la Găuri pe Piatra-Tăiată.

*S. stellaris* L. spe. p. 572 (Consp. p. 232). — Regiunea alpină. Surul și Prislopul (pl. indig. 1899); la Negoiu pe Lespezi; Buceci sus pe valea Peșului (pl. indig. 1901); Parângu între Gruiu și Pâcleș; sus pe Lotru la Vidra.

*S. pedemontana* All. fl. pedem. vol. 2 p. 73 fig. 5 et 6 (Consp. p. 233). — Regiunea alpină. Surul (pl. indig. 1899); la Negoiu pe Lespezi și Paltina; în Gorjiu pe muntele Sturu; Parângu la Găuri pe Piatra-Tăiată.

*S. muscoides* Wulf. ap. Jacq. miscell. vol. 2 p. 123: — *γ. moschata* Gaud. fl. helvet. vol. 3 p. 131 (Consp. p. 233). — Stânci pe culmi alpine. Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901); Parângu pe Gruiu.

*S. trichodes* Scop. fl. carn. p. 295 tab. 15 ed. 1772 (Consp. p. 234).— Buceci pe culmea Caraimanului, la 2490 m. altit. (pl. indig. 1901).

*S. androsacea* L. spe. p. 571 (Consp. p. 234). Regiunea alpină. Surul și Prislopul (pl. indig. 1899); la Negoiu pe Lespezi; Buceci pe Caraimanu și la Omu (pl. indig. 1901); Parângu pe Prislopu.



**S. adscendens** L. spe. p. 579 (Consp. p. 234). - Stânci la locuri umede umbroase în văi alpine și subalpine. La Negoiu pe munții Lespezi și Paltina; pe Surul și Prislopul în Argeș (pl. indig. 1899); Parângu.

Adiție în secț. *Nephrophylla* după *S. carpatica* (Consp. p. 295):

\* 20<sup>b</sup>. **S. bulbifera** L. spe. p. 577; Sturm deutsch. fl. fasc. 35; DC. prodr. vol. 4 p. 36; Koch syn. 305; Sag. et Schn. carpat. centr. 2 p. 173; Schlechtd. Langeth. deutsch. fl. vol. 26 fig. 2696. *S. granulata* Baumg. enum. transs. vol. 1 p. 477 (1816) et auct. transs. (excepto Simonkai et Porciu), Edel, Kanitz pl. roman. p. 46; Br. prodr. p. 149-non L. — *S. vivipara* Vest în Flora ann. 1820 p. 405. — 4 Iunie. Iulie. Stânci, în văi și vălcele alpine pe Ceahlău (Grec. pl. indig. 1900 p. 21, 1901 p. 10 și pl. vascul. ceahl. p. 37).

Diferă de *S. granulata* L. prin caulul său erect simplu, multifoliat, terminat în cimă 3—7-floră, — nu paucifoliat și în partea de sus ramoso-corimbos; diferă cu osebire prin bulbii din axila foilor caulinare ce lipsesc la *S. granulata* L.

Actualii botaniști ai Florei transilvanice consideră ca neavenită în Carpații noștri pe adevărată *S. granulata* L.; tot astfel Sagorski și Schneider pentru Carpații din Tatra; deci și în partea noastră nu poate fi altfel.

Adiție în secț. *Micropetala*, înainte de *S. heucherifolia* Griseb. (Consp. p. 235):

20<sup>c</sup>. **S. racemosa** Towns. trav. in hung. p. 488 tab. 15 (1797); Simk. enum. transs. p. 247. *S. hieracifolia* W. et Kit. pl. rar. hung. vol. 1 tab. 18 (1800); Fuss transs. excurs. p. 246. — 4 Iulie. August. Locuri umede tinoase în văile alpine, subalpine. Ceahlău (Grec. pl. indig. 1901 p. 10 și pl. vascul. ceahl. p. 37).

Cu caul scapiform, foile radicale ovato-renifome sau ceva mai prelungi, ușor și distant dentate, lung pițiolate, glabre, dar pe margini și pe coasta dorsală păroase. Florile în racemă cam resfirată la bază; caliciul la urină reflex; petalele de un verde palid, ovate, cam acute, egalând caliciul.

**S. heucherifolia** Griseb. et Sch. iter hung. p. 317 (Consp. p. 235). Văi alpine, subalpine la locuri umede. Surul, Prislopul în Argeș (pl. indig. 1899) și la Negoiu pe Lespezi și Paltina; Buceci în valea Cerbului sus pe Costila (pl. indig. 1899); Parângu pe la poalele Mândrei.

**S. Heuffelii** Schott, Nym. Ky. analecta p. 28 (Consp. p. 235). — Stânci în văi umede umbroase subalpine. Valea Jiului la Păiuș, Lainici.

Adiție după secț. *Micropetale* (Consp. p. 235):

\* 4. **Cymbalaria**: cauli subțirei, fragezi, debili și foliați; foile grăsulii, pețiolate, reniforme, lobate; florile lung și subțirel pedunculate, soli-



tare, axilare unele terminale, caliciul liber, petalele la bază biglandulare. Plante plăpânde anuale sau bienice.

\* 23. *S. Huetiana* Boiss. diagn. ser. 2<sup>o</sup> fasc. 2<sup>o</sup> p. 72 (1853); ejus fl. orient. vol. 2 p. 812; Brânză prodr. p. 150 și plante nouă din România, în analele acad. rom. ser. II tom. XXV secț. științ. tab. II. — ☉ s. ☉ Iunie. Iulie. Văi montane umede umbroase, la Slănic pe păraul Cerbului (Marcel Br. anu 1906).

În multă asemănare cu *S. Sibthorpii* Boiss. (= *S. cymbalaria* Sibth. vix L.) din Grecia cu care am comparat-o. Diferă de aceasta în mod prea puțin vădit: prin talia sa mai înaltă și mai subțirea; prin foile sale inferioare a 7—9 lobi mai profunzi, ovați, ovat-acuți sau triangulare,—iar nu a 5 lobi puțin profunzi, ovat-rotunzi sau rotunzi;—diferă mai cu seamă prin florile sale de un galben-deschis,—nu de un galben-portocaliu—și prin capsulele sale cu mult mai lungi precât calciul (de 2—3 ori)—iar nu cu puțin întrecând caliciul.

Specie cu totul rară și de însemnătate sub raportul Florei europice și al ariei sale geografice propriie. Cunoscută numai în părțile montane nordice ale Asiei-Minore, cu osebire în Armenia, ea trece peste Marea-Neagră și în România, dar numai în munții Slănicului din Moldova. Aflată la început de regretatul confrate Dr. Dim. Brânză în anul 1879, o vedem statornicită și cu abundență în această localitate.

*Chrysosplenium alternifolium* L. spe. p. 569 (Consp. p. 236). — Păduri în regiunea montană și submontană. Valea Argeșului la Cumpăna pe Capra, Buda și în zăvoi la Padina; Sinaia; Câmpina; munții Slănicului până pe Șandru; Bicz (pl. indig. 1899 și 1900), Ceahlău.

### UMBELLIFERÆ Juss.

*Sanicula europæa* L. spe. p. 339 (Consp. p. 236). — Păduri montane, submontane. Govora; Curtea-de-Argeș pe dealurile vecine; munții Slănicului; Piatra-Neamțu pe Cernegura; Ceahlău; Babadag; Niculițel, Taița,

*Eryngium plannum* L. spe. p. 337 (Consp. p. 237). — Livezi, câmpuri. Curtea-de-Argeș; Câmpulung; Agiud, valea Taslăului pe la Onești distr. Bacău; câmpii la Silistraru distr. Brăila; Bârzești distr. Vaslui.

*Astrantia major* L. spec. p. 330 (Consp. p. 237:—*α. vulgaris* Stur sitz.-ber. 40 p. 482. Păduri, tuferișe subalpine. La Negoiu pe Lespezi și Paltina.

*β. montana* Stur l. c. (Consp. p. 237). — Tuferișe pe la poale de păduri. Predeal pe coastele dela Schit; Voineasa în valea Jidoaea.

*A. alpestris* Kotschy exsic. No. 297 et ap. Stur sitz.-ber. 40 p. 482 (1860), Grec. consp. p. 238. *A. major α. alpestris* A. Knapp. pfl.

galiz. u. bukow. p. 248. *A. major* b). *alpestris* Simk. enum. transs. p. 249. *A. carniolica* Baumg. enum. transs. vol. 1 p. 212 (1816)-non Wulf. *A. minor* Schur. enum. transs. p. 246 (1866)-non L. — 7 Iulie. August. Regiunea alpină, subalpină. Buceci la Poeana-Costilei; Ceahlău (pl. indig. 1900).

Ca 25—30 cent. înaltă, subțirea (gracilior), având cima constituită din 2—3 umbele lung pedunculate, a rar mai multe, cu mult mai mici de cum la *A. major* și foliolele involucrului prea puțin colorate. Foile radicale palmat-tripartite, sinurile trecând cu puțin dincolo de jumătate, întinderea întreagă reniformă, segmentul median oblung obovat, cele laterale oblice, ovate, subifide, toate icins-dentate.

**Trinia Henningii** Hoffm. umbell. p. 94 (Consp. p. 239). — Locuri aprice. Constanța pe coastele de la Laz-Mahalé și la Murfatlar.

**Egopodium Podagraria** L. spe. p. 379 (Consp. p. 239). — Păduri, tuferișe în părțile montane. Pe Argeș la Cumpăna în valea Caprei; Predeal; Slănic.

**Carum Carvi** L. spe. p. 378 (Consp. p. 239). — Livezi montane. Pe Lotru sus la Vidra; pe muntele Paltina în Argeș; Dealu-Mare la Valea Călugărească; Slănic.

**Pimpinella saxifraga** L. spe. p. 378 (Consp. p. 240). — Livezi, tuferișe. Voineasa, valea Jidoaea; în munții Slănicului; Greci plasa Măcinului.

*var. alpestris* Spreng. in Rœm. et Sch. syst. veget. vol. 6 p. 386 (Consp. p. 240). — Regiunea alpină. La Negoiu pe muntele Lespezi; Buceci (pl. indig. 1901).

**P. magna** L. mantissa p. 217 (Consp. p. 240). — Livezi montane, în munții Slănicului.

**Cicuta virosa** L. spe. p. 368 (Consp. p. 238). — În bălțile dunărene la Tulcea (vulg. *Plutniță*).

**Berula angustifolia** Koch in Mert. et K. deutsch. fl. vol. 2 p. 433 (Consp. p. 241). — Locuri băltoase sau rovinoase. Curtea-de-Argeș; Cotorca în Ialomița; Slănic; Măcin în bălțile Dunărei; Fundeni-Mărcuța lângă București.

**Sium lancifolium** M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 3 p. 230 (Consp. p. 241). — Adiție: sinonimu *S. Sisarum* β. *lancifolium* Lindem. fl. cherson. vol. 2 p. 238. — Pe Colentina în heleșteul Fundeni-Mărcuța.

**Bupleurum rotundifolium** L. spe. p. 340 (Consp. p. 242). — Adiție: vulgar *Urechea iepurului*, și la celelalte asemenea. — Livezi, tuferișe, la locuri aprice deschise. Cotorca în Ialomița.

**B. aureum** Fisch. ap. Hoffm. umbell. p. 115 (Consp. p. 242). — Tot în Buceci, pe Caraimanu (pl. indig. 1901).

**B. falcatum** L. spe. p. 341 (Consp. p. 242). — α. *dilatatum* Schur.

Regiunea montană subalpină. Buceci pe poalele Caraimanului și în munții Slănicului (Marc. Br. exsic.!).

*β. variifolium* Rochel (Consp. l. c.). — Livezi, pe muntele Pufu la Slănic; Satu-nou distr. Iași (pl. indig. 1900).

**B. diversifolium** Rochel pl. rar. banat. p. 68 (Consp. p. 242).—Locuri pietroase, stânci montane alpine, subalpine. Parângu; Sinaia, frecuent; Ceahlău pe la Panaghia (pl. vasc. ceahl. p. 38).

Adiție:

\* **10. B. tenuissimum** L. spe. p. 343; DC. prodr. vol. 4 p. 127; Koch syn. p. 318; Rchb. icon. fl. gerin. vol. 21 tab. 50 fig. 2; Boiss. fl. orient. vol. 2 p. 841. *B. procumbens* Desf. fl. atlant. vol. 1 p. 230; DC. l. c. și sinonim dupe Boiss. l. c. ☉ Iulie, August. Câmpuri, la locuri sărate, în stepele Ialomiței pe la Urziceni, Bărbulești și pe la Cotorca.

**Enanthe silaifolia** M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 3 p. 232 (Consp. p. 245).—Adiție: vulgar *Gioian. Joină*. La locuri bătoase, rovine. Bârlad (pl. indig. 1900); Buhăești dist. Vaslui.

**E. banatica** Heuff. in Flora ann. 1854 p. 291 (Consp. p. 245). — Locuri bătoase, rovine. Pădurea Mogoșoaia (pl. indig. 1901); lunca Siretului la Vădeni distr. Brăila.

**E. Phellandrium** Lam. fl. fr. vol. 3 p. 132 (Consp. p. 246).—Adiție: vulgar *Joina. Măraraș*. — Tot la locuri bătoase sau rovine. Lunca Argeșului la Flămânzeni (Curtea-de-Argeș); Ciocănești, Bufta; lunca Siretului la Vădeni distr. Brăila (pl. indig. 1900).

**Foeniculum vulgare** Gært. fruct. et semin. vol. p. 105 (1782). *F. capillaceum* Gilib. fl. lithuan. vol. 4 p. 374 (1782); Grec. consp. p. 246.—Adiție: vulg. *Anason nemțesc. Chimen-dulce*.

**Seseli gracile** W. et Kit. pl. rar. hung. vol. 2 tab. 117 (Consp. p. 247).—Stânci abrupte. Măcin, Greci pe muntele Pricopanului.

**Seseli varium** Trevir. catal. sem. hort. vratisl. ann. 1818 (Consp. p. 247).—Locuri tari, locuri aprice. Iași pe la Copou (pl. indig. 1901).

Adiție dupe acesta:

\* **3<sup>b</sup>. S. osseum** Crantz stirp. austr. ed. 2<sup>o</sup> vol. 1 p. 207 (1772). *S. glaucum* Jacq. fl. austr. vol. 2 tab. 44 (1774); Koch syn. ed. 2<sup>o</sup> p. 324; Rchb. icon. fl. germ. vol. 21 tab. 62; Schlechtd. Langeth. deutsch. fl. vol. 27 fig. 2771-non L. *S. montanum* δ. *glaucum* DC. prodr. vol. 4 p. 146 exclusis synonymis. — 4 Iulie. August. Locuri pietroase sau tari uscate. Constanța la Murfatlar pe coaste (pl. indig. 1900 p. 22).

În puțină diferență de cel precedent și numai prin umbelele sale cu mai puține raze și prin fructele sale ușor puberule,—nu glabre.

Apoi:

\* **3<sup>c</sup>. S. tortuosum** L. spe p. 373; DC. prodr. vol. 4 p. 147; Koch

syn. ed. 2<sup>o</sup> p. 325; Rchb. icon. fl. germ. vol. 21 tab. 65; Schlechtd. Langeth. deutsch. fl. vol. 27 fig. 2774 B; Boiss. fl. orient. vol. 2 p. 964; Ledeb. fl. ross. vol. 2 p. 276. *S. tauricum* Link ap. Spreng. syst. vol. 1 p. 884 (1825).— 4 Iulie. August. Locuri aride sau pietroase. Constanța (pl. indig. 1900 p. 22).

**S. campestre** Bess. enum. pl. vollhyn. podol. bessarab. etc. p. 44 n<sup>o</sup>. 1373 (Consp. p. 247); Lindem. fl. cherson. vol. 1 p. 242.—Câmpuri sterile, tărâm loess năsipos și în dunele maritime. Techirghiol-Movilă și toată partea de la Sanatoriul Eforiei și până la Tuzla, frecuent; Greci, Cerna, Cârjelari.

**S. annuum** L. spe. p. 373 (Consp. p. 247).—Adiție: vulg. *Cosicel*. Livezi, locuri fertile. Câmpulung; Urziceni spre Speteni, Borănești în Ialomița; Bicaz (pl. indig. 1900).

**Libanotis leiocarpa** Simk. enum. p. 259 (1886) et exsic.! pro specie; Grec. consp. p. 247. *L. montana* var. *leiocarpa* Heuff. enum. pl. banat. p. 79 (1858). *L. athamantoides* Koch syn. ed. 2<sup>o</sup> p. 326-non DC. prodr. vol. 4 p. 150. *L. sibirica* Auct. trans. ex parte-non Koch.—Adiție: vulgar *Smeoeae*. *Tămâioară*.—Ștânci în văi și păduri montane. Cheea-Argeșului.

**L. montana** Crantz stirp. austr. ed. 2<sup>o</sup> fasc. 1. p. 222 (1769); All. fl. pedem. vol. 2 tab. 62 (1785); Koch syn. p. 325 etc. (Consp. p. 248) — Păduri subalpine. Valea Jiului la Păiuș, Lainici; la poalele Ceahlăului (Grinț. exsic ann. 1905).

**β. pubescens** Pantzu și Procop. contrib. fl. ceahl. în bulet. erb. instit. bot. bucur. 1901 p. 107; Grec. pl. vascul. ceahl. p. 38. *L. vulgaris* β. *pubescens* DC. prodr. vol. 4 p. 150 (1830). *L. montana* β. *minor* Koch syn. ed. 2 p. 326 (1843). *L. pubescens* Pichler in A. Kern. sched. fl. austro-hung. fasc. 4 n<sup>o</sup>. 1335 (1886). **L. humilis** Schur œst. bot. zeit. ann. 1859 p. 169.—Ștânci în regiunea alpină. Negoiu și Paltina în Argeș; Buceci pe Caraimanu și în Valea-Cerbului spre Omu (pl. indig. 1901); Ceahlău (*L. humilis* Grec. pl. indig. 1900).

În lucrarea noastră «Plantele vasculare ale Ceahlăului» p. 38 am arătat cuvintele pentru care am schimbat numirea de *L. humilis* a acestei plante și modul de a vedea din parte-ne asupra speciilor de **Libanotis** din România.

**Cnidium apioides** Spreng. umbell. prodr. p. 40 (Consp. p. 248).—Ștânci sau locuri pietroase în regiunea montană. Cheea-Argeșului pe la Cetatea Vlad-Țepeș și pe la tunel; Bușteni pe malurile de flisch ale Prahovei și spre Posada pe la tuneluri (pl. indig. 1901); munții Slănicului.

**Meum Mutellina** Gärtn. fruct. et semin. vol. 1 p. 106 tab. 23 (Consp. p. 249).—Adiție: vulg. *Mărarul-ursului*. Regiunea alpină. Parângu în culme pe Mirul-mare; Negoiu pe Lespezi și Paltina; Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901); Ceahlău (pl. indig. 1900).

**Gaya simplex** Gaud. fl. helvet. vol. 2 p. 389 (Consp. p. 249). Stânci sau locuri pietroase în regiunea alpină superioară. Parângu în culme pe Mândra ; Buceci pe Caraimanu și la Omu (pl. indig. 1899 și 1901); Negoiu (în anu 1907).

**Angelica silvestris** L. spe. p. 361 (Consp. p. 250). Adiție: vulgar *Antonică*. În regiunea montană, submontană, prin livezi, poeni, tuferișe. Govora; Curtea-de-Argeș; poalele Bucecilor la Poeana-Țapului (pl. indig. 1901); munții Slănicului; Fundeni-Mărcuța.

β. *elatio*r Wahlenb. fl. carpat. princip. p. 84 (Consp. p. 251).—Regiunea montană în poeni, tuferișe. Munții Slănicului.

**Archangelica officinalis** Hoffm. umbell. p. 168 (Consp. p. 251).—Adiție: vulgar *Angelica. Antonică*.

Subt numele **Angelica Archangelica** Linné a înțeles două feluri în strânsă afinitate: 1°. *Archangelica officinalis* Hoffm., Koch, de Candolle etc. (= *Angelica Archangelica* L. spec. p. 360, *A. Archangelica* α. *alpina* Wahlenb. fl. carpat. princip. p. 83) și—2°. *Archangelica norvegica* Agardh ap. DC. (= *Angelica Archangelica* L. fl. suec.)

**Peucedanum Chabrai** Rchb. ap. Mœsl. handb. ed. 2 p. 448 (Consp. p. 252). Livezi, poeni, tuferișe. Govora la măgura Mătușea-Floarea; Curtea-de-Argeș, Albești; Cotorca pe la pădurea Arionoaea în Ialomița.

**P. Cervaria** Cuss. ap. Lapeyr. abreg. p. 149 (Consp. p. 253).—Tuferișe. Curtea-de-Argeș, Albești; Crivina pe la pădurea Tinoasa.

**P. Oreoselinum** Mœnch meth. p. 82 (Consp. p. 253).—Poeni, pe lângă păduri, tuferișe. Govora la măgura Mătușea-Floarea; Curtea-de-Argeș, Albești, Corbeni; Câmpina.

**P. alsaticum** L. spe. p. 354 (Consp. 253).—Adiție: vulgar *Mararu-porcului*.—Tuferișe, în regiunea câmpeană. Urziceni spre Speteni, Brănești și Cotorca în Ialomița.

**P. montanum** Koch umbell. p. 94 (Consp. p. 253).—Văi umbroase umede în regiunea alpino-subalpină. Buceci în valea Jepilor pe Caraimanu (pl. indig. 1901).

**Pastinaca sativa** L. spe. p. 376: —β *elatio*r Rochel pl. rar. banat. p. 64 tab. 24 fig. 50 (Consp. p. 454).—Livezi, tuferișe. Govora calea spre măgura Mătușea-Floarea.

γ. *silvestris* DC. prod. vol. 4 p. 189 (Consp. p. 254).—Livezi, tuferișe. Curtea-de-Argeș, Albești; Cotorca în Ialomița; Iași pe la Copou (pl. indig. 1899).

**Heracleum sibiricum** L. spe. p. 358 (Consp. p. 254).—Adiție: vulgar *Briola. Laba-ursului. Talpa-ursului. Brânca-ursului* cum și cele următoare.—Livezi, tuferișe, margini de pădure. Govora; Crivina pe la pădurea Tinoasa; Brănești.

**H. Sphondylium** L. spe. p. 358 (Consp. p. 255).—Livezi montane subalpine. Pe Argeș la gura Budei; Buceci (pl. indig. 1901).

**H. palmatum** Baumg. enum. trans. vol. 1 p. 215 (Consp. p. 255).—Locuri umbroase umede, tărâm negru spongios în regiunea montană subalpină. Pe Argeș la stația Cumpăna; Buceci la poalele Caraimanului (pl. indig. 1901).

**Laserpitium latifolium** L. spe. p. 356 (Consp. p. 256).—Adiție : vulg. *Arel. Somnorel*.—Livezi. Curtea-de-Argeș la Valea-Calului; Ceahlău (pl. vasc. ceahl. p. 39).

**L. alpinum** W. et Kit. pl. rar. hung. vol. 3 tab. 253 (Consp. p. 256). Regiunea alpină. Pe muntele Paltina în Argeș.

**L. prutenicum** L. spe. p. 357 (Consp. p. 256).—Livezi, poeni și margini de păduri în regiunea montană. Slănic; Ceahlău pe Secu-Buhalniței și Chica-Baiului (pl. vasc. ceahl. p. 40).

**Daucus Carota** L. spe. p. 348 (Consp. p. 257).—Livezi, câmpuri. Păiuș, Lainici; Govora; Curtea-de-Argeș; Urziceni, Speteni, Cotorca în Ialomița; de altfel plantă foarte comună în România.

Adiție:

\* γ. *ponticus* Grec. pl. indig. ann. 1901 p. 11. — ☉ Iulie. August. Tuferișe, pe malurile mării la Constanța, spre vii (Dim. Bartolomeu în ann. 1889); Techirghiol-Movilă pe malurile mării.

Tulpina radicală simplă, palară, verticală; tulpina caulinară erectă și chiar de la bază desfăcută în ramuri numeroase, lungi, rigide, glabre sau cu prea puțini peri sporadici spre vârfuri. Foile de un verde închis, glabre, cu puțini peri numai pe pagina dorsală: cele inferioare oblungi, bipinat-sectate, segmentele scurte, lanceolate; cele superioare sesile, pinat-sectate, segmentele lineare întregi, unele 2—3-fide, subulat-acuminate. Umbelele, comparativ cu cele de *D. Carota* propriu-zis, mult mai mici și cu mai puține raze: acestea subțirele, hispide, contractându-se la fructificație și deschizându-se la maturitate. Florile mici albe; fructele de dimensiune mai mică, nu diferă prin conformația lor de ale speciei comune (Grec. l. c.)

**Turgenia latifolia** Hoffm. umbell. p. 59 (Consp. p. 258).—Stepele Ialomiței pe la Hagieni, Țândărei; Tulcea, Malcoci (pl. indig. 1900).

**Torilis Anthriscus** Gmel. fl. baden. vol. I p. 615 (Consp. p. 258).—Locuri uscate, sterile. Curtea-de-Argeș și pe dealurile vecine; Govora; Călimănești; Brănești la pădurea Pustnicu; Bușteni (pl. indig. 1900).

**T. helvetica** Gmel. l. c. p. 617 (Consp. p. 258).—Tuferișe, locuri inculte în părțile câmpene mai ales. Cotorca în Ialomița; Agiud; Bicz (pl. indig. 1900); Dobrogea în cuprinsul Greci, Cerna, Cârjelari.

**Anthriscus alpestris** Wimm. et Grab. fl. siles. vol. 1 p. 289 (Consp.

p. 259).—Păduri și văi montane subalpine. Parângu; Negoiu pe muntele Lespezi; Predeal; Slănic pe muntele Șandru; Comănești distr. Bacău (pl. indig. 1900).—Numirea ce s'ar cuveni este **Anthriscus nitida**, numirea specifică de *nitida* fiind mai veche și dată de Wahlenberg, însă sub genul *Chaerophyllum*: *Ch. nitidum* Wahlenb. fl. carpat, princip. p. 84 (1814).

Adiție:

\* **A. leiocarpa** Simk. (sec. exsic. J. Barth). *A. torquata* Heuff. en. banat. p. 83 (1858)-non Duby in DC, prodr. vol. 4 p. 223 cujus stirps est planta controversa (Aschers. in verh. bot. vereins für brandenb. vol 6 p. 173).—Păduri, în munții Slănicului.

**A. silvestris** Hoffm. umbell. vol. 1 p. 40 (Consp. p. 259).—Pădure, la Monăstirea Cocoși în Dobrogea.

**A. nemorosa** Spreng. umbell. prodr. p. 27 (Consp. p. 260).—Pădurea Mogoșoaia lângă București (pl. indig. 1901).

**A. trichosperma** Schult. syst. veget. vol. 6 p. 625 (Consp. p. 260).—Păduri, locuri umbroase și tuferișe. Dorohoi; Constanța prin vii.

**Chaerophyllum temulum** L. spe. p. 370 (Consp. p. 260).—Păduri. Paserea, Căldărușani; Panciu; valea Slănicului; Botoșani (pl. indig. 1900).

**Ch. bulbosum** L. spe. p. 370 (Consp. p. 260). Adiție: vulgar *Guşniță*. Tuferișe, crânguri, la locuri cam umbroase. Câmpulung, Flămânda, Michăești; Slănic; Agiud.

**Ch. hirsutum** L. spec. p. 371; Koch syn. p. 349 etc. (Consp. p. 261).—Văi și vâlcele montane subalpine umede, umbroase. Voineasa în valea Voineștei, Vidra; Parângu pe Gruiu; Surul și Prislopul în Argeș (pl. indig. 1899); la Negoiu pe Lespezi și la stația Cumpăna pe valea Caprei; Buceci pe Jepii-mari și Caraimanu (pl. indig. 1901); Predeal; munții Slănicului; în Neamțu pe muntele Petru-Vodă; Ceahlău (*Ch. Cicutaria* Grec. pl. indig. 1900: *forma floribus roseis*). La toate carpoforul la maturitate puțin bifid la vîrf.

În «Plantele vasculare ale Ceahlăului» p. 40, am arătat cuvintele pentru care nu separăm pe *Ch. hirsutum* L. de *Ch. Cicutaria* Vill.

**Ch. aureum** L. spe. p. 370-non mantissa (Consp. p. 261).—Adiție: sinonim *Myrrhis odorata* Baumg. enum. transs. vol. 1 p. 251 (1816)-non Scop.—Păduri, în munții Slănicului (Marc. Br. exsic.!).

**Ch. aromaticum** L. spe. p. 371 (Consp. p. 261). Păduri, locuri umbroase. Govora; Curtea-de-Argeș dealurile Hodiei; Slănic; Piatra-Neamțu.

**Echinophora Sibthorpiana** Guss. suppl. p. 60 (Consp. p. 162).—Locuri aspre deschise. Ortachioi, Iiomurlar în plasa Măcinului, Tuzla.

**Conium maculatum** L. spe. p. 349 (Consp. p. 262).—Locuri părăginite, locuri virane, ruine vechi. Govora; Curtea-de-Argeș cu profusie; Brăila; Focșani. Plantă comună.

**Plenospermum austriacum** Hoffm. umbell. in praefat. p. IX, tit. f. 16 (Consp. p. 263). — Regiunea montană subalpină, locuri umbroase. Buceci la Urlătoarele și la Bușteni pe albia Prahovei (pl. indig. 1901).

Adiție, dupe genul *Physospermum* (Consp. 263):

\* ORD. III. CÆLOSPERMÆ Koch. Fructul globos: ambele mericarpe hemisferice sau cu spatule umflate a sac (ex. *Bifora*).

\* Trib. XIII. *Coriandræ* Koch. Mericarpele a câte 5 coaste primare flexuoase puțin aparente sau nearipate (aptere) și cu 4 coaste secundare ceva mai pronunțate, nearipate.

**Coriandrum sativum** L. spec. p. 367 (Consp. p. 263).—Adiție: vulgar *Buriană-pucioasă*. *Pucioasă*.

Adiție, dupe *Coriandrum* (Consp. p. 263):

\* 54. BIFORA Hoffm. umbell. p. 191.

\* 1. *Bifora radians* M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 3 p. 233 (1819); DC. prodr. vol. 4 p. 249; Koch syn. p. 352; Ledeb. fl. ross. vol. p. 365; Rchb. icon. fl. germ. vol. 21 tab. 201 fig. 2; Schlecht. Langeth. deutsch. fl. vol. 27 fig. 2865.—4 Mai. Iunie. La pădurea Preajba lângă Caracal (pl. indig. 1900 p. 23).

### ARALIACEÆ Juss.

**Hedera Helix** L. spe. p. 292 (Consp. p. 263).—Pădure, prin făget la Govora în valea Ilinței pe coastele din dreapta părâului.

### CORNACEÆ DC.

**Cornus sanguinea** L. spe. p. 171 (Consp. p. 263).—Adiție: vulgar *Lemn-pucios*.—Păduri. Govora; Curtea-de-Argeș; Câmpina; Brănești.

**C. mas** L. spe. p. 171 (Consp. p. 264).—Păduri. Govora; Curtea-de-Argeș; Brănești; Măcin, Greci pădurea Taița.

### CLASA III

### Dicotiledoane Gamopetale Inferovarii.

### RUBIACEÆ Juss.

**Sherardia arvensis** L. spe. p. 149 (Consp. p. 264).

Adiție:

\* *γ. brevifolia*. Foile scurte și relativ late, obovate: 6—7 mm. lun-



gime pe 5—6 mm. lăţime, cuneat-atenuate spre bază, foarte ușor acuminat-mucronulate la vîrf, glabre pe pagina inferioară, cu prea puțini peri mici setiformi pe pagina superioară și pe margini.—Locuri cu iarbă. București; a rare locuri.

**Asperula arvensis** L. spe. p. 150 (Consp. p. 264).—Livezi, locuri ierboase. Galaș spre Azacliu (pl. indig. 1899).

**A. capitata** Kit. ap. Schult. œster. fl. vol. 1 p. 312 (Consp. p. 265).—Regiunea alpină. Negoiu (pl. indig. 1899) și pe Lespezi; Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1899 și 1901)

**A. cynanchica** L. spe. p. 151 (Consp. p. 264). — Adiție: vulgar *Asprișoară*.—Livezi, locuri cu iarbă, tuferișe. Severin dealu Buliga; Curtea-de-Argeș pe Sânicora; Câmpina; București, Fundeni, Mărcuța; Panciu, Tecuci; Roman, Bârlad la Crângu (pl. indig. 1901).

**A. graveolens** M. Bieb. sec. Bess. in Schult. mantissa ad. syst. veget. 3 p. 375 (Consp. p. 266).—Dunele maritime la Tuzla (pl. indig. 1900).

**A. galioides** M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 1 p. 101 (Cons. p. 267).—Livezi, tuferișe. Urziceni pe la Speteni, Borănești; Bârlad la Crângu (pl. indig. 1899 și 1901); Agiud; Dobrovăț, Vaslui.

β *tyraica* DC. prodr. vol. 4 p. 585 (Consp. p. 268).—Livezi, tuferișe. Bârlad la Crângu și la Dealu-Mare (pl. indig. 1901).

**A. odorata** L. spe. p. 150 (Consp. p. 268).—Adiție: vulgar *Asprișoara*. *Lipitoare*. Păduri umbroase. Govora pe valea Hinței; pe Argeș la Cumpăna în valca Caprei; Curtea-de-Argeș pe dealurile Rugetului; Codăești, Dobrovăț distr. Vaslui.

Adiție:

\* β. *Eugenia*.—**A. Eugeniae** K. Richt. in abhandl. der zool. bot. geselsch. 1888 p. 219.—Cu portul mai rigid, și florile sale atât proaspete cât și uscate sunt lipsite de odoarea de cumarină.—Păduri montane subalpine în regiunea Coniferelor. Buceci la Bușteni (Grec. pl. indig. 1900 p. 23).

**A. Aparine** M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 1 p. 102 (Consp. p. 268).—Locuri umede, tinoase. Bușteni pe malurile Prahovei (pl. indig. 1901).

**A. humifusa** Bess. catal. hort. cremen. suppl. 3 p. 4 (Consp. p. 268): α. *conferta*. Locuri ierboase aprice. Agiud; Brăila; Techirgiol-Movilă.

β. *diffusa*. (Consp. p. 269).—Brănești; Cotorca în Ialomița; Bârlad (pl. indig. 1801); Măcin.

**Galium verum** L. spe. p. 115 (Consp. p. 269). — Livezi. Govora; Curtea-de-Argeș, Albești, Corbeni; Cotorca în Ialomița; Măcin, Tulcea; Techirgiol.

**G. elatum** Thuill. fl. paris p. 76 (Consp. p. 260).—Livezi, drumuri, mărăcișuri. Govora; Curtea-de-Argeș, Albești, Corbeni; Sinaia; Slănic.

β. *pubescens* Schrad spicil. fl. lipsc. p. 16 (Consp. p. 270).—Locuri aprice. Brănești pe lângă calea ferată.

După acesta, adiție :

\* γ. *graveolens*.—Peste tot glabru. Prin sicație emanează odoare de cumarină. Pe malurile mării, locuri uscate, crângulețe, la Techirghiol-Movilă.

**G. erectum** Huds. fl. angl. p. 68 (Consp. p. 270).—Tuferișe pe locuri pietroase în părțile montane și submontane. Govora la măgura Mătușea-Floarea; pe Argeș la Cumpăna pe valea Caprei, a Budei și pe muntele Paltina; Predeal pe Clăbucetu-Taurului; Buceci pe la poalele Caraimanului (pl. indig. 1901).

β. *petraeum* Grec. consp. p. 270. **G. petræum** Schur. enum tr. p. 284.—Stânci, locuri pietroase subalpine. Pe valea Argeșului la Cumpăna Intre-Râuri și pe valea Caprei; Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901).

Adiție :

\* γ. *transsilvanicum* Simk. enum. transs. p. 283 (1886). **G. transsilvanicum** Schur enum. transs. p. 283 (1886).—Livezi montane. Slănic.

Schur îl pune alături de *G. aristatum* L.; Andrae l'a luat drept *G. laevigatum* (ved. bot. zeit, tom. XIII p. 293); Simonkai, care l-a văzut în herbariul lui Schur din Lemberg, îl consideră ca varietate de *G. erectum* Huds. cu foile mai lungi și netede. Se apropie astfel și de *G. erectum* Huds. prin portul său, de și prin foi aduce cu *G. aristatum* L.; totuși prin inflorescența sa ține mult de *G. erectum* Huds. În fine, între aceștia, el este o formă ambiguă.

**G. Schultesii** Vest. in Flora 1821 part. 2<sup>o</sup> p. 530 (Consp. p. 271).—Păduri, tuferișe, în părțile montane și alpestre. Govora pe măgura Mătușea-Floarea; Curtea-de-Argeș pe dealurile Rugelului; Dealu-Mare ; la Valea Călugărească ; Slănic pe muntele Șandru.

**G. pseudoaristatum** Schur enum. transs. p. 282 (Consp. p. 271).—Brănești în pădurea Pustnicu.

**G. Kitaibelianum** Schult. in mantis. syst. veget. vol. 3 p. 163 (Consp. p. 272).—Păduri. tuferișe în regiunea dealurilor submontane. Govora; Curtea-de-Argeș pe dealurile Chiriceștilor și dealurile Rugetului, Cheea-Argeșului; valea Jiului pe la Păiuș, Lainici.

**G. sudeticum** Tausch în Flora ann. 1835 p. 347 (Consp. p. 272).—Adiție: sinonim *G. silvestre* γ. *carpaticum* Porc. fanerog. naseud. p. 137, etiam Br. prodr. p. 251.—Regiunea alpină. În Parângu culmea pe Mirul-Mare (2000 m.); Negoiu, Lespezi, Paltina în Argeș; Surul (pl. indig. 1899); Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1899 și 1901); Ceahlău (pl. vasc. ceahl. p. 40).

**G. maximum** Moris stirp. sard. ed. 1 p. 55 (Consp. p. 273).—

Locuri rovinoase și tinoase, stufării. Craiova la Balta-Verde și în lunca Jiului; Comana.

**G. palustre** L. spe. p. 153 (Consp. p. 274). Locuri băltoase, stufării, rovine. Pe Lotru sus la Vidra în gura Pravățului; valea Argeșului la gura Budei; Predeal; Brăila în ostrovu Chiciu-Măcinului.

**G. Aparine** L. spe. p. 157 (Consp. p. 274).—Adiț. vulgar *Cornățel*. *Scai-menunt*. Crânguri, mărăcinișuri, garduri rustice. Govora; Curtea-de-Argeș; Slănic.

**G. Cruciata** Scop. fl. carn. ed. 2<sup>o</sup> vol. 1 p. 100 (Consp. p. 275).—Livezi, poeni, tuferișe. Govora; Curtea-de-Argeș, Albești, Corbeni; Slănic.

**G. vernum** Scop. fl. carn. ed. 2<sup>o</sup> vol. 1 p. 99 (Consp. p. 275). Poeni de păduri, tuferișe. Govora la măgura Matușea-Floarea.

În loc de *G. vernum* β. *alpinum* Simk. (Consp. p. 275) se va pune:

**21<sup>b</sup>. G. alpinum**.—*Valantia alpina* Schur verh. siebenb. ver. 1852 p. 86; ejus. enum. transs. p. 288. *Galium glabrum* b. *alpinum* Simk. enum. transs. p. 279 (1886);—α *glabrum* Grec. pl. indig. 1900 p. 23. Cauli și foile glabre, doar foile puțin ciliate;—β *hirtum* Grec. l. c. p. 24. Cauli și foile vilosule.—Livezi, mici tuferișe. Predeal, Sinaia (pl. indig. 1900), poalele Caraimanului și Jepi-Mari (pl. indig. 1901).

× *G. Cruciata-alpinum* (*G. Cruciata-vernum alpinum* Grec. consp p. 275). Locuri ierboase subalpine. Sinaia la Poeana-Stânci pe Piatra-arsă.

**G. retrorsum** DC. prodr. vol. 4 p. 605 (Consp. p. 275).—Livezi. Valea Argeșului în livedea de la gura Budei.

**G. boreale** L. spec. p. 156 (Consp. p. 276).—Locuri pietroase, pe muntele Domesnicu distr. Neamțu.

### CAPRIFOLIACEAE Juss.

**Adoxa Moschatellina** L. spe. p. 527 (Consp. p. 277).—Păduri umbroase. Bușteni poalele Buceilor (pl. indig. 1900); în Ilfov la Otopeni și Paserea; Bicaz (pl. indig. 1900).

**Sambucus racemosa** L. spe. p. 386 (Consp. p. 278).—Regiunea subalpină. Buceci în valea Jepilor (pl. indig. 1901); pe Lotru la Voineasa în valea Jidoaei.

**Viburnum Lantana** L. spe. p. 384 (Consp. p. 278).—Crânguri, tuferișe, păduri; în regiunea submontană. Călimănești; Câmpulung; Câmpina; Greci pădurea Taița și Țiganca.

**Lonicera Xylosteum** L. spe. p. 248 (Consp. p. 278).—Păduri, tuferișe subalpine. Pe Lotru la Voineasa în valea Jidoaei; Bușteni pe marurile Prahovei (pl. indig. 1901) și la Urlătoare.

**L. nigra** L. spe. p. 247 (Consp. p. 279).—Regiune subalpină sau

cam alpină. Pe Lotru la Voineasa în valea Jidoaei; subț Negoiu pe Clăbucetu; Buceci la Urlătoarele stâncile dela Cascadă (pl. indig. 1901); Ceahlău stâncile dela Boambe.

### DIPSACEÆ DC.

**Dipsacus Fullonum**  $\alpha$  L. spec. p. 140. *D. silvestris* Huds. fl. angl. p. 49 et auct. (Consp. p. 279).—Locuri inculte pe câmpuri, pe la drumuri și sate. Govora; Curtea-de-Argeș calea la monăstire: cu flori lilacine și flori albișoare; Focșani, Agiud; Măcin, Ortachioi, Homurlar.

**D. pilosus** L. spe. p. 141 (Consp. p. 280).—Locuri joase umede sau scurse și cam umbroase. Govora în valea Hinței; pe Argeș la Căpățineni spre Cheea-Argeșului.

**Cephalaria transsilvanica** Schrad. catal. hort. gœtting. 1814 (Consp. p. 280).—Adiție: vulgar *Sîpîcă*.—Locuri aprice, inculte în regiunea câmpiilor. Urziceni, Cotorca în Ialomița; Brăila; Constanța (pl. indig. 1900), Techirghiol-Movilă.

**C. corniculata** Rœm. et Sch. syst. vol. 3 p. 49 (Consp. p. 280).—Tuferișe, câmpii. Malurile Ialomiței pe la Speteni, Borănești; Măcin, Greci pe la poalele munților Pricopanului.

**Knautia arvensis** Coult. dips. p. 29 (Consp. p. 281).—Adiție: vulgar *Călugăraș*. Livezi submontane și montane subalpine. Govora; Curtea-de-Argeș, Albești, Corbeni; Predeal; Bârlad la Crângu (pl. indig. an. 1901); pe la pădurea Rediu-lui-Tătar distr. Iași (pl. indig. 1900).

**$\beta$ . rosea** Baumg. enum. transs. vol. 1 p. 75 (Consp. p. 281).—Livezi Curtea-de-Argeș la Valea-Calului; Slănic.

Adiție:

\*  $\gamma$ . *dumetorum*.—**K. dumetorum** Heuff. enum. banat. p. 91 (1858); Neilr. diagn. p. 63; Simk. en transs. p. 294.—Livezi. Slănic pe dealuri.—Formă sau varietate ambiguă între *K. arvensis*  $\beta$ . *rosea* Baumg. (= *K. arvensis*  $\beta$ . *integrifolia* Heuff.) și între *K. longifolia* Koch. Puțin păroasă și cu aspect lucios; exemplarele noastre au toate foile întregi și în totul mai mari ca în forma precedentă; însă foile sale, de și mari, nu sunt elongat-lanceolate și înguștioare, nici caulul abia cu 1—2 părechi foi mult mai mici ca cele radicale precum la *K. longifolia* Koch.

**K. atrorubens** Janka ap. Brânza prodr. p. 257 (Consp. p. 281).—Livezi. Zimnicea, Bragadiru în Teleorman; Dudeasca pe la pădurea Arionoea în Ialomița; Brănești; Constanța, Murfatlar; Greci, Ortachioi.

**K. silvatica** Duby bot. gall. vol. 1 p. 257 (Consp. p. 282).—Păduri, tuferișe, poeni. Govora; muntele Paltina în Argeș; Curtea-de-Argeș pe dealurile Hodiei; Sinaia.

*β. atropurpurea* Grec. consp. p. 282.—Lunca Prahovei, în pădure la Tinoasa.

*γ. lancifolia* Ileuff. enum. ban. p. 91 (Consp. p. 282).—Păduri. Pe dealuri la Botoșani (pl. indig. 1899); valea Lotrului la Voineasa.

*K. longifolia* Koch syn. ed. 2<sup>o</sup> p. 376 (Consp. p. 282).—Livezi, poeni în regiunea montană subalpină, quasi alpină. Negoiu pe Lespezi și pe Paltina; Buceci (pl. indig. 1901); Ceahlău (pl. indig. 1900).

*Succisa pratensis* Mœnch meth. p. 489 (Consp. p. 282).—Adiție: vulgar *Călugărișoară*.—Livezi, poeni, în regiunea montană și alpestră. Negoiu pe Lespezi; Curtea-de-Argeș la Valea-Calului pe dealuri; Slănic pe muntele Pufu.

*Scabiosa lucida* Vill. pl. dauph. vol. 2 p. 293 (Consp. p. 283).—Adiție: vulgar *Floarea-Văduvei* (Transs.), *Ruin. Sîpică*.—Livezi, poeni, tuferișe în regiunea montană alpină, subalpină. Parângu pe Mirul-Mare; Negoiu pe Lespezi și pe Paltina, la Cumpăna pe valea Caprei și pe Buda; Ceahlău (pl. indig. 1900).

*β. alpicola* Schur enum. transs. p. 300 (Consp. p. 283).—Regiunea alpină. Parângu pe Mirul-Mare; Negoiu pe Lespezi; Prislopul în Argeș (pl. indig. 1899); Predeal sus pe Clăbucetul-Taurului; Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901).

*S. Columbaria* L. spe. p. 143 (Consp. p. 283).—Tuferișe, stânci, pe la poale de munți. Vârciorova în valea Bahnei; Cheea-Argeșului; Comănești pe valea Ciobănașului distr. Bacău (Mrc. Br. exsic.).

*S. ochroleuca* L. spe. p. 146 (Consp. p. 284).—Adiție: vulgar. *Ruin. Sîpică*.—Livezi, poeni. Govora; Curtea-de-Argeș în împrejurimi pe dealuri și spre Albești; Cheea-Argeșului.

*β. flavescens* Griseb. et Sch. iter hung. p. 350 (Consp. p. 184).—Livezi, pe la drumuri, locuri aprice în regiunea câmpiilor. Pitești (pl. indig. 1900); Urziceni, Speteni, Ilagieni în Ialomița.

*S. ucranica* L. spe. p. 144 (Consp. p. 284).—Locuri aride sau pietroase. Vârciorova pe valea Bahnei; Cerneț coastele de la Tunari; Panciu în Putna; Trestiana în Dorohoi; Constanța pe la Alacapuri și Murfatlar (pl. indig. 1900); Techirghiol-Movilă pe malurile mării.

#### VALERIANACEÆ Lindl.

*Valeriana officinalis* L. spe. p. 45 (Consp. p. 284).—Adiție: vulgar. *Beldrian*.—Livezi la locuri umede. Govora pe valea Hinței; lunca Argeșului pe la Flămânzeni (Curtea-de-Argeș) și Oești; lunca Prahovei la Tinoasa; Slănic.

*β. collina* Wallr. in linnæa vol. 14 (1840) p. 537 (Consp. p. 285).—

În Cheea-Argeşului spre Cetatea Vlad-Ţepeş; Buşteni (pl. indig. 1901); Piatra-Neamţ; Ceahlău (pl. indig. 1900).

**V. sambueifolia** Mik. in Pohl fl. bohem. vol. 1 p. 41 (Consp. p. 285).—Tuferișe în văi montane umede umbroase. Pe Lotru la Voineasa în valea Jidoaei; pe Argeş la Cumpăna în valea Caprei și pe Buda; Predeal și pe maluriile Prahovei spre Azuga, Buşteni (pl. indig. 1901); Buceci la Urlătoarele.

**V. tripteris** L. spe. p. 45 (Consp. p. 285).—Văi montane umede umbroase subalpine. Voineasa în valea Jidoaei; pe Argeş la Cumpăna în valea Caprei; Negoiu pe muntele Lespezi; Buceci în valea Jepilor și la Urlătoarele (pl. indig. 1900 și 1901); munții Slănicului pe Șandru; Bicz, Ceahlău (pl. indig. 1900 și Grinț. exsic. an. 1905).

**V. bijuga** Grec. consp. p. 285. *V. tripteris* β. *bijuga* Simk. közlemén. XV, 1878 p. 558.—Ca și precedentă. În munții Slănicului.

**V. montana** L. spe. p. 45 (Consp. p. 286).—Văi montane subalpine. Cheea Argeşului; Buceci în valea Jepilor (pl. indig. 1901); Ceahlău (pl. indig. 1900).

**Valerianella olitoria** Poll. fl. palat. vol. 1 p. 30 (Consp. p. 286). Livezi, locuri fertile. Curtea-de-Argeş; Constanța.

**V. Auricula** DC. fl. fr. suppl. ann. 1815 p. 492 (Consp. p. 287).—Adiție sinonimu **V. rimosa** Bast. in Desv. journ. bot. ann. 1814 vol. 1 p. 20. *V. Auricula* γ. *tridentata* Koch syn. p. 373. *Fedia Auricula* Rœm. et Sch. syst. veg. vol. 1 p. 363 (1817).—Ca prioritate, numirea de *V. rimosa* Bast. este justificată și trebuie adoptată.

**V. carinata** Lois. notices p. 149 (Consp. p. 287).—Constanța (pl. indig. 1900).

**V. Morisonii** DC. prodr. vol. 4 p. 627 (Consp. p. 287).—Locuri cu iarbă, locuri fertile. Valea Călugărească la Dealu-Mare; Căldărușani.

## SYNANTHEREÆ C. Rich.

### I<sup>o</sup>. TUBULIFLORÆ DC.

#### Ordo I<sup>o</sup>. Corymbiferae Juss.

**Eupatorium cannabinum** L. spe. p. 1173 (Consp. p. 288).—Adiție: vulg. *Cânepioară*. Locuri joase umede, pe lângă râulețe și izvoare. Govora pe valea Hînței; Curtea-de-Argeş pe la Flămânzeni și pe la Oești; Cheea-Argeşului; Sinaia; lunca Prahovei la Tinoasa; Valea Călugărească.

**Adenostyles Kernerii** Simk. enum. transs. p. 297 (Consp. p. 288).—păduri montane subalpine. La Negoiu pe Lespezi, Paltina și pe Clăbucetu; în munții Slănicului pe Nemira-Ţiganca și pe Șandru; Buceci în valea Jepilor (pl. indig. 1901); Ceahlău (pl. indig. 1901).

**Homogyne alpina** Cass. dist. sc. nat. vol. 21 p. 412 (Consp. p. 289).— Regiunea alpină. Parângu pe Mirul-Mare; Suru și Negoiu (pl. indig. 1899); Buceci pe culmea Caraimanului (pl. indig. 1901); Ceahlău (pl. indig. 1899 și 1900).

**Petasites officinalis** Mœnch meth. p. 568 (Consp. p. 289).— Gora pe valea Hinței; Cheea-Argeșului pe la Cetatea Vlad-Țepeș; Sinaia; Bușteni (pl. indig. 1901); lunca Prahovei la Tinoasa.

**P. albus** Gært. fruct. vol. 2 p. 406 (Consp. p. 289).— Buceci pe Caraimanu sus pe lângă zăpadă (pl. indig. 1901) și pe la S-ta Ana; pădurea Tinoasa pe Prahova.

β. *Kablikianus* Grec. consp. p. 290. **P. Kablikianus** Tausch in lotos I, S. 120 (1851); Rchb. icon. fl. germ. vol. 16 tab. 9; Celak. œst. bot. zeit. vol. 40 an. 1890 p. 293; Maly C. beitr. 2<sup>o</sup> theil p. 3 (1891).— Văi subalpine quasi alpine. Buceci în valea Peleșului (pl. indig. 1899), pe Caraimanu (pl. indig. 1901) și la Poiana-Costilei (Marc. Br.); Ceahlău (pl. indig. 1900).

**P. niveus** Baumg. enum. transs. vol. 3 p. 91 (Consp. p. 290).— Văi subalpine quasi alpine. Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901); Ceahlău (pl. indig. 1900).

**Bellis perennis** L. spe. p. 1248 (Consp. p. 290). — Adiție: vulg. *Păscuțe*. Livezi, la locuri umede cam umbroase. Râmnic în Zăvoi (pl. indig. 1899); Predeal (pl. indig. 1901).

**Linosyris vulgaris** Cass. ap. Less. synanth. p. 195 (Consp. p. 290).— Locuri aprice deschise, rășuri. Olteniști distr. Fălciu; Greci, Cerna, Cârjelari.

**L. villosa** DC. prodr. vol. 5 p. 352 (Consp. p. 291). Locuri aprice dealuri. Rădăuș distr. Dorohoiu; Greci pe dealu Bujoru în Dobrogea.

**Aster alpinus** L. spe. p. 1226 (Consp. p. 291).— Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901); Ceahlău (pl. indig. 1900).

**A. Amellus** L. spe. p. 1226 (Consp. p. 291).—Livezi, tuferișe mici. Căineni din Argeș (pl. indig. 1901); Corbeni, Curtea-de-Argeș; pe Ialomița pe la Dridu, Urziceni, Speteni; Măcin, Greci.

β. *bessarabicus* DC. prodr. vol. 5 p. 231 (Consp. p. 291).—Livezi, pe muntele Cosmița la Bicaz.

**A. Tripolium** L. spe. p. 1226 (Consp. p. 292).—Locuri băltoase în părțile sărate. Slănic.

β. *pannonicus* Jacq. hort. vindob. vol. 1 p. 3 tab. 8.—Toț pe asemenea locuri. Cotorca în stepele Ialomiței; Măcin, valea Slatina; Hagilar. Adiție, după genul *Galatella* (Consp. p. 292):

\* 9<sup>b</sup>. **STENACTIS** Nees ab Esenb. aster. p. 273.

\* 1. **S. annua** Nees ab Esenb. aster. p. 273 (1818); DC. prodr. vol. 5 p. 298; Gren. Godr. fl. fr. vol. 2 p. 99. *S. dubia* Cass. l. c. *S. bellidi-*

*folia* Braun ap. Koch syn. p. 387. *Aster annuus* L. spe. p. 1229. *Pulicaria annua* Gærtn. fruct. vol. 2 p. 462. *Erigeron annuum* Pers. syn. vol. 2 p. 431.— ☉ Iulie. August. Poeni, locuri deschise. Poeana-Țapului spre Urlătoarele, aflat de W. Knechtel și depus în Herb. Fl. României al Facult. de medicină.

De origină americană, introdus sau emigrat (?) în Europa centrală, Franța, Germania, Italia din nord, unde pare naturalizat.

*Erigeron acro* L. spe. p. 1211 (Consp. p. 292).—Livezi, poeni, tufești. Govora; Curtea-de-Argeș dealurile Chiriceștilor și ale Rugetului, Albești; Valea Călugărească; Techirghiol-Movilă, aci à rar.

*E. racemosus* Baumg. enum. transs. vol. 3 p. 119 (Consp. p. 293).—Livezi montane. Monăstirea Cheea și Suzana; Slănic pe Pufu.

*E. alpinus* L. spe. p. 1211 (Consp. p. 293).—Regiunea alpină. Pârângu culmea Mirului-Mare; Buceci la Schitul Ialomîța (pl. indig. 1899), pe Caraimanu și spre Omu (pl. indig. 1901); în culmea Ceahlăului (pl. indig. 1899).

*E. uniflorus* L. spe. p. 1212 (Consp. p. 294).—Regiunea alpină, pe piscurile Negoiului (pl. indig. 1899); pe Caraimanu (pl. indig. 1901); pe Ceahlău (pl. indig. 1900).

*E. neglectus* A. Kern. in Ber. d. naturw. med. vereins in Insbruck III, 1872 p. 71 (Consp. p. 294). — Adîție: sinonimii *E. alpinus* Baumg. enum. transs. vol. 3 p. 120 et auct. transs. p. p.-non L. *E. glabratus* Schur enum. transs. p. 309-non Hoppe (conf. Porc. diagn. p. 116).—Regiunea alpină, pe piscurile Negoiului (pl. indig. 1899); pe Caraimanu (pl. indig. 1901).

*Solidago Virga Aurea* L. spe. p. 1235 (Consp. p. 294). — Adîție: vulgar *Mănunchi*.

*α. vulgaris* DC. prodr. vol. 5 p. 338 (Consp. p. 295).—Livezi, păduri. Lainici, Păiuș; Govora; Curtea-de-Argeș, Cheea-Argeșului pe muntele Arefu; Slănic; Greci, Cerna.

*β. latifolia* Koch syn. p. 390 (Consp. p. 295). — Ca și precedentu. Cheea-Argeșului; Slănic.

*γ. alpestris* DC. prodr. vol. 5 p. 338 (Consp. p. 295).—Livezi, stânci alpine, subalpine. În Argeș pe muntele Paltina; Slănic pe Șandru; Ceahlău (pl. vasc. ceahl. p. 45).

*Pulicaria dysenterica* Gærtn. fruct. vol. 2 p. 461 tab. 173 (Consp. p. 296).—Prundiș pe albia Slănicului la Slănic; Techirghiol spre Sanatoriu. Adîție:

\* *β. glabrescens*.—Crânguri pe coastele Prahovei la Breaza-de-sus.

Foile neundulate, rigide și cam aspre: ele, caulul și ramurile glabrescente, doar cu puțin și mănunței peri puberuli; tomentul pe desubtul foilor prea puțin sau aproape nul. Plantă de statură înaltă.



**Înula germanica** L. spe. p. 1239 (Consp. p. 296).— Stația Roșiești pe la pădure distr. Tutova; Techirghiol-Movilă pe malul mării.

**I. ensifolia** L. spe. p. 1240 (Consp. p. 296).— Crânguri, livezi, pe coastele Ialomiței la Speteni.

**I. salicina** L. spe. p. 1238 (Consp. p. 296).—Livezi, tuferișe. Slănic, Târgu-Ocna; Bacău.

Dupe aceasta, adiție:

\* **4b. I. squarrosa** L. spe. p. 1240; DC. prodr. vol. 5 p. 466; Koch syn. p. 393. Rchb. icon. fl. germ. vol. 16 tab. 38; Boiss. fl. orient. vol. 3 p. 188.— 4 Iulie. Aug. Locuri seci aprice, tărâm năsipos. La poalele dunelor maritime de la Techirghiol lângă Sanatoriul Eforiei.

Dupe unii autori, *I. squarrosa* L. ar fi identică cu *I. spiræifolia* L. (Gren. Godr. fl. fr. vol. 2 p. 175; Boiss. l. c.); alții le deosibesc (DC. l. c.) sau le consideră ca simple forme aparținând aceleași specie (Koch l. c.).—Ca sinonimi li se aplică și numirile de *Inula Bubonium* Jacq. fl. austr. append tab. 19, *Aster Bubonium* Scop. fl. carniol vol. 2 p. 173 tab. 58, asemenea și *Inula germanica* Vill. pl. dauph. vol. 3 p. 219, Lam. DC. fl. fr. vol. 4 p. 151—însă nu a lui Linneu. Planta noastră prezintă și o particularitate de care nu se face menținere în autori: *tulpina radicală emite și stoloni subterani, lungi subțirei și scuamiferi*. Probabil că această particularitate se datorează tărâmului năsipos pe care crește în această parte. De altfel, în conformația sa, nu diferă de *I. adriatica* Borb. (considerată ca un hibrid din *I. squarrosa* și *I. hirta*) de cât prin caulii săi nu monocefali și nimic altceva.

**I. hirta** L. spe. p. 1239 (Consp. p. 296).—Livezi, tuferișe. Slănic; Bârlad la Crâng (pl. indig. 1901).

**I. Britanica** L. spe. p. 1337 (Consp. p. 297).—Locuri inculte, șanțuri, pe lângă cai. Slănic; Dealu-Mare pe la valea Călugărească; Techirghiol-Movila.

**I. Oculus Christi** L. spe. p. 1237 (Consp. p. 298).—Câmpuri, locuri aprice, tuferișe. Stația Roșiești pe la pădure în Tutova.

**I. Conyza** DC. prodr. vol. 5 p. 464 (Consp. p. 298).—Tuferișe pe lângă păduri în munții Slănicului.

**Teleckia speciosa** Baumg. enum. transs. vol. 3 p. 150 (Consp. p. 298).—Locuri joase umede în regiunea montană subalpină. În munții Negoiiului și ai Slănicului; Ceahlău (pl. indig. 1900).

**Filago germanica** L. spe. p. 1311 (Consp. p. 299).—Prunțiș, locuri aspre inculte. Slănic pe albia Slănicului; Constanța, Techirghiol.

**F. arvensis** L. spe. p. 1312 (Consp. p. 299).—Locuri aspre inculte, drumuri. Govora; Curtea-de-Argeș, Albești; stepele Ialomiței la Cotorca.

**Gnaphalium silvaticum** L. spe. p. 1200 (Consp. p. 300).—Livezi,

poeni, tuferișe. Govora; Curtea-de-Argeș; valea Argeșului pe la Cumpăna și pe muntele Lespezi; Slănic.

**G. norvegicum** Gunner fl. norv. vol. 1 p. 105 (Consp. p. 300). — Regiunea alpină. Stânci, pe culmea Surului în Argeș (pl. indig. 1899); Parângu pe Mândra; Ceahlău (pl. indig. 1900).

**G. uliginosum** L. spe. p. 1200 (Consp. p. 300). — Prunțiș pe albia Slănicului; pe cursul Colentinei la Fundeni-Mărcuța.

**G. supinum** L. syst. nat. ed. XII vol. 3 p. 324 (Consp. p. 301). — Regiunea alpină. Parângu în culmea Mirului-Mare în piscurile Negoifului; culmea Caraimanului (pl. indig. 1901).

**Leontopodium alpinum** Cass. dict. sc. nat. vol. 25 p. 474 (Consp. p. 301). — Adiție: vulgar *Steluțe-de-munte. Studelițe*, cunoscut în limba germană sub numele de Edelweiss. — În Argeș pe culmea Surului (pl. indig. 1900).

**Antennaria dioica** Gært. fruct. vol. 2 p. 410 tab. 167 (Consp. p. 301). Regiunea alpină și subalpină, la locuri pietroase sau aspre. Parângu pe Mirul-Mare; culmea Surului în Argeș (pl. indig. 1899) pe Paltina și pe Arefu; Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901); pe Ceahlău (pl. indig. 1900) și în munții Slănicului.

**Heliechrysium arenarium** DC. fl. fr. vol. 4 p. 130 (Consp. p. 301). — Adiție: vulgar *Budiene* (Bucov.), *Mărgică. Ochișori. Semenici* (Ban.). Locuri năsipioase sau aspre. Dunele danubiane la Calafat, Poeana și Piscu; stația Roșiești în Tutova.

**Carpesium cernuum** L. spe. p. 1203 (Consp. p. 302). — Adiție: vulgar *Gulerași*. — Păduri, dumbrave. Brănești pădurea Pustnicu.

**Bidens tripartita** L. spe. p. 1165 (Consp. p. 302). — Locuri joase băltoase, pe lângă râuri și părțuri, zăvoiuri. Govora pe valea Hinței; Curtea-de-Argeș, Flămânzeni; lunca Prahovei la Tinoasa și Crivina; Cotorca în Ialomița.

**B. cernua** Willd. spe. pl. vol. 3 p. 1716: — *α. discoidea* DC: prodr. vol. 5 p. 594 (Consp. p. 302). — Locuri joase mlăștinoase. Pe Ialomiță la Urziceni, Speteni și în stepele de la Cotorca; Măcin în bălțile dunărene pe la Jijila, Iglița și Turcoaea.

**β. radiata** DC. l. c. (Consp. l. c.). — Severin lunca Topolniței (pl. indig. 1899); lunca Bistriței pe la Bacău, Săvinești (pl. indig. 1900).

**Helianthus annuus** L. spe. p. 1276 (Consp. p. 303). — În grădini de țară și în porumburi pentru folioasele domestice. Curtea-de-Argeș.

Adiție: dupe *Tagetes* (Consp. p. 303):

\* • **Galinsoga parviflora** Cavan. icon. vol. 3 p. 41 tab. 281 (1800); DC. prodr. vol. 5 p. 677; Koch syn. p. 396; Rechb. icon. fl. germ. vol. 16 tab. 92 fig. 1. — ☉ Iulie-Septemvrie. Locuri joase umede, locuri

fertile și de cultură. Monăstirea Suzana în Prahova (în colecțiunea N. Jacobescu!); Tecuci.

Plantă de origină americană din Peruvia și alte părți (Ruiz și Pavon fl. peruv. prodr. ann. 1794). Se bucură de proprietăți medicinale vulnerare și antiscorbutice. Cum, și ce fel introdusă în Europa? Acum este naturală și de sine perpetuată în locuri de cultură în Europa centrală. Eu pentru prima oară am observat-o în multă frecvență la Reichenau (sub Schneeberg în Austria infer.) în anul 1905, la locuri fertile nelucrate.

**Artemisia Abrotanum** L. spe. p. 1185 (Consp. p. 304).—Adiție: vulgar *Alimon*. În grădini de țară la Cotorca în Ialomița.

**A. pontica** L. spe. p. 1187 (Consp. p. 304). — Locuri joase cam sărate. Ungureni distr. Dorohoi.

**A. austriaca** Jacq. ap. Murr. syst. p. 744 (Consp. p. 304).—Adiție: sinonimii *A. austriaca* α. *Jacquiniana* Bess. tent. abrot. n<sup>o</sup>. 29 (1832); DC. prodr. vol. 6 p. 112 var. δ. *A. orientalis* Willd. spe. pl. vol. 3 p. 1836 și *A. repens* Pall. ex Willd. l. c. p. 1840 sec. Velen. fl. bulg. p. 273. — Câmpuri inculte. Sterile. Stepele Ialomiței la Urziceni, Speteni, Brănești, Cotorca; Măcin.

**A. vulgaris** L. spe. p. 1188 (Consp. p. 304).—Govora; Curtea-de-Argeș; Urziceni, Speteni.

γ. *latiloba* Ledeb. fl. ross. vol. 2 p. 587 (Consp. p. 304). — Brănești pe la pădurea Cernica.

**A. eriantha** Ten. viagg. in abruzz. p. 91 (Consp. p. 305). — Regiunea alpină. Parângu pe Mirul-Mare; culmea Surului (pl. indig. 1899) și pe Lespezi sub Negoiu; Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1991); Ceahlău (pl. indig. 1899 și 1900).

**A. arenaria** DC. prodr. vol. 6 p. 94 (Consp. p. 305).—Dunele maritime. Mamaea lângă Constanța; cele dela Techirghiol lângă Sanatoriul Eforiei și pe litoralul mării sub Hotel-Movilă, copios.

**A. campestris** L. spe. p. 1185 (Consp. p. 305).—Regiunea câmpiilor, la locuri aprice inculte. Stepele Ialomiței pe la Urziceni, Speteni, Cotorca.

După aceasta adiție:

\* 9b. **A. inodora** M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 2 p. 205 (1808) și vol. 3 p. 565 (1819); Ledeb. fl. ross. vol. 2 p. 566. *A. inodora* β. *incana* DC. prodr. vol. 6 p. 96. *A. campestris* δ. *Gmeliniana* Bess. dracunc. in bull. soc. natur. moscou vol. 8 p. 43 (1835); Lindem. fl. cherson. vol. 1 p. 307.—4 August. Septem. La locuri tari, aspre, aprice. Malul mării la Techirghiol-Movilă, copios.

A nu se confunda cu *A. campestris* var. *sericea* Fries de care

prea puțin diferă. Este caracteristică mai ales prin portul său, crect, bățos, acoperită cu abundant indument viloso-incan, având scuamele exterioare ale involucrului învârtosate — iar nu a membrane subțiri (ved. Grec. consp. p. 305). Asemenea, a nu se lua drept *A. inodora* Willd. enum. h. berol. vol. 2 p. 864 (1809) varietate de *A. Dracunculus* L.

**A. scoparia** W. et Kit. pl. rar. hung. vol. 1 tab. 65 (Consp. p. 306).—Regiunea câmpiilor, locuri inculte. Stepele Ialomiței pe la Urziceni, Speteni, Cotorca; stepele Brăilei pe la Rușefu; Măcin, Greci, Carcaliu, Igliza.

**A. Santonicum** L. spe. pl. ed. 1753 p. 845 exclus. synonym. Lobelii secund. Fritsch în A. Kern. sched. ad fl. austro-hung. n<sup>o</sup>. 2264 (Consp. p. 306).—Adiție: sinon. *A. pendula* Schur. verh. siebenb. ver. 1859 p. 78; ejus enum. transs. p. 323.—Regiunea stepelor, locuri joase sărate. Pe la comuna Brateș lângă Făurei și pe la Fulga-Conduratu distr. Buzău; Brotești distr. Brăila; Cernavodă spre stația Mircea-Vodă; Măcin, Babadag, Hagilar; Techioghiul-Movilă pe marginea lacului și pe malul mării, copios.

**Tanacetum boreale** Fisch. in DC. prodr. vol. 6 p. 128 (Consp. p. 307).—Locuri joase umede de alluvium, în cuprinsul Isaccea, Jijila, Ghecet.

**Achillea Schurii** Schultz-Bipon. œster. bot. zeit. 1856 p. 300 (Consp. p. 307). — Regiunea alpină. Pe Suru și Prislopu în Argeș (pl. indig. 1899) și la Nêgoiu pe Lespezi și Paltina; Buceci pe Caraimanu și la Omu (pl. indig. 1901); Ceahlău (pl. indig. 1900 și 1901).

**A. Ptarmica** L. spe. p. 1126 (Consp. p. 318).—Tuferișe pe dealuri la Breasta lângă Craiova (vulg. *Rotățele*).

**A. lingulata** W. et Kit. pl. rar. hung. tab. 2 (Consp. p. 308). — Livezi pe locuri pietroase. Slănic pe muntele Șandru.

**A. tanacetifolia** All. fl. pedem. vol. 1 p. 183 (Consp. p. 308). — Livezi, în regiunea montană subalpină și quasi alpină. Slănic pe muntele Șandru; Bicz pe Piatra-Corbinei și în văile Ceahlăului (pl. indig. 1900 și 1901).

**A. distans** var. *β. stricta* Koch. syn. p. 411. **A. stricta** Schleich. catal. pl. helvet. IV p. 6. (Consp. p. 308). — Livezi, poeni pe locuri pietroase în regiunea montană subalpină și quasi alpină. Valea Argeșului la Cumpăna, valea Caprei, valea Budei și în Cheea-Argeșului pe stânci; Predeal; Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1900); culmea Parângului pe Mirul-Mare cam la 2000m.

Adiție:

\* *γ. nivalis* Porciu magyar. növen. lapp. vol. 9 p. 128, Simk. enum. trans. p. 319. — Regiunea alpină, la Nêgoiu pe muntele Lespezi.

De statură scundă, ca 10—18 cent. având florile cam purpurine.

**A. pannonica** Scheele in linnæa ann. 1844 p. 471 (Consp. p. 309).—

Adiție: sinonimu *A. Millefolium* var. *ε. villosa* Schur enum. transs. p. 328 (1866).—Livezi, tuferișe. Dealu-Mare pe la Valea Călugărească; Techirghiol-Movilă.

**A. Millefolium** L. spe. p. 1267 (Consp. p. 309).—*α. genuina*. Livezi, drumuri, garduri rustice. Govora; Curtea-de-Argeș; Adjud.

*β. collina* Becker in Rchb. fl. germ. excurs. p. 850 (Consp. p. 309).—Locuri aspre sau aprice. Comana; Constanța spre Alacapù (pl. indig. 1900).

Adiție :

\* *δ. silvatica* Becker ap. Koch syn. p. 410.—Tărâm humifer poros Curtea-de-Argeș pe la unele garduri și pe Sânicora în dos; Slănic.

Înaltă și mult mai robustă ca varietățile precedente, foile inferioare și ale lăstarilor sterili cu mult mai lungi și late în periferia lor, pinele și lacinulele lor relativ asemenea; calatidele cu mult mai voluminoase comparativ cu forma tipică.

**A. setacea** W. et Kit. pl. rar. hung. tab. 80 (Consp. p. 309).—Locuri aprice inculte, căi rustice. Govora; Curtea-de-Argeș; Ploești; Hagieni, Țândărei în stepele Ialomiței; Techirghiol-Movilă.

**A. Neillreichii** A. Kern. œst. bot. zeit. 1871 p. 141 (Consp. p. 311).—Regiunea câmpiilor, locuri inculte. București, Pantelimon, Brănești; Cotorca în stepele Ialomiței; Techirghiol-Movilă.

**A. depressa** Janka plant. nov. turcic. breviar. pars 2<sup>o</sup> p. 5 n<sup>o</sup> 31 (1873); Boiss. fl. orient. vol. 3 p. 262; Velen. fl. bulg. p. 269; Grec (consp. p. 311).—Locuri joase uscate, loess năsipos. Ivești (Tecuci).

**A. eompacta** Willd. spe. pl. vol. 3 p. 2206 (Consp. p. 311).—Locuri aprice, aspre sau pietroase. Stepele Ialomiței la Hagieni, Țândărei; Măcin, Greci pe dealul Bujor (exemplare întocmai ca cele de la Vârciorova).

**A. millefoliata** Grec. consp. p. 311.—Locuri pietroase, la poalele munților între Măcin, Greci (pl. indig. 1899 și 1900).

**Anthemis carpatica** W. et Kit. ap. Willd. spe. pl. vol. 3 p. 2179 (Consp. p. 312).—Regiunea alpină. Parângu, sus la Găuri; pe Negoiu (pl. indig. 1899) și pe Lespezi.

*β. pyrethriiformis* Schur enum. transs. p. 335 (Consp. p. 313).—Tot pe Buceci la Omu, locul clasic (pl. indig. an. 1901 și Marc. Br. exsic. anu 1906); Ceahlău în culme (pl. indig. 1900).

**A. tinctoria** L. spe. p. 1263 (Consp. p. 313).—Livezi, poeni de păduri. Govora; Curtea-de-Argeș, Corbeni; Cotorca în Ialomița; Techirghiol-Movilă.

*β. discoidea*.—Brănești pe la pădurea Cernica.

**A. ruthenica** M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 2 p. 330 (Consp. p. 314).—Locuri aprice înculte. Pe șesul Bârladului la Vaslui (pl. indig. an. 1900); Măcin, Greci.

**A. arvensis** L. spe. p. 1261 (Consp. p. 314).—Livezi, locuri de cultură, drumuri. Craiova (pl. indig. 1900); Govora; Curtea-de-Argeș; Brănești; Brăila, Galați; Măcin.

**A. Cotula** L. spe. p. 1261 (Consp. p. 314). — Adiție: vulgar *Măraru-cânelui*.—Locuri inculte, păragini, drumuri. Govora; Curtea-de-Argeș; București, Herestrău; Brănești.

**Leucanthemum vulgare** Lam. fl. fr. vol. 2 p. 137 (Consp. p. 315).—Adiție: vulgar *Tufănică*.—Livezi. Govora; Curtea-de-Argeș până la Corbeni.

**β. carpaticum** Bess. enum. p. 34 (Consp. l. c.).—Govora pe la măgura Mătnșea-Floarea.

**δ. subalpinum** Schur verh. siebenb. ver. 1859 p. 137 (Consp. l. c.).—Buceci pe Caraimanu jos pe la carierele de piatră (pl. indig. 1901).

**L. rotundifolium** DC. prodr. vol. 6 p. 46 (Consp. p. 316). — Văi montane subalpine. Parângu pe Mirul-Mare; Cheea-Argeșului, valea Căprei la Cumpăna și la Negoiu pe Lespezi și Paltina; Ceahlău (pl. vasc. ceahl. p. 47.).

**Pyrethrum alpinum** Willd. spe. pl. vol. 3 p. 2153 (Consp. p. 316).—Regiunea alpină. Parângu pe Mândra; Negoiu; culmea Caraimanului (Marc. Br. exsic. anu. 1906).

**P. uliginosum** W. et Kit. pl. rar. hung. vol. 1 tab. 32 (Consp. p. 316).—Locuri joase băltoase, stufării. Pe Colentina la Fundeni-Mărcuța; Iași pe cursul Bahluiului (pl. indig. 1901).

**P. corymbosum** Willd. spe. pl. vol. 3 p. 2155 (Consp. p. 317).—Adiție: vulgar *Năprasnîc*. Livezi, poeni, crânguri. Govora; Curtea-de-Argeș pe dealuri; Dealu-Mare pe la Valea Călugărească; Iași pe la pădurea Bărnova (pl. indig. 1900); Greci pe dealuri.

Adiție, dupe *Pyrethrum subcorymbosum* (Consp. p. 317):

\* 4<sup>b</sup>. **P. cinereum** Griseb. spicil. rumel. vol. 2 p. 202 (1844); Boiss. fl. orient. vol. 3 p. 342; Rouy illustr. pl. europ. fasc. 1 p. 4 tab. 12. *P. corymbosum* Velen. fl. bulg. p. 269 ex parte. — 4 Iulie. August. Locuri aspre sau pietroase deschise. Pe coaste în vii la Caracăl; Alexandria în Teleorman; Comana spre Dadilov; Constanța între Palazu și Horoslar (pl. indig. 1900 p. 26).

Adpres përoasă cu aspectu cenușiu pestetot și de statură modestă. Caulul foliat, terminat în corimbă îndesată; foile pe pagina superioară cânunte, pe cea inferioară sericeu-cenușii sau cam alburii, cele radicale pețiolate oblungi, pinat sectate, segmentele oblungi, lobatificate și spre vîrf confluențe, cele caulinare sesile, pinatpartite și urmez micșiorându-se; calatidele mult mai mici de cum la *P. corymbosum* Willd. pedunculii lor cu puțin mai lungi ca dînsele; involucrul adpres pãros, foliolele sale imbricate, palide, scarioase spre vîrf, cele exterioare obtuse, carinate și

mai scurte; ligulele florale alburii, oblung-spatulate, tridentate și în lungime precât discul.

Ca făptură, puțin se deosebește de *P. corymbosum* Willd., doar prin portul seu în toate micșorat, prin calatidele sale asemenea cu mult mai mici, prin corimba mai scurtă și îndesată, dar mai ales prin vestitura sa păroasă mult mai avută, alburie sau cenușie ce prin sicație devine cam roșcată.

**P. millefoliatum** Willd. spe. pl. vol. 3 p. 2160 (Consp. p. 318).—Regiunea stepelor danubiane. Hagieni, Tândărei în Ialomița; Brăila; Măcin, Greci (pl. indig. 1899). Stepele pontice la Constanța spre Tăbăcărie; Tichirghiol în parcul Sanatoriului Eforiei.

Adiție:

\* 8. **P. Tanacetum** DC. prodr. vol. 6 p. 63 (1837). *Tanaceteum Balsamita* L. spe. p. 1184 (eroare 1148); Koch syn. p. 407. *Balsamita vulgaris* Willd. spe. pl. vol. 3 p. 1802. *Balsamita suaveolens* Pers. syn. vol. 2 p. 408 (1807).— 4 Iulie. August. Vulgarisată și propagată prin cultură în grădini rustice pe la sate și orașe sub numirea populară de *Călăpăr* sau *Calomfir*.

A nu se confunda cu *Pyrethrum Balsamita* Willd. (*Chrysanthemum Balsamita* L. spe. p. 1252), tot un fel de Calomfir din Orient, ale cărui calatide sunt radiate și ligulele albe,—iar nu discoide.

**Doronicum austriacum** Jacq. fl. austr. vol. 2 p. 18 tab. 130 (Consp. p. 318).—Văi montane subalpine, tuferișe, stânci. Cheea-Argeșului pe sub Cetatea Vlad-Țepeș, în sus pe valea Caprei și sub Paltina; Slănic pe muntele Șandru; pe Rătișu la Buhalnița în Neamțu (pl. indig. an. 1900); pe Lotru sus la Voineasa și Vidra.

**D. Columnæ** Ten. fl. napol. prodr. tab. 79 (Consp. p. 318).—Văi montane subalpine. Parângu pe Gruiu; Buceci la Urlătoare (pl. indig. 1900), valea Jepilor (pl. indig. 1906) și la Sinaia; Ceahlău (pl. vasc. ceahl. p. 47).

Adiție:

\* 4. **D. caucasicum** M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 2 p. 322 (1808); DC. prodr. vol. 6 p. 320; Ledeb. fl. ross. vol. 2 p. 625; Boiss. fl. orient. vol. 3 p. 380; Velen. fl. bulg. suppl. p. 150. *D. orientale* Willd. enum. hort. berolin. vol. 2 p. 898 (1809).— 4 Iunie. Iulie. Stânci, locuri pietroase la pădurea Techea distr. Tulcea (pl. indig. 1900 p. 26).

În asemănare cu precedentul de care diferă prin tulpina subterană rizomă lungă subțire și orizontală, a locuri cu noduri tuberoase scuamifere din care pornesc stoloni subterani; scuamele colului și ale nodurilor înzestrate cu denși peri mătăsoși în axila lor. Dar și la *D. Pardalianches* β. L.—ce nu vine la noi—tulpina subterană este tot asemenea rizomă stoloniferă a locuri cu noduri tuberoase, însă lipsită de scuame și peri mătăsoși.



**Aronicum carpaticum** Schur verh. siebenb. ver. 1859 p. 137 (Consp. p. 319).—Regiunea alpină. Parângu; în Argeş pe Suru (pl. indig. 1899) şi la Negoiu pe muntele Lespezi; Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901); Ceahlău (pl. indig. 1900).

Adiţie dupe acesta :

\* **2. A. Clusii** Koch syn. p. 421 (ed. 1843); Rchb. icon. fl. germ. et helv. vol. 16 tab 63 fig. 2. *Arnica Clusii* All. miscel. taurin. 5 p. 70 (1758); ejus fl. pedem. vol. 1 p. 205 tab. 17 fig. 1. *A. Doronicum* Jacq. fl. austr. vol. 1 tab. 92 (1773). *Doronicum Clusii* Tausch in Flora vol. 11 (1828) p. 178. *Aronicum Doronicum* Reichenb. fl. germ. excurs. vol. 2 p. 233 (1831); DC. prodr. vol. 6 p. 318.—4 Iulie. August. Regiunea alpină, pe Ceahlău (pl. vasc. ceahl. p. 48) şi pe Parângu.

**Arnica montana** L. spe. p. 1245 exclus. var.  $\beta$ . (Consp. p. 319).—Adiţie: vulgar *Cujdă*, în farmacii *Arnica*.—Livezi, poeni în regiunea subalpină, quasi alpină. La Negoiu pe muntele Lespezi; Slănic pe muntele Şandru; Ceahlău (pl. indig. 1901).

**Cineraria sulphurea** Grec. consp. p. 319. *C. longifolia var sulphurea* Baumg. enum. transs. vol. 3 p. 125 (1816). — Regiunea alpină spre limita inferioară, tot în Buceci, pe Caraimanu (pl. indig. 1901).

Numirea de *Cineraria tomentosa* DC. (Consp. p. 320) a se corecta astfel :

**3. C. flocculosa.**—*C. aurantiaca var. flocculosa* Rchb. fl. germ. excurs. vol. 2 p. 242 (1831) exclus. synonym.—*C. aurantiaca*  $\beta$ . *lanata* Koch syn. ed. 2<sup>o</sup> p. 425 (1843); Rchb. icon. fl. germ. vol. 16 tab. 91 fig. 1. *C. capitata* Koch syn. ed. 1<sup>o</sup> p. 385 (1837)—non Wahlenb. *Senecio capitatus b) radiatus* Simk. enum. transs. p. 326 ex Rchb. iconogr. bot. vol. 2 fig. 243. *S. aurantiacus* Auct. transs. p. p.—non *Cineraria aurantiaca* Hoppe taschenb. p. 121 (1806).—4 Iunie. Iulie. Stânci în regiuner alpină. Buceci (*C. tomentosa* Grec. consp. p. 320); Buceci pe Caraimanu (*C. aurantica* Grec. pl. indig. 1901 p. 14); Ceahlău (*C. aurantiaca* Grec. pl. indig. 1900 p. 27).—Ved. Grec. pl. vasc. ceahl. p. 48.

Planta din Buceci, întocmai ca şi cea din Ceahlău, vădit diferă de *C. aurantiaca* Hoppe typica şi întrucâtva de *C. capitata* Wahlenb. fiind intermediu acestora. Are toată înfăţişarea celei din urmă de care diferă doar numai prin calatidele sale radiate—şi nu discoide sau capitata. Bună, rea, numirea dată de Reichenbach ca varietate chiar, fiind cea mai veche, urmează să fie capitală pentru această specie care numai astfel există la noi.

**Senecio rupestris** W. et Kit. pl. rar. hung. vol. 2 p. 136 tab. 128 (Consp. p. 321). — Poeni, tuferişe, prundişuri, în regiunea subalpină. Parângu la Găuri; Surul (pl. indig. 1899); la Negoiu pe Paltina şi la Cumpăna, pe Argeş la gura Budei; Buceci (pl. indig. 1901); Slănic.



**S. erucaefolius** L. spe. p. 1218 (Consp. p. 321).—Livezi, drumuri. Govora; Curtea-de-Argeș spre Albești; Valea Călugărească; Techirghiol.

**S. subalpinus** Koch syn. p. 129 (Consp. p. 322).—Regiunea alpină. Parângu; Negoiu pe muntele Paltina.

**S. carpaticus** Herb. addit. ad fl. galiz. p. 44 (Consp. p. 322).—Regiunea alpină. Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901); Parângu.

**S. tomentosus** Host fl. austr. vol. 2 p. 476 (Consp. p. 322).—Locuri joase umede turbifere în albia dunăreană. Măcin în bălțile Dunărei la Turcoaia, Iglița și Jijila, ostrovul Chiciu-Măcinului.

**S. Fuchsii** Gmel. fl. baden. vol. 3 p. 444 (Consp. p. 323).—Păduri, locuri umbroase umede în regiunea montană. Cheea-Argeșului, în sus la Cumpăna și pe munții Lespezi și Paltina; Buceci în valea Jepilor (pl. indig. 1901); munții Slănicului; Iași la pădurea Ciurea.

**S. nemorensis** L. spe. p. 122 (Consp. p. 323).—Păduri și văi umbroase în regiunea montană. Sus pe Lotru la Voineasa și Vidra; Cheea-Argeșului și în sus la Cumpăna până pe Lespezi și Paltina; munții Slănicului până pe Șandru; Ceahlău.

Numirea de *Senecio macrophyllus* M. Bieb. (Consp. p. 323) se va corecta astfel:

**S. Biebersteinii**.—*S. Doria*  $\beta$ . *Biebersteinii* Lindem. florula elisabethgradensis in bull. de la soc. des natur. de moscou 1867 n<sup>o</sup>. 4 p. 133; ejus fl. cherson. vol. 1 p. 327. *S. macrophyllus* Bess. enum. pl. volh. podol. bessarab. p. 23 (1822) an Bieb. (1808)?—Locuri și livezi joase umede. Stepele Ialomiței pe la Cotorca; Constanța pe la Alacap<sup>u</sup> (pl. indig. 1900).

**S. umbrosus** W. et Kit. pl. rar. hung. vol. 3 tab. 210 (Consp. p. 323).—Locuri umede umbroase subalpine. Bușteni prin tuferișele malurilor șistoase ale Prahovei despre tunel (pl. indig. 1901).

**S. glaberrimus** Grec. consp. p. 323. *S. Doronicum* var. *glaberrimus* Rochel pl. rar. banat. tab. 24 (1828)—sed non *S. Doronicum* L. spe., p. 1222.—Regiunea alpină la Negoiu pe munții Lespezi și Paltina, nu rară.

Deși există încă o specie sub numirea de *Senecio glaberrimus* dată de Candolle (prodr. vol. 6 p. 403), specie a țărilor din Africa australă, cu totul deosebită de specia noastră, totuși numirea capitală specifică de *glaberrimus* se cuvine speciei noastre, fiind mai veche, deși ca varietate dată de Rochel; pe când specia lui de Candolle poartă data din anul 1837 și, prin urmare, n'are prioritate.

Ordo II<sup>o</sup>. *Cinarocephalæ* Juss.

**Echinops ruthenicus** M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 3 p. 597 (Consp. p. 327).

β. *tenuifolius* Fisch. ap. Schkuhr handb. 3 p. 181). — Stepele danubiane, în Ialomița la Ghimpați; Măcin pe la Carcaliu și Satu-nou.

**E. commutatus** Juratzka zool. bot. gesell. 1858 p. 17 (Consp. p. 325). Tuferișe, marăcișișe. Govora pe valea Hinței, în jos; Curtea-de-Argeș; Comănești valea Ciobănașului distr. Bacău; Ceahlău (pl. vasc. ceahl. p. 49).

**E. sphærocephalus** L. spe. p. 1314 (Consp. p. 325). — Tuferișe, crângulețe. Curtea-de-Argeș pe la Flămânzeni și spre Albești, a rar; pe la Bârzești distr. Vaslui.

**Xeranthemum annuum** L. spe. p. 1201 (Consp. p. 826).—Adiție:

\* α. *genuinum* Grec. pl. indig. 1900 p. 27. — Câmpuri la locuri inculte. Craiova; Focșani, Odobești (pl. indig. 1900); Curtea-de-Argeș, Albești; Cotorca în Ialomița.

Caul erect, angulos, ramificat, ramurile întinse (patule), nude în marea lor parte superioară, foile lineare sau sublanțolate, marginea revolută.

\* β. *platyphyllum* Grec. l. c. — Bacău; Constanța (pl. indig. 1900).

Având portul celui precedent, însă foile mult mai mai late, oblung-eliptice și plane.

\* γ. *uniflorum* Grec. l. c.—Locuri aprice inculte. Cristești distr. Iași.

Caul simplu, erect, cu o singură calatidă terminală; restul ca la forma specifică, cu deosebirea că portul său este micșor: 10—20 cent. înălțime.

Adiție: a începe genul *Carlina* (Consp. p. 326) cu următoarea specie:

\* 1. *Carlina acanthifolia* All. fl. pedem. n<sup>o</sup>. 571 tab. 51 (1785); DC. prodr. vol. 6 p. 545 var. α; Koch syn. p. 464; Rchb. icon. fl. germ. vol. 15 tab. 9 fig. 1; Boiss. fl. orient. vol. 3 p. 448. *Cutzka* Hacq. pl. alp carniol. p. 9 tab. 1; Halácsy consp. fl. græc. vol. 2 p. 94. — 4 Iulie-Septemvire. Păsciuni, iarbă pe locuri pietroase montane. Pe muntele Ciucarova la Bașpunar, nu departe de Babadag, unde bulgarii îi zic *Butrac* (pl. indig. 1900 p. 27).

2. *C. acaulis* L. spe. p. 1160 (Consp. p. 326).—Adiție: vulgar *Ciuru Zorilor*.—Livezi alpine și cam subalpine. Pe Prislopu și pe Suru în Argeș (pl. indig. 1899); munții Slănicului pe Șandru.

3. *C. vulgaris* L. spe. p. 1161 (Consp. p. 236).—Locuri pietroase Slănic.

4. *C. brevibracteata* Simk. enum. transs. p. 342 (1886). *C. longifolia* var. *brevibracteata* Andræ bot. zeit. 1855 p. 313 (Consp. p. 327).—Locuri aprice. Curtea-de-Argeș dealurile Chiriceștilor; Slănic; Ceahlău (pl. vasc. ceahl. p. 49).

**Lappa major** Gært. fruct. vol. 2 p. 379 fig. 162 (Consp. p. 327).—Locuri inculte, drumuri, păragini. Govora; Curtea-de-Argeș; Tinoasa. Capitulele mature ale acestei și ale celor următoare se zic *ciuline*.

**L. minor** DC. fl. fr. vol. 4 p. 77 (Consp. p. 327). Maidanuri, drumuri, păragini. Curtea-de-Argeș.

**L. tomentosa** Lam. fl. fr. vol. 2 p. 37 (Consp. p. 327).—Pe la păduri, tuferișe. Govora; valea Argeșului la Cumpăna pe valea Budei și a Caprei; Cotorca pe la pădurea Arionoaea; Slănic; Bicz (pl. indig. 1900); Ceahlău.

**Coussinia bulgarica** C. Koch Beitr. zu fl. des orient in linnæa. vol. 33 p. 385 (Consp. p. 327).—Tot pe câmpurile de la Constanța (pl. indig. 1899).

**Carduus acanthoides** L. spe. p. 1150 (Consp. p. 328).—Locuri inculte, păragini, drumuri. Govora; Curtea-de-Argeș; Cotorca în Ialomița; Brăila; Măcin, Greci.

**C. Kernerii** Simk. termész. füzet X, 1866 p. 181 (Consp. p. 328).—Păsciuni, în regiunea alpină. Negoiu; Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1899 și 1901), pe Furnica spre Vîrfu-cu-dor (*forma parva*).

**C. hamulosus** Ehrh. Beitr. vol. 7 p. 166 (Consp. p. 328).—Regiunea câmpiilor. Cotorca în Ialomița; Galați, Filești (pl. indig. 1899).

**C. Personata** Jacq. fl. austr. vol. 4 p. 25 tab. 248 (Consp. p. 328).—Păduri, tuferișe în regiunea montană subalpină. Cheea-Argeșului și în sus până la Cumpăna, pe valea Budei și a Caprei, frecuent; Buceci în valea Jepilor (pl. indig. 1901); munții Slănicului; Bicz (pl. indig. 1900).

**C. crispus** L. spe. p. 1150 (Consp. p. 329).—Păduri, tuferișe în regiunea montană și submontană. Govora; Curtea-de-Argeș; lunca Prahovei la Tinoasa spre Crivina; Ceahlău (pl. vasc. ceahl. p. 50).

β. *pinnatifidus*.—Pădure, la Broscăuți distr. Dorohoi (pl. indig. 1901). Foile inferioare profund penatífide; cele superioare sinuat dentate sau întregi.

Adiție: dupe *Cinara Scolymus* L. (Consp. p. 330):

\* **Cinara Cardunculus** L. spe. p. 1159.—Vulg. *Anghenare mică*, zisă de unii cultivatori în București și *Cardon*, dupe franțuzește. Tot în cultura grădinilor de verdețuri. Este forma primitivă a celei precedente care diferă de aceasta prin calatidele sale cu mult mai mari și ale căror foliole pericline sunt boante—nu țepoase,—și au baza foarte cărnoasă, receptaculul foarte voluminos și cărnos—nu mic și cam fibros.

Numirea capitală de *Cirsium decussatum* Janka (Consp. p. 332) se va modifica precum urmează ca prioritate:

4. **C. spathulatum** Gaud. fl. helvet. vol. 5 p. 202 (1829); Rchb. icon. fl. germ. vol. 15 tab. 90; Porciu in A. Kern. sched. ad. fl. exsic. austro-hung. n° 967; Halácsy consp. fl. græc. vol. 2 p. 109. *Cnicus spathulatus* Moretti de quibus pl. ital. decad. 3 p. 6 (1822). *Cirsium decussatum* Janka in linn. vol. 30 an. 1859 p. 582; Fuss fl. transs. excurs p. 356; Boiss. fl. orient. vol. 3 p. 529; Porciu diagn. p. 141. *C. eriophorum* var.

*spathulatum* Rchb. fl. germ. excurs. p. 285, sed plantă Morettiana involucri tomento denudata est; Koch syn. p. 453.—4 etc.

De *C. eriophorum* Scop. diferă prin foliolele pericline la vîrf mai mult sau mai puțin deilate și chiar spatulate, dentate, terminate în spi- nișor moale, nu valid țepos

**C. Bonjartii** Schultz. Bip. in œst. bot. woch. 1856 p. 299—*var.* γ. *furiens* Grec. consp. p. 333.—Crânguri, mărăcinișuri. Curtea-de-Argeș spre Albești, a rar.

**C. lanceolatum** Scop. fl. carn. ed. 2<sup>o</sup> p. 130 (Consp. p. 333). — Câmpuri, drumuri. Brăila; Constanța (pl. indig. 1900).

β. *nemorale* Rchb. (Consp. l. c.). — Regiunea montană și submon- tană pe la păduri. Govora; pe Argeș la Cumpăna.

**C. palustre** Scop. fl. carn. ed. 2<sup>o</sup> p. 128 (Consp. p. 334).—Locuri joase mlăștinoase în părțile montane. Cheea-Argeșului și în sus până la Cumpăna; Predeal pe valea Roșnovei; Slănic.

**C. canum** M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 3 p. 556 (Consp. p. 334).—Locuri joase umede, băltoase. Curtea-de-Argeș spre monăstire; Măcin pe la balta Iglița; parcul Măgurelele-Otetelișan a rar.

**C. pannonicum** Gaud. fl. helvet. vol. 6 p. 536 (Consp. p. 335).—Locuri joase umede. Govora pe valea Hinței; pe Prahova la Tinoasa; Slănic.

**C. rivulare** Link enum. hort. berol. vol. 2 p. 301 (Consp. p. 335).—Locuri umede sau mlăștinoase și în văi din regiunea montană. Predeal.

β. *simplex*. Caul simplu monocefal sau bicefal și atunci una din ca- latide è în desvoltare staționară. Predeal; Muntele Domesnicu în Neamțu.

**C. pauciflorum** Spreng. syst. veget. vol. 3 p. 375 (Consp. p. 335).—Regiunea montană subalpină cam superioară. La Negoiu pe muntele Țe- pezi; Voineasa în valea Jidoaei.

**C. heterophyllum** All. fl. pedem. vol. 1 p. 152 tab. 34 (Consp. p. 335).—Locuri mlăștinoase în regiunea montană. Slănic.

**C. Erisithales** Scop. fl. carn. ed. 2<sup>o</sup> vol. 2 p. 125 (Consp. p. 335).—Păduri și văi montane la locuri tinoase în părțile umbroase. Voineasa în valea Jidoaei; Cheea-Argeșului și sus pe vale la Cumpăna pe Buda și Capra; Slănic; Ceahlău.

Adiție, dupe aceasta:

\* 14<sup>b</sup>. **C. erisithaloides** (× *C. pannonicum-Erisithales* Naeg. ap. Koch syn. ed. 2<sup>o</sup> p. 1001; Rchb. deutsch. fl. vol. 15 p. 89 et icon. fl. germ. tab. 114). *C. Erisithales-pannonicum* Heer in litt. ad Naegeli.—4 Iulie. August.—Locuri umede sau tinoase în văile muntelui Șandru la Slănic (aflat și comunicat de Marc. Br.)

Caulul jos bine foliat, în sus cu foi distante și diminuate, nearipat;

foile auriculato-amplexicaule nedecurente, profund sinuat-penatifide, pinele oblungi triangulare sinuat-dentate, orizontal întinse sau cam în sus aduse, pe margini setulos-ciliate, încolo glabre, de un verde închis, dar pe de subț ceva mai deschise și cam glauce; pedunculii neegali cu vestmânt arachnoideu și a câte o calatidă: acestea cam numeroase, globoide, erecte sau cam aplecate, nebracteate, foliolele pericline oblungi, lanceolate cam obtuse, adprese, neviscoase, terminate în spinișor scurt și ușor răscurbat; florile purpurii.

Ca înfățișare seamănă cu *C. Erisithales*; însă calatidele ca conformație și florile sunt în asemănare cu cele de *C. pannonicum*, iar cele neînflorite aduc mult a *C. canum*.

*C. oleraceum* Scop. fl. carn. ed. 2<sup>o</sup> p. 124 (Consp. p. 336).—La locuri joase, umede sau mlăștinoase din regiunea montană și submontană. Govora; pe Argeș la Cumpăna; Slănic; muntele Petru-Vodă.

*C. arvense* Scop. fl. carn. ed. 2<sup>o</sup> vol. 2 p. 126:—var.  $\gamma$ . *setosum* Ledeb. fl. ross. vol. 2 p. 735 (Consp. p. 336).—Govora; Curtea-de-Argeș.

Adiție, dupe genul *Cirsium* (Consp. p. 336):

\* 47<sup>b</sup> CHAMÆPEUCE DC. prodr. vol. 6 p. 657.

\* 1. *Ch. Afra* DC. prodr. vol. 6 p. 659 (1837); Velen. fl. bulg. p. 291. *Carduus Afer* Jacq. hort. schœnbr. vol. 2 p. 180 tab. 145 (1770). *Cnicus Afer*  $\alpha$ . Willd. spe. pl. vol. 3 p. 1682. *Cirsium Afrum* DC. catal. hort. monspel. p. 96 (1813); Boiss. fl. orient. vol. 3 p. 552; Halácsy consp. fl. græc. vol. 2 p. 117.—☉ Iulie. August. Pe coaste, locuri aprice aspre sau cam pietroase, pe la comuna Scurtești distr. Buzău (pl. indig. 1900 p. 28).

*Onopordon acanthium* L. spe. p. 1158 (Consp. p. 336).—Curtea-de-Argeș.

*Jurinea mollis* Rchb. fl. germ. excurs. p. 290:—var. *arachnoidea*. *J. arachnoidea* Bunge in Flora vol. 24 an. 1841 p. 157 (Consp. p. 338).—Mărăcișuri, livezi, în regiunea câmpiilor. Buftea, Ciocănești, Chitila; stepele Ialomiței, Țândărei; Bârlad la Dealu-Mare (pl. indig. 1901); Constanța.

Adiție, în genul *Serratula* (Consp. p. 388):

\* 2. *S. radiata* M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 3 p. 545 (1819); DC. prodr. vol. 4 p. 668; Bess. enum. pl. podol. volh. p. 32; Ledeb. fl. ross. vol. 2 p. 757; Rchb. icon. fl. germ. vol. 15 tab. 72; Koch syn. p. 466. Boiss. fl. orient. vol. 3 p. 588. *Carduus radiatus* W. et Kit. pl. rar. hung. vol. 1 tab. 11 (1800).—☿ Iunie. Iulie. Livezi la locuri aprice pe dealuri la Iași (pl. indig. 1900 p. 14).

*Centaurea Jacea* L. spe. p. 1293 (Consp. p. 339).

Adiție dupe var.  $\alpha$ . genuina:

\*  $\beta$ . *vulgaris* Koch syn. ed. 2<sup>o</sup> p. 469.—Livezi, pe la vila Boian

lângă Botoșani. — Vre-o trei-patru din foliolele inferioare pericline sunt dotate cu apendice fimbriat cam egalând lungimea foliolei respective.

*γ. lacera* Koch l. c. — Livezi în vecinătate la Dorohoi. — Foliolele inferioare pericline cu apendice fimbriat; cele mezii îl au neregulat lacerato-fimbriat; cele superioare (sau interne) îl au parte întreg, parte sub-lacerat: la toate fața dorsală oacheș-castanie (Consp. p. 339).

\* *δ. commutata* Koch l. c. — Livezi, tot pe la Botoșani (pl. indig. an. 1900 p. 28). — Foliolele pericline, cu excepție cele interne, toate având apendicele fimbriato-partit, fimbriile subțirele și regulate. Livezi. Botoșani (pl. indig. 1900).

**C. îndurata** Janka in Flora vol. 41 an. 1858 p. 444 (Consp. p. 339). — Adiție: sinonimu *C. spuria* A. Kern. œst. bot. zeit. vol. 22 an. 1872 p. 51 (× *C. Jacea-stenolepis* A. Kern. l. c.). — An *C. Michellii* Beck? — Tufe-rișe, pe lângă păduri în regiunea submontană și a dealurilor. Vârciorovă la gura Slănicului lângă canton; Dealu-Mare la Valea Călugărească; Vaslui (pl. indig. 1900).

**C. plumosa** Lam. fl. fr. vol. 2 p. 51 (Consp. p. 340). — Livezi, în regiunea alpină. La Negoiu pe Lespezi și Paltina; Parângu pe Gruiu.

**C. phrygia** L. fl. suec. ed. 2<sup>o</sup> n<sup>o</sup> 755 (1755); C. A. Mey. enum. cauc. p. 64; A. Kern. végét. verhältn. p. 264. *C. austriaca* Willd. spe. pl. vol. 3 p. 2283 (1800). *C. pseudophrygia* et *C. conglomerata* Porciu enum. pl. janerog. năsend. p. 34-non C. A. Mey. (Grec. consp. p. 840). — Livezi montane, submontane. Parângu, Voineasa, Vidra; Predeal, Azuga, Bușteni; Ceahlău (pl. indig. 1899); Rarău.

Obs. Se va suprima *Centaurea pseudophrygia* (Consp. p. 340) și se vor trece sub *C. phrygia* L. localitățile: Câmpulung, Rucăr, Pajerea; Predeal, Azuga, Bușteni, Sinaia; Slănicu din Bacău; Piatra, Osloveni și localitățile din Suceava; din celelalte localități indicate rămâne a se verifica mai cu precizie, fiind dubioase. În locul acesteia se va pune:

\* **7. C. salicifolia** M. Bieb. in Willd. spe. pl. vol. 3 p. 2283 (1800), M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 2 p. 343 (1808); Janka in linnæa vol. 30 an. 1860 p. 584; Porciu diagnos. p. 144. — S'ar putea zice hibridă: × *C. Jacea-austriaca*, sau intermediară acestora. — 4 Iunie. August. Livezi, în regiunea montană subalpină. Predeal la poalele Susaiului și în valea Roșnovei; Monăstirea Suzana în Prahova; Slănic.

**C. stenolepis** A. Kern. œst. bot. zeit. 1872 p. 45 (Consp. p. 341). — Livezi, crângulețe, locuri fertile, locuri pietroase. Voineasa; Govora; Curtea-de-Argeș la Valea-Calului, Sânicora, dealurile Chiriceștilor și muntele Arefu; Panciu; Bârlad la Crângu (pl. indig. 1901); în Dobrogea pe la Te-lița, Cocoși, Balabancea, Țiganca, Măcin, frecuent.

**C. Cyanus** L. spe. p. 1289 (Consp. p. 341). — Adiție: vulgar *Mă-*

*turică* (Mehed.). Câmpuri. Braniștea în Mehedinț; Tulcea spre Trestenic.

**C. mollis** W. et Kit. pl. rar. hung. vol. 3 tab. 219 (Consp. p. 342). — Regiunea alpină. Negoiu (pl. indig. 1990) și pe Lespezi în Argeș; Buceci la Poeana-Stânei (Marc. Br. exsic. anu 1906).

**C. axillaris** Willd. spe. pl. vol. 3 p. 2299 (Consp. p. 442). — Regiunea alpină. Surul în Argeș (pl. indig. 1899); Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1900) și la Poeana-Stânei (Marc. Br.); Ceahlău (pl. indig. 1901).

β. *pennatifida* (Grec. consp. p. 342). — Regiunea alpină. La Negoiu pe Lespezi; Buceci pe Caraimanu.

**C. napulifera** Rochel acta hung. evkon. 1834 tab. 3 (Consp. p. 342). — Adiție: sinonimu *C. nissana* Petrov. addiț. ad. fl. nissana p. 110. — Locuri aspre sau pietroase. Murfatlar.

**C. orientalis** L. spe. 1291 (Consp. p. 343). — Câmpuri inculte, sol fertil. Techirghiol-Movilă, Tuzla.

**C. rigidifolia** Bess. in litt. 1831 ap. DC. prodr. vol. 6 p. 587 (Consp. p. 343). — La locuri ca și precedente. Techirghiol-Movilă, foarte a rar.

În Conspect l. c., vorbind de caracterele acestei specii, comparând-o și cu *C. stereophylla* Bess., din eroare s'a zis că această din urmă «nu există în Dobrogea» în loc să se zică că *există și în Dobrogea*, precum se și vede în pag. 344 n<sup>o</sup> 19.

**C. Kotschyana** Heuff. in Flora ann. 1835 vol. 1 p. 245 (Consp. p. 344). — Regiunea alpină. La Negoiu pe Lespezi; Buceci la Omu (pl. indig. an. 1901) și pe Caraimanu.

**C. maculosa** Lam. encycl. méth. vol. 1 p. 669 în sensul larg (Consp. p. 346). — Câmpuri, locuri aspre, locuri pietroase. Curtea-de-Argeș; Agiud; Botoșani pe la pădurea Rediului (pl. indig. 1901).

**C. Kanitziana** Janka ap. Brânza veget. dobrog. p. 43; Br. fl. dobrog. p. 213 (Consp. p. 347). — Locuri aspre sau pietroase. Greci pe dealu Bujor plasa Măcinului.

**C. jurineifolia** Boiss. diagn. ser. 2<sup>o</sup> fasc. 3 p. 73 (Consp. p. 348). — Regiunea câmpiilor și a stepelor danubiane. Urziceni, Speteni, Cotorca, Țândărei, Hagieni în Ialomița.

**C. diffusa** Lam. encycl. méth. vol. 1 p. 675 (1783): — *genuina, spinescens* (Consp. p. 348). — Adiție: sinonimu *C. parviflora* M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 2 p. 357 (1808); Sibth. Sm. prodr. fl. græc. vol. 2 p. 203 (1813)-non Desf. fl. atlant. vol. 2 p. 301 (1800). — Câmpuri sterile la locuri joase salsuginoase. Stepele Buzeului pe la Gălbenăși și Benți; Techirghiol-Movilă, copios.

Este de însemnat, sub raportul geografiei noastre botanice, prezența acestei specii maritime dincoace de Dunăre în stepele Buzeului. de oarece până acum am găsit-o numai pe o mică părticică între Galați.

și gura Prutului, pe când în stepele pontice ale Dobrogei meridionale este pretutindeni.

**C. solstitialis** L. spe. p. 1298 (Consp. p. 348). — Câmpuri, locuri aprice. Curtea de-Argeș; Cotorca în Ialomița; Brăila.

**C. Calcitrapa** L. spe. p. 1297 (Consp. p. 349). — Câmpuri inculte. Cotorca; Brăila; Măcin, Greci pe valea Slatina.

**Kentrophyllum lanatum** DC. et Duby bot. gall. vol. 1 p. 293 (Consp. p. 349). — Câmpuri, la locuri aspre aprice. Pe Prahova la Hătcă-rău; Urziceni, Speteni; Cotorca; Hagieni; Brăila; Constanța pe la Nazarcea (pl. indig. 1900); Techirghiol-Movilă, Tuzla.

## II<sup>o</sup>. LIGULIFLORÆ DC.

### Ord. III<sup>o</sup>. Cichoraceæ Juss.

**Scolymus hispanicus** L. spe. p. 1143 (Consp. 350). — Pe locuri tari aspre, subsol calcar. Malurile lacului Techirghiol subț stabilimentul balnear Movilă.

**Hypochaeris helvetica** Jacq. fl. austr. vol. 2 tab. 165 (Consp. p. 350). — Regiunea alpină. Parângu pe Găuri și Gruiu; Negoii pe munții Lespezi și Paltina; Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901); Slănic pe muntele Șandru; Ceahlău.

**H. maculata** L. spe. p. 1140 (Consp. p. 350). — Livezi, poeni. Govora; Curtea-de-Argeș în cimitir; Botoșani pe la pădurea Rediului (pl. indig. an. 1901).

**H. radicata** L. spe. p. 1140 (Consp. p. 350). — Livezi, tuferișe. Govora; pe Argeș la Cumpăna și la gura Budei; Buceci în valea Jepilor (pl. indig. 1901: (forma *monocephala*).

**Lapsana communis** L. spe. p. 1141 (Consp. p. 351). — Păduri. Govora; Curtea-de-Argeș la Valea Calului; Câmpina.

β. *glanduloso-pilosa* Schur enum. transs. p. 355 (Consp. l. c.). — Brănești pădurea Pustnicu, pădurea Cernica.

**Aposeris foetida** Less. syn. p. 128 (Consp. p. 352). — Păduri montane. La Cetatea-Neamțu (pl. indig. 1901).

**Leontodon autumnalis** L. spe. p. 1123 (Consp. p. 352). — Livezi. Comuna Braniștea în Mehed. Govora; Curtea-de-Argeș, Albești și pe Argeș la gura Budei; Câmpina; Slănic.

Adiție subț acesta:

\* β. *subpratensis*. Intermediu între forma specifică vulgară și între specia următoare: pendunculi îngroșați subț calatide; însă, foliolele pericline exterioare sparsiu fusco-păroase, cele interne glabre. — Parângul pe Mirul-mare și Gruiu; Buceci pe Caraimanu (*L. pratensis* Grec. consp. p. 352-non Link nec Koch); Slănic pe muntele Pufu.



**L. pratensis** Rchb. fl. germ. excurs. p. 253. (Grec. consp. p. 352). *L. autumnalis*  $\beta$ . *pratensis* Koch syn. p. 480; Rchb. icon. fl. germ. vol. 19 tab. 15. *Oporinapr atensis*  $\beta$ . DC. prodr. vol. 7 p. 1909.—Livezi subalpine, pe muntele Urzicarul la Predeal (pl. indig. 1900); Bușteni (pl. indig. 1901).

Pedunculii îngroșați subț calatide: ei și toate foliolele pericline dens și negricios păroase.

**L. croceus** Hænke in Jacq. collect, vol. 2 tab. 16 (Consp. p. 353).—Regiunea alpină. Negoiu, pe Lespezi și pe Paltina în Argeș; culmea Caraimanului (pl. indig. 1901); Parângu pe Mirul-mare și Prislopu.

**L. medius** Simk. enum. transs. p. 352; Grec. consp. p. 352.—Culmea Ceahlăului la Șea subț Pinii pumili (pl. vasc. ceahl. p. 52, ved. sinonimii și deslușirile).

**L. hispidus** L. spe. ed. 1<sup>o</sup> p. 779 (1753); ed. 2<sup>o</sup> p. 1124 (1763); Grec. consp. p. 353. Livezi. Comuna Braniștea în Mehed.; Govora; Curtea-de-Argeș, Corbeni până la Cumpăna; Predeal; comuna Broșteni distr. Râmicu-Sărat; Slănic. De altfel, plantă răspândită mult.

$\gamma$ . *danubialis* Grec. consp. p. 353. **L. danubialis** Jacq. enum. stirp. vindobon. p. 139 et 274 tab. 164 (1762). *L. hostile* L. spe. p. 1123 (1763); Koch syn. p. 481.—Livezi, cu osebire în părțile montane. Pe Argeș la Cumpăna; Predeal; Slănic; Ceahlău (pl. indig. 1899); Parângu pe Gruiu.

**L. asperum** Rchb. fl. germ. excurs. p. 252 (Consp. p. 353).—Crângulețe, locuri aprice. Constanța spre Murfatlar.

**Pieris hieracioides** L. spe. p. 1115 (Consp. p. 354).—Livezi, tuferișe. Govora; Curtea-de-Argeș; pe Ialomița la Speteni, Borănești; Techirghiol-Movilă.

$\beta$ . *crepoides* Koch syn. p. 484 (Consp. p. 354).—Tuferișe, cu osebire în părțile montane. Voineasa; Govora la mătura Mătușea-Floarea; Slănic.

**Scorzonera hispanica** L. spe. 1112 (Consp. p. 355).—Adiție:

\* • *var. edulis* Moench.—Vulg. *Artifi. Salată-de-iarnă. Salsifi* (dupe franțuzește). *Scorzoneră*.—In cultura grădinilor de verdețuri. București.

**S. purpurea** L. spe. p. 1113 (Consp. p. 355).—Regiunea alpină și subalpină în poeni și livezi. Zănoaga în Argeș (pl. indig. 1899); la Negoiu pe munții Lespezile și Paltina; Cheea-Argeșului sus pe Arefu; Slănic pe muntele Șandru.

**S. rosea** W. et Kit. pl. rar. hung. vol. 2 tab. 121 (Consp. p. 356).—Regiunea alpină și subalpină superioară. Parângu; Negoiu pe Paltina; Slănic pe muntele Șandru; Ceahlău (pl. indig. 1899 și 1901).

Asemănarea între aceste din urmă două specii este prea multă, adesea și dificil ca deosebire. Totuși, la cea dintâi foile sunt mult mai

înguste și lineare, acheniile peste tot netede; cea din urmă are foile mai lăticele, linear-lanceolate, plane, acheniile pe coaste și spre vârf scabruș-cule, tulpina radicală groasă și fibrilară.

**Tragopogon floccosus** W. et Kit. pl. rar. hung. vol. 2 tab. 112 (Consp. p. 365).—Șesuri de lăss năsipos. Hanu-Conache distr. Tecuci.

Planta noastră ca înfățișare generală corespunde exact cu figura de *T. heterospermus* Schweigg. dată de Reichenbach icon. fl. germ. vol. 19 tab. 41, dupe mulți autori, trece drept *T. floccosus* W. et Kit.

**Podospermum laciniatum** DC. fl. fr. vol. 4 p. 62 (Consp. p. 356).—Locuri joase salsuginoase. Podu-Iloaei (Iași); Constanța pe la Tăbăcăria-veche.

**Taraxacum serotinum** Poir. in Lam. encycl. méth. suppl. 4 p. 73 (Consp. p. 356). Stepele salsuginoase ale Buzeului și ale Ialomiței pe la Cotorca; Constanța (pl. indig. 1900) și Techirghiol-Movilă copios.

**T. officinale** Wigg. primit. fl. holsat. p. 3 (Consp. p. 357).—*α. genuinum* Koch syn. p. 492.—Livezi. Govora; Curtea-de-Argeș; Slănic.

*β. glaucescens* Koch l. c. **Leontodon glaucescens** M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 3 p. 530 (1819). *L. corniculatum* Kit. ap. Schult. œst. fl. vol. 2 p. 406 (1814). *T. glaucescens* DC. prodr. vol. 7 p. 148 (Consp. p. 357).—Stepele Ialomiței pe la Cotorca, Hagieni.

*γ. alpinum* Koch l. c. (Consp. l. c.)—Livezi alpine quasi subalpine. Predeal pe Urzicaru (pl. indig. 1900).

**Chondrilla juncea** L. spe. p. 1120 (Consp. p. 358).—Adiție: vulgar *Amețeala-oilor*. Regiunea câmpiilor și a stepelor danubiane și pontice. Brănești; Cotorca, Hagieni, în Ialomița; Brăila; Măcin; Techirghiol.

**Prenanthes purpurea** L. spe. p. 1121 (Consp. p. 358). Vulgar *Cre-stățea*.—Stânci montane subalpine quasi alpine. La Negoiu pe muntele Paltina; Chșea-Argeșului; Slănic pe muntele Pufu.

**Lactuca muralis** Fresen. taschenb. p. 484 (Consp. p. 359).—Păduri și mai cu osebire făget. Govora; Curtea-de-Argeș pe dealurile Rugetului; munții Buzeului în Valea-Rusilei (pl. indig. 1900); munții Slănicului; Iași la pădurea Ciurea.

Adiție, dupe aceasta (Consp. p. 359):

\* **L. viminea** Link enum. hort. berol. vol. 2 p. 281 (1822); Schultz-Bip. ap. Koch syn. ed. 2<sup>o</sup> p. 495; Gren. Godr. fl. fr. vol. 2 p. 318; Rchb. icon. fl. germ. vol. 19 tab. 67; Halácsy consp. fl. græc. vol. 2 p. 212. *Prenanthes viminea* L. spe. p. 1120. *Phænopus vimineus* DC. prodr. vol. 7. p. 176. *Chondrilla viminea* Lam. encycl. méth. vol. 2 p. 77.—☉ Iulie. August. Păduri, tuferișe în părțile muntoase ale Dobrogei. Badag la Alibeichioi pe muntele Consulu (Cineli).

**L. quercina** L. spe. p. 1118 (Consp. p. 359).—Paduri, la Slănic.

**L. saligna** L. spe. p. 1119 (Consp. p. 359).—Locuri inculte, drumuri, garduri. Govora; Curtea-de-Argeș; Slănic; Constanța spre Techirghiol.

**Sonchus arvensis** L. spe. p. 1116 (Consp. p. 360).—Adiție: vulgar *Iarba-îepurilor*. *Tălchărea*. Locuri inculte, tărâm fertil, în părți umede. Govora; Curtea-de-Argeș; Câmpulung; Slănic.

β. **uliginosus** Grec. consp. p. 360. **S. uliginosus** M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 2 p. 238. *S. arvensis* var. *laevipes* Koch syn. p. 498.—Locuri joase umede. Lunca Prahovei la Tinoasa, Crivina; Tuzla (pl. indig. 1900) pe marginea lacului Techirghiol spre Sanatoriul Eforiei.

Adiție: după acesta (Consp. p. 361):

\* **S. palustris** L. spe. p. 1116; DC. prodr. vol. 7 p. 187; Koch syn. p. 498; Ledeb. fl. ross. vol. 2 p. 835; Rchb. icon. fl. germ. vol. 19 tab. 63 optime; Boiss. fl. orient. vol. 3 p. 798; Halácsy consp. fl. græc. vol. 3 p. 205.—4 Iulie-Septemvrie. Locurile umede mlăștinoase în pădurea Tinoasa pe Prahova.

**Mulgedium alpinum** Less. synanth. p. 142 (Consp. p. 361).—Păduri, poale de păduri în regiunea montană subalpină. Pe Lotru, sus la Voineasa și Vidra; Predeal în valea Roșnovei la gura Brădetului, poalele Urzicarului (pl. indig. 1900); Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901); Slănic pe Șandru.

**M. tataricum** DC. prodr. vol. 7 p. 248 (Consp. p. 361).—Năsipuri și dune maritime, locuri sărate. Malul mării jos sub Hotel-Movilă și pe marginea lacului Techirghiol în Dobrogea, copios.

**Crepis rhœadifolia** M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 2 p. 259 (Consp. p. 361).—Vulgar: Barba-lupului.—Câmpuri, drumuri, păragini, locuri inculte. Govora; Curtea-de-Argeș; Brănești; Urziceni, Speteni, Cotorca; Brăila; Măcin, Greci.

Dupe acesta, adiție:

\* 1<sup>b</sup>. **C. foetida** L. spe. p. 1135; Koch syn. p. 500; Boiss. fl. orient. vol. 3 p. 851; Rchb. icon. fl. germ. vol. 19 tab. 83 fig. 1 (*C. foetida* α. *vulgaris* Bichoff). *Barkhausia foetida* DC. prodr. vol. 7 p. 158.—4 Iulie. August Tuferișe, locuri aprice, pe malul mării la Techirghiol-Movilă.

**C. setosa** Haller fil. in Rœm. archiv. vol. 1 p. 2 (Consp. p. 361).—Livezi, locuri ierboase, căi. Govora; Curtea-de-Argeș, Albești; Câmpina; Brănești; Dealu-Mare la Valea-Călugărească.

**C. rigida** W. et. Kit. pl. rar. hung. vol. 1 tab. 19 (Consp. p. 362).—Tuferișe pe coastele pietroase la Slava-Cerchezească spre Ciucurova, plasa Babadag.

**C. biennis** L. spe. p. 1136 (Consp. p. 362).—Adiție: sinonimu *C. biennis* α. *runcinata* et β. *lacera* Koch syn. p. 504. Livezi, locuri ierboase. Curtea-de-Argeș, Corbeni; Predeal.

**C. tectorum** L. spe. p. 1135 (Consp. p. 362). — Livezi, tuferișe pe locuri tari. Ulmeni distr. Teleorman (pl. indig. 1899); Mărășești, Ivești.

**C. virens** Vill. pl. dauph. vol. 3 p. 142 (Consp. p. 362). — Livezi pe munții Slănicului.

**C. præmorsa** Tausch in Flora ann. 1828 vol. I ergs. bl. p. 79 (Consp. p. 363). — Livezi la locuri umede, vâlcele. Dealu-Mare pe înălțimi la valea Călugărească; Ceahlău (pl. indig. 1899).

**C. paludosa** Moench meth. p. 535 (Consp. p. 363). — Locuri umede, în văi și vâlcele pe lângă izvoare. Pe Argeș la Cumpăna în valea Caprei, Predeal sus spre Schit; Ceahlău (pl. indig. 1899).

**C. grandiflora** Tausch in Flora vol. 29 an. 1828 ergs. bl. p. 86 (Consp. p. 363). — Regiunea alpină. Munții Negoilului pe Paltina; Parângu.

Adiție după aceasta:

\* **11. C. chondrilloides** Frœl. in DC. prodr. vol. 7 p. 171 (1837); Simk. enum. transs. p. 363; Grec. pl. vasc. ceahl. p. 53. *Hieracium chondrilloides* L. spe. p. 1128; Jacq. enum. stirp. vindob. p. 143 et 273; Baumg. enum. transs. vol. 3 p. 25. *Geracium chondrilloides* Rchb. fl. germ. excurs. p. 259. *Crepis Jacquinii* Tausch in Flora an. 1828 ergs. bl. p. 79; Koch syn. p. 506; Rchb. icon. fl. germ. vol. 19 tab. 99; Sag. et Schn. carpat. centr. vol. 2 p. 264; Schlechtd. Langeth. deutsch. fl. vol. 30 fig. 3233. — 7 Iulie. Aug. Stânci în regiunea alpină. Culmea Ceahlăului (*C. Jacquinii* Grec. pl. indig. 1900 p. 29); Buceci valea Cerbului spre Omu (*C. Jacquinii* Grec. pl. indig. 1901 p. 15); în Rarău pe Pietrile-Doamnei.

Omonima specie *Crepis chondrilloides* Jacq. enum. stirp. vindob. p. 312 (= *Andryala chondrilloides* Scop. fl. carn. ed. 2<sup>o</sup> vol. 2 p. 115), pe care Sprengel a deosebit-o subtr denumirea de *Crepis Adonis* în pugill. pl. vol. 1 p. 93, să nu se confunde cu specia lineană.

\* **12. C. sibirica** L. spe. p. 1135; Koch. syn. p. 508; Rchb. icon. fl. germ. vol. 19 tab. 97; Schlechtd. Langeth. deutsch. fl. vol. 30 fig. 3239; DC. prodr. vol. 7 p. 167. — 7 Iulie. August. Păduri subalpine pe la limita superioară, spre cea alpină. Buceci, în valea Jepilor pe Caraimanu (pl. indig. 1901 p. 15.)

**Hieracium Pilosella** L. spe. p. 1125 sensu lato (Consp. p. 364). — Adiție: vulgar *Opintic. Roscob* (Transs).

Cu rizomă lungăreață grosieră sau subțire. În loc de caul, *scap simplu monocefal*, a rar scapul de jos furcat și atunci este *bicefal*, mai mult sau mai puțin gros sau subțire, *Stolonii mai mult sau mai puțin lungi* și foile lor *merg descrescând către vârf*. Foile rosulare multe, oblungi, lanceolate sau cam obovate, pe *pagina superioară de un verde închis* sau *deschis* și uneori cam glaucescent sau cam lucios, *pe pagina*

*inferioară cu denși peri stelați (flocci, tricholepi)*, întocmind un context tomentos alb, alburui sau cam suriu; a rar cu asemenea peri, însă rari, și pe pagina superioară. Involucrul globos sau ovat, a rar ventricos, cu baza rotundă, cam de 6—14 mm. lungime; foliolele sale lineare acute, au exteriorul cănunt, negrișor sau negru prin perii ce poartă, marginea ușor golașe membranoidă. Indumentul involucrului și al scapului se compune de peri stelați, peri lungi setiformi și de peri scurți glandulari în amestec diferit. Ligulele sunt galbene, *cele marginale au pe spate o vârguță de un roșiu-oacheș*. — 4 Mai până în toamnă. — Specie polymorfă, deci mult variabilă.

*α. vulgare* Tausch in Flora ann. 1828, I ergs. bl. p. 52; Monnier ess. monogr. hierac. p. 18 (1829) et auctorum: — *a) gennuinum* s. *epilosum*, *b) pilosum*, *c) rigidipilum* sec. Næg. et. Pet.—(Consp. p. 364).—Comuna Braniștea în Mehedinț; pe muntele Arefu în Argeș; București, Hrestrău; Brăila pe la Ianca; Curtea-de-Argeș în cimitir: *forma furcata* s. *var. euronotum* Næg. et Pet. (Sag. et Schn. carpat. centr. 2 p. 280).

*β. robustius* Koch syn. p. 509 (Consp. p. 364): forma pilosa, forma pilosa (tricholepium, trichophorum Næg. et Pet.).—Livezi. București aleea spre Școala de Agricultură; Slănic pe muntele Pufu.

Adiție, după varietatea *δ*. (Consp. p. 364):

\* *ε. florigerum*.—Livezi pe locuri tari, pietroase, în munții Slănicului (Marc. Br. leg.).

*Stolonii* numeroși, foarte lungi (peste 20—30 cent.) subțirei, prostrați, spre vârf ascendenți, foliați: unii simpli și fără flori; *cei mai mulți ramificați în tierțul superior în câte 3—5 ramuri foliate și terminate în câte o calatida*, sau *emițând câteva calatide axilare lung pedunculate, pedunculele monocefale*. Scapii simpli, 1—2, ating lungimea de 20—25 cent. Calatidele mediocre, cam obovate. Indumentul foilor pe pagina inferioară dens, de un cenușiu-albicios e în mult contrast cu verdele închis cam glaucescent al paginei superioare.

\* *ζ. elatum*. — Mici tuferișe, tărâm humifer poros. Predeal pe la Schit și în valea Roșnovei în fund.

Scapul unic, înalt și robust, 25—40 cent. înălț. aproape de bază monofil și bifurc, cracii foarte lungi, monocefali, cu abundant vestmânt de peri lungi negricioși pe tapetul de toment amestecat cu peri scurți glandulari negricioși spre vârf mai cu osebite, ceea ce urmează și pe dosul foliolelor pericline. *Stolonii* mediocri. Foile oblungi lanceolate și mai ales spatulato-lanceolate, moi, de un verde deschis opac ce după uscare abia fac contrast cu culoarea tomentului paginei inferioare. Calatidele mari, au caracterele generale ale speciei; ligulele galbene cu vârguță roșiu-oacheș pe spate la cele marginale.

Adiție dupe *H. bifurcum* M. Bieb. (Consp. p. 365):

\* 4<sup>b</sup>. *H. Moritzianum* Hegetschw. et Heer flora d. schweitz p. 781 (1840); A. Kern. œstr. bot. zeit. 1872 p. 280; Simk. enum. tr. p. 366. (× *H. aurantiacum-Pilosella* A. Kern. l. c.). *H. stoloniflorum* Baumg. enum. transs. vol. 3 p. 21 (1816); Schur enum. transs. p. 379; Porc. fan. nesseud. p. 203 și diagnos. p. 160; Griseb. comment. hierac. p. 6; Naeg. et Pet. monogr. pilosell. quoad plantam transsilvanicam-non W. et Kit. pl. rar. hung. vol. 3 tab. 273 cujus stirps ad *Hieracio aurantiaco-pilosellæforme* pertinet sec. F. Schultz in Flora ann. 1861 p. 34. *H. versicolor* Fries in vet. acad. förh. tom 8<sup>o</sup> p. 149 (1847); ejus epicris. hierac. p. 15; Schur enum. transs. p. 380. *H. Hausmanni* Rchb. icon. fl. germ. vol. 19 (1860) tab. 128, sed ligularum color luteis in icon. differt.—7 Iunie. Iulie.—Livezi subalpine. Predeal pe la Schit.

Rizomă oblungă repentă. Scapul subțire, cam 20—27 cent. înălțime, investit cu toment albicios în amestec cu numeroși peri scurți glandulari negri și peri lungi sétiformi negricioși mai ales spre vârf, afl sau a 1—2 foi mici și atunci furcat, cracii lungi, mono-bicefali; stolonii mai mult sau mai puțin lungi sau scurți, sterili sau unii florigeri și simpli. Foile oblung spatulate îngustate în pețiol lăticel, întregi sau mucronulat-dentate, pe ambe fațe cam de aceeași culoare verde închisă, pe desubt cu toment răișor, pe deasupra glaucescente și cu lungi peri simpli sporadici. Involucrul măricel, semiglobos, cu caracterele celui de *H. Pilosella*; ligulele de culoare auranțică cam versicoloră ce prin uscarea devine închis-auranțică cum la *H. aurantiacum*.

*H. petræum* Friv. in Flora ann. 1836, II p. 436 (Consp. p. 365).—Adiție: Neilr. diagn. p. 78. *H. breviscapum* DC. sec. Griseb. spicil. rumel. vol. 2 p. 271 (1844).—Stânci montane alpine. Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1900 Knecht. leg.) și pe Jepeii-mari (pl. indig. 1901); pe muntele Șandru la Slănic, frecuent.

Precum notează Heuffel în enum. pl. banat. p. 114, exemplarele de pe stâncile cu țărâm negru humifer, cresc mult mai mari și viguroase, până la 30 cent. înălțime și, în loc de 1—2 calatide, caulul dobândește o corimbă de 5—8 calatide, precum sunt unele din exemplarele din localitatea din urmă. La noi, până acum, muntele Șandru este al doilea punct din lanțul carpatic unde s'a găsit acest frumos și interesant Hieracium.

*H. Auricula* L. spec. p. 1126 (Consp. p. 366).—Livezi montane și submontane. Parângu pe Mirul-Mare; pe Clăbucetu și la Cumpăna la gura Budei; Curtea-de-Argeș pe Sânicora și pe dealurile vecine; Predeal (pl. indig. 1900).

γ. *minimum* Grec. consp. p. 366.—Regiunea alpină. Parângu la Găuri pe Piatra-Tăiată; Negoiu pe Podeanu.

Adiție dupe acesta (Consp. p. 366):

\* 7<sup>b</sup>. *H. Auricula-Pavichi*.— 4 Iunie. August. Slănic, pe Șandru.

Stolonifer, monofil și cu foi rosulare persistente, însușind subț acest raport caracterele de *H. Auricula* L.; stolonii având foile către vârf crescând, similare celor rosulare, toate cam glaucescente, întregi, aproape cu totul lipsite de peri floconoși pe pagina inferioară, cu puțini și rari peri simpli lungi ce pe petioli și jos pe caul divin mai denși. Caulul și calatidele dispuse cum la *H. Pavichii* Heuff. (= *H. Fussianum* Schur): caulul ca 20—28 cent. înălțime, chiar de jos și de la axila de alte foi mici și diforme emite lungi ramuri subramificate, monocefale, constituind astfel o paniculă laxă a 8—12 calatide. De altfel, caulul este rotund, subțirel-striat, glabru sau numai a-locuri cu ceva toment de peri floconoși, cu puțini și rari peri simpli lungăreți, însă cu totul lipsit de peri glandulari; tot astfel este și involucrul calatidelor ce împreună cu ligulele galben-sulfurii nu difer de *H. Auricula* L.

Să fie oare un hibrid sau monstruositate paniculată de *H. Auricula* L.? Rămâne de urmărit cu cercetatea chestiei ce punem.

*H. pratense* Tausch in Flora ann. 1828 ergs. beibl. !p. 56 (Consp. p. 367). Livezi, poeni, în regiunea montană. Slănic, pe muntele Pufu și la Cascade.

*H. subauratum* Schur enum. transs. p. 386 (Consp. p. 367).—Livezi montane. Slănic, pe muntele Șandru.

*H. aurantiacum* L. spe. p. 1126 (Consp. p. 367).—Livezi, poeni, păsciuni în regiunea montană alpină, subalpină. Pe Lotru la Voineasa în valea Voinășiei, Vidra la gura Pravățului; Parângu pe Mirul-Mare; Negoiu pe Lespezi și Paltina; Predeal pe Clăbucetu-Taurului; Slănic pe muntele Șandru; Ceahlău (pl. indig. 1901).

*H. præaltum* Vill. ap. Gochnat cichor. p. 7 (Consp. p. 368).—Adiție: spre consultare Lindem. fl. cherson. vol. 1 p. 381; Porciu diagn. pl. fanerog. p. 168 sub *H. florentinum* All.—Livezi, Slănic pe muntele Dobrolui.

*H. Bauhini* Schult Obs. bot. p. 164 (Consp. p. 368).—Livezi. Dealu-Mare la Valea Călugărească; Slănic pe muntele Pufu.

A se consulta și Porciu diagn. pl. fanerog. p. 172 sub *H. magyricum* N. P.

*H. pannonicum* Naeg. Pet. monogr. deutsch. pilosella p. 749; Porciu diagn. pl. faner. p. 181. (Consp. p. 369).—Livezi, tuferișe. București în parcul Școalei de Agricultură; Căldărușani pe la monăstire.

*H. cymosum* L. spec p. 1126 (Consp. p. 369).—Adiție:

\* *a. genuinum* Fries epicr. hierac. p. 36; A. Kern. veget. 2<sup>o</sup> p. 297. *H. poliotrichum* Wimm. fl. siles. p. 433. *H. Nestleri a. hirsutum* Koch syn. p. 515.—Livezi. Predeal; Broșteni în Suceava.



\* *β. Nestleri*.—*H. Nestleri* Vill. voy. bot. p. 62 tab. 1 fig. 1; Rchb. icon. fl. germ. vol. 19 tab. 125 fig. 1; A. Kern. veget. 2<sup>o</sup> p. 296. *H. Nestleri β. brevisetum* Koch. syn. p. 515.—Livezi. Dealu-Mare la Valea Călugărească.

*H. sabinum* Seb. et Maur. fl. romana p. 270 tab. 6 (Consp. p. 369).—Livezi, poeni de păduri, în regiunea dealurilor. Comana spre valea Gurbanului; Focșani; Botoșani (pl. indig. 1899); Dobrogea septentrională pe la Trestenic, Cîlic.

*H. echlroides* Lumn. fl. poson. p. 348 (Consp. p. 370):—*β. albo-cinereum* Rupr. ap. Fries epicr. hierac. p. 39.—Livezi, locuri deschise aprice. Bârlad la Dealu-Mare (pl. indig. 1901);—*γ. setigerum* Tausch in Flora vol. 29 an. 1828 ergs. bl. p. 61. *H. Rothianum* Wallr. sched. p. 417; Rchb. icon. fl. germ. vol. 19 tab. 118.—Bârlad (pl. indig. 1901).

*H. alpinum* L. spe. p. 1124 (Consp. p. 370).—Regiunea alpină. La Negoiu pe munții Lespezi și Paltina; Ceahlău (pl. indig. 1900); Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901); Parângu la Găuri pe Piatra-Tăiată.

\* 22<sup>b</sup>. *H. Csereianum* Baumg. enum. transs. vol. 3 p. 20 (1816). *H. alpinum b) Csereianum* Simk. enum. transs. p. 370. *H. decipiens* Tausch in Flora vol. 29 an. 1828 ergs. bl. p. 66. *H. sudeticum* Froell. in DC. prodr. vol. 7 p. 209 (1838); Rchb. icon. fl. germ. vol. 19 tab. 145 fig. 3 et 4: plantă è Transsilvania-non Sternb. in acta soc. regensb. tom. 2 p. 62 tab. 5 (1818). *H. alpinum δ. sudeticum* Koch syn. p. 526-non Wimm. et Grab. nec Sternb. *H. carpathicum* Schur enum. transs. p. 897 (1866)-non Bess.—4 Iulie. August. Regiunea Alpină. La Negoiu pe muntele Paltina.

*H. villosum* L. spe. p. 1130 (Consp. p. 370).—Regiunea alpină. La Negoiu pe munții Lespezi și Paltina; Ceahlău (pl. indig. 1900 și 1901).

*H. bifidum* Kit. in Hornem. hort. hafn. vol. 2 p. 761 (Consp. p. 371). Poeni, stânci, în regiunea alpină, subalpină. La Negoiu pe Lespezi; Ceahlău (pl. indig. 1899 și 1900).

*H. murorum* L. fl. suec. ex m. parte sec. Fries novit. ed. 2<sup>o</sup> p. 258 (Consp. p. 371).—Poale de păduri montane, poeni, crânguri, stânci montane. Oteștii-de-Sus distr. Oltul; Cheea-Argeșului; Slănic.

*H. subcaesium* Fries epicr. hierac. p. 92 (Consp. p. 371).—Sinaia.

*H. transsilvanicum* Heuff. enum. pl. banat. p. 115 (Consp. p. 372).—Stânci, văi montane, în regiunea subalpină. Pe Lotru la Voineasa; pe Suru și Zănoaga (pl. indig. 1899), la stația Cumpăna în Valea Caprei și pe Buda; Cheea-Argeșului; pe Dâmboviță la comuna Isoarele; Predeal; Slănic pe muntele Șandru.

Specia carpatică se crede a fi identică cu cea din Croația ce poartă numirea de *H. leptcephalum* Schloss. et Vukotin. fl. croat. p. 897 (1858) după cum arată chiar Vukotinovici «Prinosci geognosi è botan. Hrv. 1878 p. 38.»



**H. pelesii** Grec. consp. p. 373.—Poale de păduri în regiunea montană subalpină. Predeal la Schit pe sus; mult.

În Conspect l. c. am pus întrebarea: oare hibrid să fie?—Credem că nu, de oare ce, afară de valea Peleşului unde pentru prima oară a fost aflat, îl aflăm la și Predeal; probabil că există și în alte părți din întinderea de la Sinaia la Predeal și, ca atare, se menține constant..

**H. vulgatum** Fries novit. ed. 2<sup>o</sup> p. 258 (Consp. p. 373). — Livezi montane. Slănic.

**H. prenanthoides** Vill. pl. dauph. vol. 8 p. 108 (Consp. p. 374).—Păduri, tuferișe în regiunea montană subalpină. Buceci pe la Sinaia și Bușteni; munții Slănicului.

**H. racemosum** W. et. Kit. pl. rar. hung. vol. 2 tab. 193 (Consp. p. 374). — Păduri în regiunea submontană, la Curte-de-Argeș dealurile Hodiei și ale Rugetului.

**H. boreale** Fries novit. ed. 2<sup>o</sup> p. 161 (Consp. p. 374).—Păduri, pe dealurile Hodiei și ale Rugetului la Curtea-de-Argeș.

**H. pseudoboreale** Grec. consp. p. 375.—Păduri, crânguri. Lunca Prahovei la Crivina și Tinoasa; pe Ialomița la Speteni pe coaste; în Ilfov pe la pădurea Dascălu-Creața; dealuri la Doftana distr. Bacău (pl. indig. 1899); Bicaz pe Piatra-Corbinei (pl. indig. 1900); pe malul mării la Techirghiol-Movilă.

**H. umbellatum** L. spe. p. 1131 (Consp. p. 376): — *α. genuinum* Griseb. (Consp. l. c.).—Govora; Cheea-Argeșului; Slănic în livezile Pufului.

**H. foliosum** W. et Kit. pl. rar. hung. vol. 2 tab. 145 (Consp. p. 377).—Pe lângă păduri, în tuferișe, pe coastele Ialomiței despre Speteni, Borănești.

La noi rară specie și până acum cunoscută numai în părțile montane ale Dobrogei septentrionale. Prezența sa dincoaci de Dunăre este de însemnat sub raportul geografiei botanice în România.

#### AMBOSIACEÆ Link.

**Xanthium Strumarium** L. spe. p. 1400 (Consp. p. 377). — Adiție: vulgar *Cănarîță* (Fr. Damé dict. vol. 1 p. 188).—Constanța (pl. indig. 1900).

**X. macrocarpum** DC. fl. fr. suppl. p. 356 (Consp. p. 377).—Locuri aride, inculte, drumuri. Isaccea, Jijila Măcin; năsipurile mării la Techirghiol-Movilă.

#### CAMPANULACEÆ Juss.

**Phyteuma confusum** A. Kern. nov. pl. spec. fasc. 1 (1870); Grec. consp. p. 378.—Regiunea alpină. Pe culmea Mirului-Mare în Parângu

(2000 m.); culmea Surului (pl. indig. 1899); Negoiu pe Lespezi și Paltina.

În multă asemănare cu cea următoare de care diferă prin foi mult mai înguste, lingulato-lineare, la vîrf ușor acute, tricrenate; prin bactecele exterioare foarte late, ovate și ușor acute la vîrf, cam întregi, fimbriat-ciliate, mai scurte decât capitula ce este globoasă cu florile albastre închis, dinții calicului glabri, corola glabră și laciniile sale ajung până aproape de inserția sa.

**Ph. orbiculare** L. spe. p. 242; Koch syn p. 534; Rchb. icon. fl. germ. vol. 19 tab. 222; Grec. consp. p. 378.—Regiunea alpină. Parîngu; Surul și Prislopu (pl. indig. 1899); Buceci în valea Ialomiței spre Obârșie (pl. indig. 1899) și pe Caraimanu (Marcel Br.); Ceahlău (pl. indig. 1901).

**Ph. alpina** Schur enum. transs. p. 429 (Consp. p. 378).—Regiunea alpină. Buceci la Obârșia Ialomiței (*Ph. austriacum* Beck, Grec. pl. indig. 1899) și pe Caraimanu (pl. indig. 1901).

**Ph. Vagneri** A. Kern. sched. ad. fl. austro-hung. n° 964 (Consp. p. 378).—Livezi subalpine quasi alpine. La Negoiu pe munții Lespezi și Paltina; Ceahlău (pl. indig. 1900); Slănic pe muntele Șandru.

**Ph. canescens** W. et Kit. pl. rar. hung. vol. 1 tab. 14 (Consp. p. 379).—Tuferișe pe la pădure lângă stația ferată Roșiești în Tutova.

Adiție, dupe acesta:

\* **7. Ph. anthericoides** Nym. consp. p. 484 (1879) solum nomen; Grec. plantes de la macéd. p. 37. *Podanthum anthericoides* Janka ap. Nym. l. c. solum nomen; Velen. fl. bulg. p. 372 (1891); Grec. plante macedonice p. 67.—4 Iunie. Iulie. Locuri aspre sau pietroase la Constanța, dealurile din apropiere.

Stă în multă asemănare cu *Ph. limonifolium* Sibth. et Sm. (= *Podanthum limonifolium* Boiss., *Campanula limonifolia* L.) ca fond; totuși, se arată mai rămoasă, cu florile solitare, a rar și unele fasciculate a câte două. Însă ca deosebire mai însemnată se poate constata că florile sale sunt mult mai pedicelate, sepelele mai lungi și nervurile capsulelor mult mai proeminente.

**Campanula alpina** Jacq. enum. stirp. vindobon. p. 36 et 210 (Consp. p. 379).—Stânci în regiunea alpină. Parîngu la Găuri pe Piatra-Tăiată; în Argeș pe Surul (pl. indig. 1899), Negoiu, Lespezi și Paltina; Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901); Ceahlău pl. indig. 1899 și 1900).

**C. sibirica** L. spe. p. 236 (Consp. p. 379).—Livezi, la locuri deschise, în părțile montane și câmpene. Comana; Bârlad la Crîngu; Treștiana în Dorohoi; în Argeș pe Surul (pl. indig. 1899); Bicăz distr. Neamțu și la Constanța (pl. indig. 1900).

β. *paniculata* Alph. DC. prodr. vol. 7 p. 465 (Consp. p. 379).—Buceci, în Poeana-Stânci la Sinaia.

**C. Cervicaria** L. spe. p. 235 (Consp. p. 380).—Livezi, tuferișe. Pe Lotru la Brezoiu; Curtea-de-Argeș pe dealurile Hodiei și Chiriceștilor; Dealu-Mare; Slănic; Ceahlău.

**C. glomerata** L. spe. p. 235 (Consp. p. 380).—Livezi, tuferișe. Curtea-de-Argeș la Valea Calului, dealurile Hodiei și Chiriceștilor; Slănic; Ceahlău  
 γ. *speciosa* Alph. DC. prodr. vol. 7 p. 467 (Consp. p. 881).—Livezi montane subalpine quasi alpine. La Negoiu pe munții Lespezi și Paltina; Predeal pe Clăbucetu-Taurului; Ceahlău (pl. vasc. ceahl. p. 56).

**C. macrostachya** Kit. ap. Willd. enum.hort. berol. vol. 1 p. 213 (Consp. p. 381).—Tuferișe, locuri deschise. Severin la Crihală (pl. indig. 1900); Brănești pe la pădurea Cernica.

**C. Trachelium** L. spe. p. 235 (Consp. p. 381). — Păduri, tuferișe. Slănic.—β. *dasycarpa* Koch syn. p. 539. *C. urticifolia* Schmidt. fl. bohem. p. 73. Pădure, la Isbănești distr. Dorohoi; Vulcana (pl. indig. 1900).

**C. latifolia** L. spe. p. 233 (Consp. p. 381),—Livezi montane. Voinasa pe Voinășița; Negoiu pe munții Lespezi și Paltina; Slănic pe muntele Pufu.

**C. rapunculoides** L. spe. p. 234 (Consp. p. 382):—*Lusus b*). Ovariul și laciniile calicelui cu totul glabre:—γ. *neglecta* Grec. consp. l. c. In Argeș pe muntele Paltina, Cheea-Argeșului; Slănic.—δ. *ramosa* Grec. l. c. In valea Jiului la Păiuș, Lainici; Cheea-Argeșului; Curtea-de-Argeș la Valea-Calului și pe dealuri; Bicaz (pl. indig. 1900); Ceahlău pe Secu și Chica-Baiului (pl. vasc. ceahl. p. 56).

**C. bononiensis** L. spe. p. 234 (Consp. p. 382). — Livezi. Speteni, Borănești, în distr. Ialomița; Agiud pe dealuri; Constanța (pl. indig. 1900).

**C. pseudolanceolata** Pantocsek œster. bot. zeit. 1883 p. 31 solum nomen; Sag. et Schn. fl. carpat. centr. vol. 2. p. 369 descripta, et exsic. ! (Consp. p. 383).—Livezi montane subalpine quasi alpine. În Parângu pe Piatra-Tăiată, Vidra; Argeș pe muntele Paltina; Predeal (pl. indig. 1899); Monăstirea Cheea în Prahova; Slănic; Ceahlău la Șea, Secu, Chica-Baiului (pl. vasc. ceahl. p. 56).

β. *arcuata* Simk. enum. transs. p. 385; Grec. consp. p. 383.—**C. arcuata** Schur enum. transs. p. 445 (1866). — Slănic pe muntele Șandru.

**C. Scheuchzeri** Vill. prosp. p. 22 (Consp. p. 384). — Adiție:

\* β. *stenopylla* Schur enum. transs. p. 443 sec. descriptione; Grec. pl. vascul. ceahlău. p. 56. *C. Scheuchzeri* β. *dacia* Porciu pl. fanerog. năseud. p. 98 et exsic. !—Stânci în regiunea alpină. Parângu pe muntele Pleșiu; la Negoiu pe Paltina; Slănic pe muntele Dobrului; Ceahlău (pl. indig. 1900), la Șea și la Fântâna-Răce (Grinț. exsic. anu 1905).

Este o formă transitorie între *C. Scheuchzeri* Vill. și *C. consanguinea* Schott cu care se poate confunda, considerând portul caulilor și

mai ales dispoziția și forma foilor. Totuși, se poate deosebi prin caulii și foile sale mai învârtosate și nu pe așa plăpânde cum la *C. consanguinea*; prin florile sale ceva mai mari și mai ales prin lanciniile calicului, lineare sau subulate, pe  $\frac{1}{3}$  parte din lungimea corolei, drepte sau cam reflexe,—iar nu subțirele, setiforme, arcuate și lungi că egalează aproximativ lungimea corolei, precum se observă la *C. consanguinea* Schott propriu-zisă.

Dar *C. Scheuchzeri* var. *dacia* ce avem în colecția Herbariului European al Facultății de medicină, chiar de la regretatul Porciu, din munții Rodnei (Coronzișul și Mihăeasca) este considerată drept *C. consanguinea* de către Simonkai și, dupe dânsul în urmă, de Porciu chiar, în lucrarea sa, *Diagnozele pl. fanerog. etc.* p. 197, ceea ce nu admitem.

*C. tenuifolia* Hoffm. fl. germ. p. 100 (Consp. p. 385).—Locuri pietroase. Munții Pricopanului la Măcin, Greci, Hasanlar.

*C. pusilla* Hænke ap. Jacq. collect. vol. 2 p. 79 (Consp. p. 385).—Stânci în regiunea alpină. La Negoiu pe muntele Lespezi; Buceci.

*C. carpatica* Jacq. hort. vindobon. vol. 1 tab. 57 (Consp. p. 386).—Stânci montane subalpine. Monăstirea Cheea; în Argeș pe Suru (pl. indig. 1899); Ceahlău (pl. vasc. ceahl. p. 57).

*C. persicifolia* L. spe. p. 232 (Consp. p. 386). — Livezi, crânguri, margini de păduri. Govora; Curtea-de-Argeș și pe Argeș în sus la Cumpăna.

β *dasycarpa* Kit. ap. Schultz aest. fl. 1814 p. 404 (Consp. l. c.). — Livezi, pe Argeș la gura Budei.

*C. abietina* Griseb. iter. hung. p. 333 (Consp. p. 386).—Livezi și stânci montane alpine și subalpine. Parângu pe Gruiu; Suru (pl. indig. 1899); Negoiu pe muntele Paltina și Lespezi; Cheea Argeșului pe la Cetatea Vlad-Țepeș; Monăstirea Cheea în Prahova; Slănic pe muntele Șandru.

*C. patula* L. spe. p. 232 (Consp. p. 387).—Livezi, margini de păduri. Govora; pe Argeș la gura Budei și la Cumpăna; valea Zăbrăușu în Putna; pădurea Mogoșoaia (pl. indig. 1899); Lucășești distr. Bacău (pl. indig. 1900); Ceahlău (pl. vasc. ceahl. p. 57).

γ *neglecta* Alph. DC. prodr. vol. 7 p. 480 (Consp. p. 387). — Păduri, locuri umbroase. Voineasa pe Voinășița spre Pichetu graniței. Cheea-Argeșului; Monăstirea Agapia.

*C. Rapunculus* L. spe. p. 232 (Consp. p. 388). — Livezi, tuferișe. Govora în parc; Greci în părțile de pădure; Bârlad la Crângu (pl. indig. 1901).

## CUCURBITACEÆ Juss.

*Bryonia alba* L. spe. p. 621 (Consp. p. 389).—Urcătoare pe mă-răcinișuri și garduri rustice. Curtea-de-Argeș; Onești în Bacău.

## CLASA IV

## Dicotiledoane Gamopetale Superovarii.

## ERICACEÆ Ach. Rich.

## Tribul I. Vaccineæ.

**Vaccinium Myrtillus** L. spe. p. 498 (Consp. p. 390).—Locuri pietoase montane subalpine, alpine. Cheea-Argeşului sus pe muntele Arefu, la Cumpăna pe valea Caprei, pe Buda şi sus pe Paltina; Ceahlău (pl. indig. 1899); Parângu pe Mirul-mare, Vidra la gura Pravăţului.

**V. uliginosum** L. spe. p. 499 (Consp. p. 390). — Regiunea alpină la locuri mlăştinoase. În Argeş pe Suru (pl. indig. 1899) şi Negoiu; în Rarău; Slănic pe muntele Şandru.

**V. Vitis Idæa** L. spe. p. 500 (Consp. p. 390). — Adişie: sinonimul *V. punctatum* Lam. encycl. méth. vol. 1 p. 74 (1783). Vulgar, *Cocăzar*, *Merişoară*, *Smărdar* de adăogat.—Regiunea alpină. Negoiu, Lespezi; Ceahlău (pl. indig. 1899 şi 1900); Parângu pe Mirul-Mare.

## Tribul II. Ericineæ.

**Calluna vulgaris** Salisb. in linn. transs. vol. 6 p. 317 (Consp. p. 391).—Adişie: sinonimul *Erica vulgaris* L. spe. p. 501.—Până acum aflată tot în munţii Slănicului, de unde ni s'a mai adus.

**Bruckenthalia spiculiflora** Rchb. fl. germ. excurs. p. 414; ejus icon. fl. germ. vol. 17 tab. 111 (Consp. p. 391).—Stânci, locuri pietroase. Pe Sturu în Gorji; pe Lotru sus la Vidra; pe Zănoaga (pl. indig. 1899); Paltina, Lespezi şi la gura Budei în distr. Argeş; Sinaia, Azuga.

Adişie, dupe *Bruckenthalia* (Consp. p. 391):

\*3<sup>b</sup>. **ANDROMEDA** L. gen. n° 549.

\* **1. A. polifolia** L. spe. p. 564; DC. prodr. vol. 7 p. 606; Koch syn. p. 547; Rchb. icon. fl. germ. vol. 17 tab. 10 fig. 1. *Rhododendron polifolium* Scop. fl. carn. vol. 1 p. 287 (1772). — 5 Iunie. Iulie. Mlăştini turbifere pe muntele Tinosul-Mare lângă Şaru-Dornei distr. Suceava (D. I. Constantineanu).

**Rhododendron Kotschyi** Simk. enum. transs. p. 389 (Consp. p. 391).—Regiunea alpină. Pe Negoiu, Lespezi şi Paltina în Argeş; Parângu.

**Azalea procumbens** L. spe. p. 215 (Consp. p. 391).—Regiunea alpină. — Parângu pe Mirul-Mare şi pe Sturu distr. Gorji; pe Negoiu în Argeş; Buceci la Omu (pl. indig. 1899) şi pe Căraimanu (pl. indig. 1901).

## Tribul III. Pirolaceæ.

**Pirola chlorantha** Swartz in acta acad. holm. 1810 p. 190 (Consp. p. 392).—Păduri, în munţii Slănicului.

**P. media** Swarz in acta acad. holm. 1804 p. 257 tab. 7; DC. prodr. vol. 7 p. 774; Koch syn. p. 550; Rchb. icon. fl. germ. vol. 17 tab. 103 fig. 2; Schlechtd. Langeth. deutsch. fl. vol. 20 fig. 2047.— 4 Iulie. August. Păduri montane în regiunea subalpină. Stâncile pâraului Dobru prin brădet la Slănic; Ceahlău, la Bicaz și pe Bâta-Vacei (pl. indig. 1900 p. 31 și pl. vascul. ceahl. p. 58); poalele Ceahlăului la Hangu (*P. rotundifolia* Grec. consp. p. 392 și pl. vasc. ceahl. p. 58-non L.).

**P. secunda** L. spe. p. 568 (Consp. p. 392).— Tot prin brădet, în munții Slănicului (pl. indig. 1899); poalele Caraimanului (pl. indig. 1901) și pe Furnica.

**Monesis grandiflora** Salisb. în Gray britsch. arr. 2 p. 403 (Consp. p. 392).—Păduri montane subalpine, cu osebite brădet. Poalele Negoiiului la stâna Podeanului; Predeal pe Clăbucetu-Taurului; pe Lotru, sus la Voineasa și Vidra; în Argeș pe Zănoaga; Buceci la Schitul-Ialomiței (pl. indig. 1899); Ceahlău (pl. indig. 1899), Bicaz pe Bâta-Vacei (pl. indig. 1900).

#### MONOTROPACEÆ Lindl.

**Monotropa Hypopitys** L. spe. p. 555 (Consp. p. 393).—*α. glabra*.—Păduri montane subalpine, putrigaiuri pe la rădăcini de brazi și fagi, tărâm humifer moale. În Putna la Tichiriș și Vizantea; Slănic; Ceahlău (pl. indig. 1901).

#### ASCLEPIADACEÆ Lindl.

**Cynanchum acutum** L. spe. p. 310 (Consp. p. 395).—Locuri aprice pe coastele Ialomiței pe la Coșereni, Urziceni; Giurgiu pe ruinele vechilor fortificații (pl. indig. 1899); Ajiud; Techirghiol-Movilă pe malurile mării.

#### APOCYNACEÆ Lindl.

**Vinea herbacea** W. et Kit. pl. rar. hung. vol. 1 tab. 9 (Consp. p. 396).—Adiție: vulgar *Sămăchișe* (după Fr. Damé nouv. dict.) Crânguri. În Dobrogea pe la Constanța, Murfatlar.

#### GENTIANACEÆ Lindl.

**Menianthes trifoliata** L. spe. p. 208 (Consp. p. 396).—Locuri umede tinoase și băltoase. Pe Colentina la Fundeni-Mărcuța; pe Bahluiul la Iași (pl. indig. 1901).

**Limnanthemum nymphoides** Link fl. portug. vol. 1 p. 344 (Consp. p. 397).—Ape limpezi stagna, heleșteuri, la locuri puțin profunde. Pe Colectina la Fundeni-Mărcuța.

**Lomatogonium carinthiacum** Al. Braun în bot. zeit. ann. 1830 p. 221 (Consp. p. 397).—Regiunea alpină, pe stânci de conglomerat. Buceci la Schitul Ialomiței (pl. indig. 1901).

**Gentiana lutea** L. spe. p. 329 (Consp. p. 397).—Regiunea alpină pe tărâm negru humifer profund. Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901).

**G. punctata** L. spe. p. 329 (Consp. p. 397).—Regiunea alpină. În Parângu la Găuri pe Piatra-Tăiată; Negoiu pe Paltina; Buceci pe Jepii-mari.

**G. cruciata** L. spe. p. 334 (Consp. p. 398).—Livezi, crânguri în regiunea subalpină și a dealurilor submontane. În Argeș pe Paltina, Arefu și pe dealuri lângă Curtea-de-Argeș; Ceahlău (pl. indig. 1901).

**G. asclepiadea** L. spe. p. 329 (Consp. p. 398).—Tuferișe, margini de păduri. Curtea-de-Argeș pe dealurile Hodiei și la Râpa-cu-brazi; Slănic.

**G. frigida** Hænke in Jacq. collect. vol. 2 p. 13 (Consp. p. 398).—Piscuri alpine. Negoiu; Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901).

**G. acaulis** α. L. spe. p. 330 (Consp. p. 398).—Livezi, păsciuni, în regiunea alpină. Parângu la Găuri pe Piatra-Tăiată (1800 m.); Munții Negoii pe Lespezi și Paltina; Buceci în Poeana-Stănei; Predeal pe Susaiu (pl. indig. 1900); culmea Caraimanului (pl. indig. 1901).

**G. orbicularis** Schur enum. transs. p. 458<sup>8</sup> (Consp. p. 399).—Regiunea alpină culminantă. Buceci pe Caraimanu și la Omu (pl. indig. 1901).

Credem că aceasta este cu adevărat *G. carpatica* Kit. ap. Schult in œsterr. fl. n<sup>o</sup> 1008 precum este cunoscută de Grisebach (ved. gentian in DC. prodr. vol. 9 p. 104).

**G. æstiva** Rœm. et Sch. syst. veget. vol. 6 p. 156 (Consp. p. 399).—Regiunea alpină. Ceahlău (pl. indig. 1899 și 1900).

**G. nivalis** L. spe. p. 332 (Consp. p. 399).—Regiunea alpină. Negoiu; Ceahlău (pl. indig. 1901); Parângu la Găuri stâna lângă Căldare (cam la 2000 m.).

În loc de *G. obtusifolia* Willd. și var. β. *Uechtritzii* (Consp. p. 400) a se pune următoarea nomenclatură:

14. **G. Uechtritzii** Grec. pl. indig. anu 1900 p. 31 și pl. vascul. ceahl. p. 60. *G. obtusifolia* var. *Uechtritzii* Sag. et Schn. fl. carpat. centr. vol. 2 p. 401 (1891) et exsicc.! plantă ẽ Transsilvania prope Corona (Brașov); Grec. consp. p. 400. *G. germanica* var. *caucasica* Griseb. gentian. et spe. gentian. p. 245 (1839) ex parte; ejus in DC. prodr. vol. 9 p. 97 ex parte—non *G. caucasica* M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 1 p. 198 (1808) cujus stirps ẽ loco natali diversă! *G. Amarella* et *G. germanica* auct. transs. et roman. olim-non L. nec Willd.—*G. chloræfolia* Schur œst. bot. zeit.

1858 p. 239 et enum. transs. p. 461-non Nees ab Esemb. *G. caucasica* Simk. enum. transs. p. 398 (1886) et exic.! *G. carpatica* Wettst. œst. bot. zeit. 1892 n° 1; ejus in A. Kern sched. ad. fl. austro-hung. fasc. 6 p. 55-non Kit. ap. Schultes œst. fl. 1814 n° 1008 et Griseb. in DC. prodr. vol. 9 p. 104 n° 88 (1).— ☉ Iunie-Septemvire. Livezi subalpine și quasi alpine.—Exemplarele enumerate în Conspect din următoarele localități se vor considera în categoria aceasta: la Negoiu pe Comarnicu și Clăbucetu; Rucăr, Valea-Muierei, Pajerea; Leota; Predeal; Azuga, Bușteni, Sinaia; Ceahlău, Piatra pe Cernegura; Broșteni pe Picioru-Văcăriei, Bîda și Răreu în Suciava. Dupe acestea, adifie: în Argeș pe înălțimile Arefului; Comănești la Valea Ciobănașului în Bacău; Ceahlău (*G. obtusifolia* β. *Uechtrizii* Grec. pl. indig. 1899).

β. *atroviridis* Grec. pl. indig. ann. 1900 p. 32. *G. chloræfolia* a. *atroviridis* Schur enum. transs. p. 462 (1866).—Predeal, în livezi pe Susaiu și spre Schit.

Formă precoce estivă ce apare înflorind pe la începutul lui Iunie. Statura mai mică, caul erect firm, foliat, ramos și împreună cu foile de un verde purpuriu închis ce prin uscarea devine negricios.

γ. *depauperata* Grec. consp. p. 400 *G. Amarella* var. *depauperata* Rochel pl. rar. banat. fig. 13 (1828)-sed non *G. Amarella* L. *G. germanica* β. *minor* Meyer ap. Griseb. in DC. prodr. vol. 9 p. 96 (1839). — Livezi, pe coaste la Azuga la poale de pădure; Ceahlău la Panaghia (Grinț exsic. anu 1906).

Umilă, ca 5—9 cent. simplă, subțirică și debilă, uni-paucifloră.

(1) Conform regulii de prioritate, numirea dată de profesorul Sagorski se cuvine să fie adoptată ca numire capitală de specie pentru planta carpatică menționată; de aceea n'am adoptat numirea de *G. carpatica* dată de profesorul Rich. Wettstein mai în urmă, cu atât mai mult cuvînt că numirea de *G. carpatica* se găsește aplicată de Kltabel cu mult mai înainte altei specii carpatice care, fără îndoială, nu poate fi decât actuala *G. orbicularis* Schur, soră bună cu *G. bavarica* L. cu care a și fost odinioară confundată de către botaniștii transilvaniei până la Schur. (Conf. Griseb. gentian. in DC. prodr. vol. 9 p. 104).

Prin făptură și caracterele sale, fiind în cea mai strînsă afinitate cu *G. Amarella* L., cu *G. germanica* Willd. și cu *G. obtusifolia* Willd. în cercul „*Endotrichae*”—unde diferențierea pe niște caractere constante și nediscutabile a numeroaselor speii create întîmpină cele mai mari dificultăți, mai ales din cauza formelor tranziționale ce se ivesc alături cu cele tipice,—specia noastră lesne a putut fi luală drept una sau alta din speciile sus arătate sau ca varietate a unei dintre acestea. Totuși, comparată cu speciemele din Germania ale acestor specii și cu cele de *G. caucasica* M. Bieb. din chiar Caucazia, caracterele plantei carpatice nu sunt în deplină indentitate cu acestea. De aceea, considerînd făptura sa, oarecum proprie și cu care sstfel se menține în întinderea Cargaților noștri, avînd și dînsa varietăți, merită a fi luală drept specie proprie.



Adiție dupe genul *Gențiana*:

\* 4<sup>b</sup>. *SWERTIA* L. gen. pl. n. 321, exclus. sp.

\* 1. *S. punctata* Baumg. enum. transs. vol. 1 p. 190 (1816); Rchb. fl. germ. excurs. p. 429 et icon. fl. germ. vol. 17 tab. 3; Griseb. in DC. prodr. vol. 9 p. 132; Fuss. fl. transs. excurs. p. 436.—7 Iulie. August. Regiunea alpină, pe muntele Paltina la Negoiu.

*Erythræa Centaurium* Pers. syn. vol. 1 p. 283 (Consp. p. 401).—Livezi, poeni de păduri. Govora; Curtea-de-Argeș, Albești; Cheea-Argeșului pe muntele Arefu; Valea Călugărească; Odobești, Panciu.

*E. ramosissima* Pers. syn. vol. 1 p. 283 (Consp. p. 401).—Livezi, poeni, prundișuri. Govora; Curtea-de-Argeș; Iași pe la pădurea Bârnovei; în Tulcea la valea Turlacului lângă Rachel; Ceahlău (pl. indig. 1899).

Adiție (Consp. p. 402):

\* 3. *E. spicata* Pers. syn. vol. 1 p. 283 (1805); Griseb. in DC. prodr. vol. 9 p. 60; Koch syn. p. 567; Ledeb. fl. ross. vol. 3 p. 51; Rchb. icon. fl. germ. vol. 17 tab. 20 fig. 4; Gren. Godr. fl. fr. vol. 2 p. 885; Schlecht. Langeth. deutsch. fl. vol. 16 fig. 1573. *Gentiana spicata* L. spe. p. 333 (1762). *Chironia spicata* Wild. spec. pl. vol. 1 p. 1070 (1797).—☉ Iulie-Septemvrie. La locuri umede joase. Techirghiol pe lângă lacu despre Tuzla (pl. indig. 1900 p. 32).

Din secția «*Spicaria*» Griseb.—Diferă de cele precedente: prin caulul strict, prin cima spiciformă cu puțină dichotomie la bază, având florile sesile, unele situate în dichotomie, altele la axila de brătee, solitare cam distante și spiciform dispuse; în fine, prin stigmele infundibuliforme și ușor bilobate, lobii contigui—nu bifide în 2 lamele plane.

## BORRAGINACEÆ Desv.

*Tournefortia Argusia* Rœm. et. Sch. syst. veg. vol. 4 p. 540 (Consp. p. 403; asemenea și Lindem. fl. cherson. vol. 2 p. 15).—Năsipuri și dune maritime pe litoral. Subt malurile mării la Techirghiol-Movilă și până la Sanatoriul Eforiei, frecuent.

*Heliotropium europæum* L. spe. p. 187 (Consp. p. 403).—Câmpuri, drumuri, locuri de cultură. Ploești, Valea Călugărească; Urziceni, Cotorca în Ialomița; Constanța (pl. indig. 1900), Techirghiol-Movilă.

*H. suaveolens* M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 3 p. 116 (Consp. p. 403).—Locuri pietroase. Măcin, Greci.

*Cerinth minor* L. spe. 196 (Consp. p. 403).—Livezi. Govora; Curtea-de-Argeș; Brănești; Comana.

*Echium vulgare* L. spe. p. 200 (Consp. p. 404).—Drumuri, garduri rustice. Govora; Curtea-de-Argeș; Comana.

Adiție la acesta:

β. *Wierzbichii* Haberl. ap. Heuff. enum. pl. banat. p. 127 (1858).—La Severin pe dealul Moșilor (pl. indig. 1899 p. 9).—Staminele incluse, nedepășind nivelul limbului corolei.

**E. italicum** L. spe. p. 139 (Consp. p. 404).—Câmpuri sterile în regiunea stepelor. Brăila ; Techirghiol-Movilă, Tuzla ; Greci, Cerna, Bala-bancea.

**E. altissimum** Jacq. fl. austr. vol. 5 p. 35 tab. 16 (Consp. p. 405).—Locuri aprice inculte. Vârciorova în poeana neutrală la gura Cerovățului; poeana Severinului spre Cerneți ; ochită și în trecere pe calea ferată pe la Filiași, Isalnița, Craiova până în malurile din stânga Oltului ; iar de aci spre București nu se mai vede (călătoria din 1907 Iulie 6).

Adiție, sub *Onosma tauricum* Pall. (Consp. p. 405).

\* *var. viride* Grec. pl. indig. 1900 p. 33.—Locuri aprice pe la pădurea de la Merei distr. Buzeu.

Cu foile mai lăticele și marginile plane, obtuse sau rotunzioare la vârf, perii setiformi stelați mai rărișori, așa că spațiile dintre ei lasă a se vedea mai mult verdele cenușiu al foilor; corola puberulă, ca 3 cent. lungime; laciniile calicelui linear-lanceolate, pe exterior cu peri setiformi și în interior glabre.

**Lithospermum officinale** L. spe. p. 189 (Consp. p. 406). — Tufe-rișe, păduri. Brănești pe la pădurea Cernica ; Slănic pe albia Slănicului; Piatra-Neamțu.

**L. arvense** L. spe. p. 189 (Consp. p. 406).—Câmpuri, drumuri, locuri de cultură. Brănești ; Dudeasca, Cotorca în Ialomița.

Diferă de celelalte prin acheniile sale tuberculat-rugozăse (*rhytisperma*) nelucioase și prin corola albicioasă cam gălbenie, iar nu cu acheniile netede, lucioase a mărgelușe pietroase, corola albă, albăstrue sau albastră.

**Pulmonaria officinalis** L. spe. p. 194 (Consp. p. 407). — Păduri, dumbrave. Govora; Curtea-de-Argeș pe dealurile Hodiei, mai a rar.

β. *obscura* Dumort. (Consp. l. c.).—Govora; Curtea-de-Argeș; lunca Prahovei la pădurea Tinoasa ; Piatra pe Cozla și pe muntele Petru-Vodă.

**P. rubra** Schott et Kotschy æst. bot. zeit. 1851 p. 395 (Consp. p. 407).—Păduri montane subalpine. Pe muntele Paltina, la Cumpăna pe valea Caprei și în Cheea-Argeșului pe la tunel ; în văile Ceahlăului pe Isvorul-alb (Grinț. exsic. anu 1906).

**P. mollissima** A. Kern. monogr. pulm. p. 47 (Consp. p. 407).—Tufe-rișe, crânguri pe lângă păduri în regiunea inferioară. Dealu-Mare la Valea Călugărească; Ștefănești pe la pădurea Andronache.

**Myosotis palustris** Roth. bot. abhandl. u. beobacht. p. 20 (Consp.

p. 408).—Locuri ude tinoase, margini de părauri, vâlcele umede. La Negoiu pe muntele Lespezi; Cumpăna pe valea Caprei și pe Buda, Cheea-Argeșului; Slănic pădurea Dobrului; Moinești (pl. indig. 1900); în Neamțu pe Petru-Vodă și Domesnicu; Măcin către Ghecet.

*β. laxiflora* Koch syn. p. 580 (Consp. l. c.).—Cheea-Argeșului.

**M. silvatica** Hoffm. deutsch. fl. vol. 1 p. 61 (Consp. p. 410).—Păduri umbroase. Lunca Jiului la Craiova; pe Argeș la Cumpăna, în Cheea-Argeșului și la Negoiu pe muntele Paltina; munții Slănicului; Ceahlău (pl. vasc. ceahl. p. 61).

**M. alpestris** Schmidt fl. bohem. vol. 3 p. 26 (Consp. p. 411).—Regiunea alpină. În Argeș pe Suru (pl. indig. 1899), la Negoiu pe Lespezi; Ceahlău (pl. indig. 1899 și 1900); Parângu la poalele Mândrei.

Adiție dupe *var. β*:

\* *γ. altior* DC. prodr. vol. 10 p. 108. *M. montana* M. Bieb. fl. taur. caucas. vol. 3 p. 116-non Bess. — Regiunea alpină la locuri umede. Ceahlău (pl. indig. 1900).

Specimene înalte, ca 30 cent., foile inferioare trecute și uscate, cele caulinare de aspectul și mărimea formei comune.

**M. intermedia** Link enum. hort. berol. vol. 1 p. 164 (Consp. p. 411).—Locuri ierboase, livezi. Pe Argeș la gura Budei; Curtea-de-Argeș; Dealu-Mare; Băneasa, București, Brănești; Piatra-Neamțu pe Cozla; Constanța.

**M. collina** Hoffm. deutsch. fl. vol. 1 p. 61 (Consp. p. 411).—Locuri ierboase, livezi. Pe Argeș la gura Budei; Curtea-de-Argeș; Brănești; Piatra-Neamțu pe Petricica; Constanța.

**M. stricta** Link enum. hort. berol. vol. 1 p. 164 (Consp. p. 411).—Locuri ierboase, livezi. Govora; Ștefănești pe la pădurea Andronache; Brănești; Babadag.

**M. sparsiflora** Mik. in Hoppe taschenb. p. 74 (Consp. p. 412). — Păduri umbroase, dumbrave. Dealu-Mare la Valea Călugărească; Brănești pădurea Pustnicu; Piatra-Neamțu pe Cernegura.

**Cynoglossum officinale** L. spe. p. 192 (Consp. p. 413). — Locuri inculte, drumuri, păragini. Govora; Curtea-de-Argeș, Pitești; Ploiești.

**Borrago officinalis** L. spe. p. 197 (Consp. p. 414).—Adiție: vulg. *Boranță* (Transs.).

**Symphytum ottomanum** Friv. in Flora ann. 1836 vol. 2 p. 439 (Consp. p. 414.—Tuferișe. Bârlad la pădurea Crângu.

**S. officinale** L. spe. p. 195 (Consp. p. 415).—Locuri umede joase. Curtea-de-Argeș; Brănești.

**S. uliginosum** A. Kern. œst. bot. zeit. 1863 p. 227 (Consp. p. 415).—Locuri joase mlăștinoase scurse. Brănești pe la pădurea Cernica; Măcin.

**S. tuberosum** L. spe. p. 195 (Consp. p. 415).—Păduri. Craiova în

lunca Jiului; valea Dâmboviței pe la comuna Isvoarele ; lunca Prahovei la pădurea Tinoasa; Panciu în Putna; muntele Petru-Vodă; Pitești la Trivale (pl. indig. 1901); Bicz (pl. indig. 1900).

Adiție:

\* *β. subcordatum*.—Foile cordate și subcordate.—Păduri la Sinaia. Adiție, dupe acesta (Consp. p. 415):

\* 5<sup>b</sup>. *S. foliosum* Rehmann zool. bot. gesellsch. v. wien. vol. 18 (1868) p. 495; J. A. Knapp pfl. v. galiz. und bukov. p. 213; Grec. pl. indig. an. 1901 p. 18.— 4 Iunie. Iulie. Păduri umbroase, la comuna Slobozia distr. Râmnicu-Sărat, aproape de capitală.

Rizomă oblică cărnoasă. Caul folios, profund striat, învestit cu peri aspri setiformi, simplu sau bifid și cu ramuri ce pornesc din axila foilor mezii. Foile radicale numeroase, ovat-lanceolate și hispide, cele caulinare moi, ovat-acuminate: din acestea cele inferioare ușor pețiolate, pețiolul lat aripat, cele mezii au baza dilatată și amplexicaulă, cele superioare sessile și toate nedecurente. Inflorescența amplă, a peniculă de cime unipare; florile galbene, corola infundibuliformă tubuloasă, fornicele incluse.

Prin rizoma sa lungă și oblică, prin caulul bifid în partea superioară este în asemănare cu *S. tuberosum*; însă diferă prin amplitudinea inflorescenței ce rezultă din ramurile lungi ce pornesc de pe la mezloc, ceea ce face că are asemănare cu *S. officinale* de care diferă prin foile nedecurente și prin rizoma lungă și oblică.

*S. cordatum* W. et Kit. pl. rar. hung. vof. 1 tab. 7 (Consp. p. 415).—Adiție: sinonimu *S. pannonicum* Pers syn. vol. 1 p. 161 (1805).—Păduri montane. Poalele muntelui Suru în Argeș (pl. indig. 1899); Cheea-Argeșului pe la cetatea Vlad-Țepeș; Ceahlău (pl. indig. 1900) și în văile muntelui Petru-Vodă.

*Nonea pulla* DC. fl. fr. ed. 3<sup>o</sup> vol. 3 p. 626 in adnot. (Consp. p. 416).—

Adiție: sinonimu *N. erecta* Bernh. verz. pflanz. erfurt. p. 127 (1800).—Tuferișe, locuri ierboase. Cotorca în Ialomița; Slănic; Ghidigeni în Tutova; Techighiol-Movilă.

*N. atra* Griseb. spicil. fl. rumel. vol. 2 p. 94 (Consp. p. 416).—În regiunea stepelor. Techirghiol, Constanța pe la Anadolchii și Murfatlar; Caracal la pădurea Preajba (pl. indig. 1900); Brăila (pl. indig. 1900).

*Anchusa officinalis* L. spe. p. 191 (Consp. p. 416):—*α. genuina, vulgaris* Auct.—Livezi, drumuri. Govora; Curtea-de-Argeș; Căldărușani; Bârlad (pl. indig. 1901); Vârciorova.

γ. *procera* Lindem. fl. cherson. vol. 2 p. 21. *A procera* Bess. enum. pl. volh. podol. bess. p. 8 (1822); Rchb. icon. fl. germ. vol. 18 t. 107 fig. 2.—Locuri aprice, tărâm fertil. Curtea-de-Argeș; Cotorca în Ialomița; Agiud; Constanța spre Tuzla (pl. indig. 1900); Techirghiol-Movilă, frecuent,

Înaltă că trece de 1 m. și viguroasă, caracteristică mai ales prin caliciul fructifer mare și umflat, ovato-subglobos; racemele cu mult mai lungi și numeroase.

**A. ochroleuca** M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 1 p. 125 (Consp. p. 417).— Adiție: Rchb. icon. fl. germ. vol. 18 tab. 107 fig. 5; Lindem. fl. chers. vol. 2 p. 22.—Livezi. Monăstirea Căldărușani; Râmnicu-Sărat (pl. indig. 1901); Agiud.

**A. italicea** Retz. observ. vol. 1 p. 12 (Consp. p. 417). — Crânguri, locuri aprice inculte. Govora spre stația calei ferate; Chitila; Brănești; Brăila.

**A. Barrelieri** DC. fl. fr. vol. 3 p. 623 (Consp. p. 417).—Tuferișe, poeni pe la margini de păduri. Craiova în lunca Jiului; valea Șușiței în Putna; Agiud; Bacău în lunca Bistriței.

Adiție, după aceasta (Consp. p. 418):

\* **6. A. stylosa** M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 1 p. 123 (1808) exclusis synonymis Barrelieri; ejus centur. pl. rar. ross. I tab. 23; Ledeb. fl. ross. vol. 3 p. 120; Boiss. fl. orient. vol. 4 p. 150; Lindem. fl. cherson. vol. 2 p. 23.—☉ Iunie. August. Locuri inculte, pe câmpiile de la Constanța spre Tuzla (pl. indig. 1900 p. 34).

Adiție, dupe genul *Anchusa* (Consp. p. 418):

\* 18. **LYCOPSIS** L. gen. n° 190 excl. Dillen. synonym.

\* **1. L. arvensis** L. spe. p. 199; Koch syn. p. 574; DC. prodr. vol. 10 p. 54; Ledeb. fl. ross. vol. 3 p. 121. *Anchusa arvensis* M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 1 p. 123; Boiss. fl. orient. vol. 4 p. 160; Rchb. icon. fl. germ. vol. 18 tab. 109 fig. 1.—Vulgar *Ochiu-lupului*. — ☉ Iunie-Sep-tembre. Locuri de cultură, locuri fertile. Brăila; Constanța spre Anadolchioi.

\* **2. L. orientalis** L. spe. p. 199; Koch syn. p. 574; DC. prodr. vol. 10 p. 54; Ledeb. fl. ross. vol. 3 p. 122; Schlecht. Langeth. deutsch. fl. vol. 19 fig. 1896. *Anchusa orientalis* Rchb. icon. fl. germ. vol. 18 tab. 109 fig. 2; Boiss. fl. orient. vol. 4 p. 161. *Lycopsis taurica* Stev. enum. taur. in bull. soc. natur. mosc. tom. 30 p. 257 (1857).—☉ Iunie. August. Locuri de cultură, loess năsipos. Constanța prin vii (pl. indig. 1900 p. 34); Techirghiol-Movilă în parc și pe malul mării.

Adiție, după genul *Lycopsis*:

\* Trib. III. *Rochelia* æ. Ovarul bicarpelar, carpelele uniloculare și uniovulate concrescute pe stil ginobazic. Fructul diachen, oblic, neechinat, dar punctat cu tubercule stelate. Semințele fără albumen.

\* 19. **ROCHELIA** Rchb. in Flora ann. 1824 p. 243.

\* **1. R. stellulata** Rchb. l. c.; ejus icon. fl. germ. vol. 18 tab. 132; DC. prodr. vol. 10 p. 176; Ledeb. fl. ross. vol. 3 p. 175; Boiss. fl. orient.

vol. 4 p. 244. *Lithospermum dispernum* L. spe. p. 191 (1763). *L. retortum* Pall. iter. vol. 3 p. 665 et append. p. 718 n° 72 tab. 2 fig. 2 (1776). *Messerschmidia cancellata* Asso syn. stirp. arragon. n° 162 (1779). — ☉ Mai-Septemvre. Locuri de cultură, petriș mănunt cu iarbă, drumuri. București în părțile de la vale; Comana pe lângă calea ferată în valea Spiridonului (Em. Teodorescu); Măcin spre Greci, Constanța spre Murfatlar (Grec. pl. indig. 1900 p. 33).

La prima privire s'ar crede un *Lithospermum* din rhtisperme; examinat mai de aproape diferă de genul și speciile acestuia.

### CONVOLVULACEÆ Vent.

*Convolvulus sepium* L. spe. p. 218. (Consp. p. 418).—Locuri joase băltoase. Govora; Curtea-de-Argeș; Urziceni, Cotorca în Ialomița.

*C. Cantabrica* L. spe. p. 225 (Consp. p. 418).—☐Locuri aride sau pietroase. Măcin pe poalele munților Pricopanului și la Taița; Constanța spre Murfatlar (pl. indig. 1900); stepele Ialomiței la Hagieni, Țândărei.

*Cuscuta Epithymum* L. syst. veget. edit. Murr. p. 140 (Consp. p. 419).—Adiție: vulgar *Barba-dracului*. Livezi, parazitic pe Trifoiuri, pe *Galium*. Govora; Curtea-de-Argeș; Slănic.

*C. trifolii* Babingt. et Gips. phytol. 21 p. 467 (Consp. p. 419). — Parazitic tot pe Trifoiuri. Alexandria în Teleorman (pl. indig. 1899).

Adiție, după aceasta (Consp. p. 419):

\* 2<sup>b</sup>. *C. planiflora* Ten. syll. pl. vasc. napol. p. 28 (1817); Koch syn. p. 570; Rchb. icon. fl. germ. vol. 18 tab. 142 fig. 7; Boiss. fl. orient. vol. 4 p. 116 var β; Lindem fl. cherson. vol. 2 p. 13. *C. Epithymum* var. *micrantha* Boiss. l. c. *C. alba* Presl. delic. prag. p. 87 (1822); Gren. godr. fl. fr. vol. 2 p. 505. *C. urceolata* Kuntze in Flora ann. 1846 p. 651. *C. cupulata* Engelm. cusut. p. 14 (1860). — ☉ Iunie-August. Parazitică pe *Galium* și pe *Euphorbia Gerardiana*. București la Filaret; Brăila, pe dealul Baldovinestilor (pl. indig. 1901 p. 18).

Cauli filiformi ramoși; florile albe sau de un roz palid, mici, sesile, în glomerule globoase capituliforme multiflore; lobii caliciului obtusi, limbul corolei întins, plan sau rotat mai lung de cât tubul ei, are laciunile ovate, scurt-acuminate, scuamele interne conivente, fimbriate.

De acord cu Lindemann, nu facem nici o diferență esențială specifică între planta lui Tenore și între aceea a lui Koch și Reichenbach și nici între cele lalte așa zise specii citate aici ca sinonime. Totul, după noi, ține de *C. Epithymum* de care diferă prin corola sa albă și divizată până mai jos de jumătate în cei cinci lobi, părand a fi oarecum 5-partită.

**C. europæa** L. spe. p. 180, exclus var.  $\beta$ . (Consp. p. 419). — Parazitică pe Urzici. Vaslui (pl. indig. 1900); Curtea-de-Argeș; Slănic.

Dupe aceasta adiție:

\* 3<sup>b</sup>. **C. obtusiflora** Humb. Bonpl. Kunth nov. gen. et spec. vol. 3 p. 122 (1818); Rchb. icon. fl. germ. vol. 18 tab. 143 fig. 2 sec. Engelm. Boiss. fl. orient. vol. 4 p. 121 cum variet. *C. breviflora* Vis. fl. dalm. vol. 2 p. 231 (1847). *C. Rogovitschiana* Trautw. in mélang. biolog. 2 p. 285 (1855). *C. obtusiflora* var. *breviflora* Engelm. cusc. p. 50 (1860). — ☉Iulie. August. Aflată parazitică pe *Xanthium spinosum* la comuna Stănești distr. Vlașca (pl. indig. 1901 p. 19).

Din Secția «Grammica» *Clistogrammicæ* Engelm.

Cauli filiformi, roșietici, rămoși; florile 4-mere, albe, pedicelate, în glomerule globoase capituliforme și nu prea multe, pedicelele a câte o bracteolă egalează lungimea caliciului ce are tubul obconic și laciniiile ce ajung până pe la mijloc; corola întrece cu puțin caliciul, are limbul explanat sau rotat, laciniiile ovate obtusiuscule devin în urmă reflexe, scuamele obovat-spatulate; două stiluri filiforme divaricate apoi deflexe, fiecare cu o stigmă capitato-globoasă; capsula globoasă deprimată, nudă, biloculară, nedehiscentă, bacciformă.

Urmează apoi § 2 (Consp. p. 419):

**C. monogyna** Vahl symb. vol. 2 p. 32 (Consp. l. c.). — Aflată parazitică pe *Cytisus hirsutus*. Mizil pe dealuri pe la Malul-Spart.

## SOLANACEÆ Bartl.

**Lycium vulgare** Dunal in DC. prodr. vol. 13 part. I p. 509 (Consp. p. 420). — Pe la garduri rustice, quasi spontaneu. Măcin, Greci; Constanța (pl. indig. 1900).

**Solanum Duleamara** L. spe. p. 266 (Consp. p. 420). — Garduri rustice, margini de păduri, la locuri dosnice. Govora; Curtea-de-Argeș; Cotorca pe la pădurea Dudeasca.

$\beta$ . *indivisum* Boiss. fl. orient. vol. 4 p. 285 (Consp. l. c.). — Brănești, Paserea; Constanța în Valul-Traian spre Alacapù (pl. indig. 1900); Te-chirghiol-Movilă pe malul mării.

**S. nigrum** L. spe. p. 266 (Consp. p. 421). — Adiție: vulgar *Morea. Moartea-porcilor*. — Pe la garduri, drumuri. Govora; Curtea-de-Argeș; plantă prea vulgară și frecventă în toată țara.

Adiție:

• **S. esculentum** Dunal solan. p. 208 tab. 3 p. E (1816) exclusis synonym. *S. insanum* L. et var. plur.; ejus in DC. prodr. vol. 13 part. I p. 355 var.  $\alpha$ . — *S. Melongena* L. spe. p. 266 (1763); însă, numirea de

*Melongena*, dată de Tournefort, nu este de acceptat căci, dupe Dunal, cuprinde mai multe specii confuze.—⊙ În tot timpul de vară până în toamnă, în cultura grădinilor de verdeați. Alimentară. Vulgar *Pătlăgele* sau *Plătăgele*. *Pătlăgele-vinete*.—Deci, astfel fiind, se va suprima genul *Melongena* cu totul din Conspect p. 423.

*Atropa Belladonna* L. spe. p. 260 (Consp. p. 422).—Păduri în regiunea montană și submontană. Râmnic (pl. indig. 1901); Slănic.

### VERBASCACEÆ Bartl.

*Verbascum Thapsus* L. spe. p. 252 (Consp. p. 425). Locuri tari cam pietroase. Babadagh, Ienisala; prundișuri, pe Argeș la Cumpăna.

*V. phlomoides* L. spe. p. 253 (Consp. p. 425).—Câmpuri, locuri necultivate, drumuri. Govora; Curtea-de-Argeș, Albești; Zimnicea; Cotorca; Măcin, Greci, Taița; Constanța.

*V. Blattaria* L. spe. p. 254 (Consp. p. 426).—Livezi, drumuri, garduri rustice. Govora; București, Herestrău; Cotorca în Ialomița.

*V. Kanitzianum* Simk. et Walz. in magyar. növen. lapp. tom. 2 p. 148 (Consp. p. 427).—Șisturi, locuri pietroase, în regiunea montană. Pe Argeș la stația Cumpăna în valea Caprei, gura Budei și în Cheea-Argeșului; Buceci pe jos la Poeana-Țapului și Bușteni (pl. indig. 1901); Slănic pe muntele Pufu; poalele Ceahlăului și pe Secu-Buhalniței.

*V. Lychitis* L. spe. p. 253 (Consp. p. 427).—Locuri pietroase și șisturi, drumuri. Posada (pl. indig. 1899); Herestrău, Băneasa; Iași (pl. indig. 1901); Cernavoda.

*V. banaticum* Schrad. monogr. verb. vol. 2 p. 28 (Consp. p. 427).—Locuri aspre sau pietroase. Constanța în Valul-Traian spre Alacapù (pl. indig. 1900), Techirghiol-Movilă.

*V. austriacum* Schrad. l. c. (Consp. p. 428).—Câmpuri, dealuri, la locuri necultivate. Govora spre stația calei ferate; Cotorca, Dudeasca pe la pădurea Arionoaei; Constanța spre Alacapù (pl. indig. 1900).

*V. nigrum* L. spec. p. 253 (Consp. p. 428).—Tuferișe, mărăcinișuri, margini de păduri. Pe Argeș la Cumpăna în valea Caprei; Dudeasca pe la pădurea Arionoaei; Ceahlău jos pe la Bicaz (pl. indig. 1899).

*V. glabratum* Friv. in Flora ann. 1836 p. 44 (Consp. p. 429).—Tuferișe, șisturi calcare, pe Argeș la Cumpăna pe valea Caprei și în Cheea-Argeșului.

*V. phoeniceum* L. spe. p. 254 (Consp. 430).—Livezi. Govora; Curtea-de-Argeș, Albești; Dealu-Mare; Babadagh.

Adiție, dupe acesta:

\* 21. *V. rubiginosum* W. et Kit. pl. rar. hung. vol. 2 p. 216 tab, 197



(1805); Benth. in DC. prodr. vol. 10 p. 241; Rchb. fl. germ. excurs. p. 379 et icon. fl. germ. vol. 20 tab. 31; Fuss fl. transs. excurs. p. 465.— $\times$  *V. nigro-phœniceum* F. W. Schultz ap. Koch syn. p. 592; Boiss. fl. orient. vol. 4 p. 346.  $\times$  *V. orientali-phœniceum* Reichardt ap. Lindem. fl. cherson. vol. 2 p. 43.  $\times$  *V. austriaco-phœniceum* Simk. enum. transs. p. 415.—☉ Iunie. Iulie. Locuri pietroase: poalele Negoiiului pe la stânga Podeanului.

\* 22.  $\times$  *V. phœniceum-Blattaria*.—☉ Iulie. August. Tărâm fertil la locuri de cultură. Curtea-de-Argeș spre monastire, în comunitate cu *V. phœniceum* și *V. Blattaria* (anul 1906 Iulie 22).

Caul vîrtos, aproape de jos piramidal ramificat în ramuri foarte lungi, peste 30 cent., care până pe la mejloc sunt foliate dând și oarecare mici ramuri rudimentare axilare; ca și foile, în această parte ramurile sunt glabre, doar cu prea mici peri puberuli foarte dispersi ce devin mai denși și glandulari pe partea de inflorescență superioară, scutind pedunculii și investind mult caliciul. Pedunculii solitari, foarte lungi, subțiri, întrec de 4 ori bracteele respective. Florile proaspete au corola la exterior de un roșiu-purpuriu palid, la interior galben-roșietică, tubul galben și purpuriu punctat; filamentele cu lână oacheș-purpurie.

### SCROPHULARIACEÆ Lindl.

*Linaria hybrida* Schur enum. transs. p. 491 (Consp. p. 431).—Livezi, tuferișe. Pe la pădurea Năsipeni distr. Brăila (pl. indig. 1900); Agiud.

*L. dalmatica* Mill. dict. n° 13 (Consp. p. 431).—Livezi, crânguri Cotorca, Dudesca în Ialomița; Cernavoda.

β. *transsilvanica* Schur enum. transs. p. 490 (Consp. p. 432).—Tuferișe pe coastele petroase montane. Vêrciorova în valea Bahnei, frecuentă; pe Lotru la Voineasa în valea Voinășiței.

*L. Elatine* Mill. dict. n°. 16 (Consp. p. 432).—Locuri fertile, arături, porumbiști. Lunca Prahovei la Tinoasa; pe la pădurea Dașcălu-Creața în Ilfov plasa Mostiște; Techirghiol-Movilă.

*Scrophularia alata* Gilib. fl. lithuan. p. 127 (Consp. p. 433).—Locuri joase ude sau băltoase. Bușteni (pl. indig. 1901); Slănic.

*S. Scopolii* Hoppe ap. Pers. syn. vol. 2 p. 160 (Consp. p. 433).—Locuri umede, garduri rustice, păduri. Curtea-de-Argeș frecuentă; Slănic.

β. *subalpina* Grec. consp. p. 433.—Sinon. *S. glandulosa b) alpina* Schur enum. transs. p. 485 (1866).—Predeal în valea Roșnovei (pl. indig. 1900); Buceci în valea Jepilor (Knecht. leg.)

*Veronica scutellata* L. spe. p. 16 (Consp. p. 435).—Pădurea Tinoasa pe Prahova.

*V. Anagallis* L. spe. p. 16 (Consp. p. 435). Locuri umede, mlăș-

tini băltoase. Predeal; lunca Prahovei pădurea Tinoasa; Cotorca în Ialomița; Slănic.

β. *tenella* Rchb. (Consp. l. c.). Lunca Prahovei pădurea Tinoasa.

γ. *anagalloides* Rchb. (Consp. l. c.).—Adiție: sinonimu *V. Anagallis* γ. *glandulosa* Lindem. fl. cherson. 2<sup>o</sup> p. 51 (1882).—Locuri mlăștinoase, în lunca Jiului la Craiova (pl. indig. 1900); Cotorca în Ialomița.

δ. *aquatica* Bernh. (Consp. l. c.).—Stuhăriile Colentinei la Fundeni.

A se modifica nomenclatura de *V. urticifolia* (Consp. p. 346) astfel:

4. *V. latifolia* L. spe. ed. 1753 p. 13; Scop. fl. carniol. ed. 2<sup>o</sup> p. 13 (1772); Lam. fl. fr. vol. 2 p. 441; A. Kern. œst. bot. zeit. 1873 p. 367. *V. urticifolia* Jacq. fl. austr. vol. 1 p. 37 tab. 59 (1773); L. fil. suppl. p. 83 (1781); Sturm deutsch. fl. fasc. 58; Koch syn. p. 603; Benth. in DC. prodr. vol. 10 p. 474; Boiss. fl. orient. vol. 4 p. 448 etc. Tuferișe. Pe lângă localitățile enumerate în Conspect, adiție: pe Argeș în valea Caprei și în Cheee-Argeșului; Voineasa; Buceci (pl. indig. 1901); Piatra-Neamțu pe Cernegura (pl. indig. 1900).

*V. montana* L. spe. p. 17 (Consp. p. 436).—Păduri montane subalpine. Negoiu; Slănic pe muntele Dobrului; Ceahlău (pl. indig. 1899).

*V. officinalis* L. spe. p. 14 (Consp. p. 436).—Tuferișe, stânci montane. Pe Mirul-Mare în Parâng; pe Argeș la Cumpăna și în Cheea-Argeșului; Slănic; Piatra-Neamțu pe Pietricica; Ceahlău.

*V. aphylla* L. spe. p. 14 (Consp. p. 437).—Stânci în regiunea alpină. Negoiu; Buceci pe Caraimanu și la Omu (pl. indig. 1901); Ceahlău la Polița-lui-Ghidion.

*V. Baumgartenii* Roem. et Sch. syst. veg. vol. 1 p. 100 (Consp. p. 437).—Stânci în regiunea alpină. Negoiu și Suru în Argeș (pl. indig. 1899).

*V. austriaca* L. spe. p. 17. *V. dentata* Schmidt fl. bohem. vol. 1 p. 20 (Consp. p. 437).—Șesuri de loess năsipos, năsip chiar. Ivești (Tecuci).

*V. multifida* L. spe. p. 17 (Consp. p. 437).—Câmpuri. Dobrogea β. *Jacquinii* Grec. consp. p. 437. *V. Jacquinii* Baumg. enum. transs. vol. 1 p. 26 (1816).—Livezi, locuri ierboase. Brănești; Comana.

γ. *bihariensis* Grec. consp. p. 438. *V. Bihariensis* A. Kern. œst bot. zeit. 1873 p. 371.—Livezi. Turbureni distr. Botoșani (pl. indig. 1900).

*V. Chamædryas* L. spe. p. 17 (Consp. p. 436).—Livezi, crânguri. Segarcea în Dolj; Dealu-Mare la Valea Călugărească; Adjud, Slănic.

Adiție subț această:

\* β. *macrocalyx*.—Livezi, crânguri subalpine. În Argeș pe Clăbucetu la origina Cumpăniței.

Caliciul și lăciniile sale cu mult mai mari de cât la forma genuină, cam îndoit în dimensiunile lor și depășesc cu mult capsula respectivă.

*V. Teucrium* L. spe. p. 16 (Consp. p. 438).—Livezi. Curtea-de-Argeș la Valea-Calului; Dealu-Mare; Slănic pe muntele Pufu.

**V. Pseudochamaedrys** Jacq. fl. austriaca vol. 1 p. 38 tab. 60 (1773) et auct. recent.—*V. latifolia* Jacq. observ. bot. vol. 1 p. 41 (1764); Sturm deutsch. fl. fasc. 58; Koch syn. p. 605 exclus. var.  $\beta$ .; Boiss. fl. orient. vol. 4 p. 449; Grec. consp. p. 438-non L. *V. latifolia* var. *major* Schrad. fl. germ. vol. 1 p. 35. *V. Teucrium* A. Kern. sched. ad fl. exsic. austrohung. n<sup>o</sup> 922-non L.—Pe lângă localitățile enumerate în Conspect p. 438, adîție: Curtea-de-Argeș, Corbeni; Dealu-Mare.

**V. Bachofenii** Heuff. in Flora ann. 1835 vol. 1 p. 253 (Consp. p. 438).—Stânci, crăpături de stânci abrupte în Cheea-Argeșului pe Arefu și în sus pe la Tunel; valea Jiului la Păiuș, Lainici.

Aceasta, cum și *Verbassum glabratum* Friv.—specii proprii ale Banatului oriental și ale Olteniei montane, la noi observate până în valea Oltului — sunt de însemnat prin prezența lor și în valea Argeșului cu privire la geografia noastră botanică.

**V. longifolia** L. spe. p. 13: —  $\beta$ . *transsilvanica* Schur en. transs. p. 498 (Consp. p. 439). — Pe la pădurea Măgura distr. Bacău; Botoșani (pl. indig. 1900).

**V. spuria** L. spe. p. 13 (Consp. p. 439). — Crânguri, margini de pădure, la Dudeasca distr. Ialomița.

**V. spicata** L. spe. p. 14 (Consp. p. 439).—Câmpuri, la locuri ierboase. Bârlad la Crângu (pl. indig. 1901) și Roșiești distr. Tutova; Hagieni distr. Ialomița; Cernavoda.

**V. orchidea** Crantz stirp. austr. vol. 4 p. 384 (Consp. p. 439). — Livezi, tuferișe. Govora; Curtea-de-Argeș, Albești; Brănești; Căldărușani; Constanța, Murfatlar; Techirghiol-Movilă pe malul mării.

**V. bellidoides** L. spe. p. 15 (Consp. p. 440). — Regiunea alpină, în Parângu pe Mirul-Mare; pe Negoiu; Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901).

**V. alpina** L. spe. p. 14 (Consp. p. 440).—Piscuri alpine. În Parângu suișul pe Piatra-Tăiată; Negoiu pe Lespezi; Buceci la Omu (pl. indig. 1901).

**V. serpyllifolia** L. spe. p. 15 (Consp. p. 440). — Locuri umede, mlăștini, isvoare. Curtea-de-Argeș, Flămânzeni; Tinoasa.

$\beta$ . *neglecta* Grec. consp. p. 440.—Asemenea locuri. Cheea-Argeșului.  $\gamma$ . *major* Baumg. (Consp. p. 440).—La Negoiu pe Lespezi; în Parâng pe Gruiu și Mândra la poale.

**V. triphyllos** L. spe. p. 19 (Consp. p. 441).—Constanța pe la vii.

**V. praecox** All. auctuar. pedem. tab. 1 fig. 1 (Consp. 441).—Locuri ierboase, teren cam năsipos, pe la pădurea Andronache la Ștefănești (Ilfov): *forma pusilla simplex*.

**V. hederifolia** L. spe. p. 19 (Consp. p. 422).—Constanța pe la vii.

**Limosella aquatica** L. spe p. 881 (Consp. p. 442).—Adîție: vulgar *Chenaru-bălței*. Măcin marginea lacului Jijila.

**Tozzia alpina** L. spe. p. 844 (Consp. p. 442).—Locuri mlăștinoase pe lângă izvoare și pășuni. La Negoiu (pl. indig. 1899) și pe muntele Paltina în Argeș.

**Melampyrum cristatum** L. spe. p. 842 (Consp. p. 442).—Adiție : vulgar *Codroi. Dințariță. Grăpadă. Scrabă*.—Livezi, tuferișe pe lângă păduri. Dealu-Mare; Slănic; Petricani în Neamțu

**M. arvense** L. spe. p. 842 (Consp. p. 443).—Aceleași numiri vulgare cum și celor următoare.—Livezi, poeni. Valea Călugărească ; Grozăvești, Focșani, Panciu; Iași.

**M. nemorosum** L. spe. p. 621 (Consp. p. 443). — Păduri. Curtea-de-Argeș pe dealurile Rugetului; Govora la măgura Mătușea-Floarea; pădurea Cotmeana în Argeș; pădurea Andronache în Ilfov; Dealu-Mare; Adjud (pl. indig. 1901); Slănic; Ceahlău și muntele Domesnic în Neamțu; Iași la pădurea Ciurea.

Dupe acesta adiție :

\* 3<sup>b</sup>. **M. commutatum** Tausch ap. Ott catal. fl. bohem. ann. 1851 p. 37; A. Kern. œst. bot. zeit. ann. 1870 p. 271 et 272 ; Porciu diagn. pl. vascul. transs. p. 219. — Regiunea montană subalpină, pe stânci cu tuferișe. În Argeș pe muntele Paltina, în Cheea-Argeșului și pe înălțimile Arefului.

Aduce mult cu *M. pratense* L. care la noi și în Transilvania lipsește și cu care a fost odinioară confundat de botaniștii florei transilvane. Dar planta noastră, pe lângă alte mici caractere, de la prima vedere diferă prin bracteele superioare albastre — iar nu verzi; prin caliciul verde concolor cu lăciniile foarte lungi, subulate, nu cu pete negricioase și lăciniile scurte triangulare etc. Nu mai puțin, pare a fi și intermediar între *M. nemorosum* și *M. silvaticum* prin unele caractere.

**M. silvaticum** L. spe. p. 483 (Consp. p. 443). — Păduri și stânci montane în regiunea subalpină quasi alpină. Pe Lotru la Voineasa, Vidra pe Pravățu; Negoiu pe Lespezi și Paltina; Slănic pe muntele Șandru.

**β. saxosum** Garcke in Schlechtd. Langeth. deutsch. fl. vol. 17 p. 283 (Consp. p. 443). — Păduri conifere subalpine. Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901).

Speciile din genul **Pedicularis** § 2 (Consp. p. 444) să se coordoneze cu îndreptările și adițiile de introdus precum urmează:

a. **Nerostrate**: labra superioară a corolei obtusă, neavând rostru, nici dinți.

2. **P. verticillata** L. spe. p. 846 (Consp. p. 444). — Regiunea alpină. Negoiu pe munții Lespezi și Paltina; Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901); Parângu pe Mirul-Mare; culmea Surului (pl. indig. 1899); Ceahlău (pl. indig. 1900. — Subacaulă, florile roze.

3. *P. versicolor* Wahlenb. veget. et clim. helvet. septentr. p. 118 (Consp. p. 444).—Regiunea alpină. Ceahlău (pl. vasc. ceahl. p. 64); Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901). Subacaulă, florile galbene.

Numirea de *P. exaltata* Bess. se va modifica astfel:

4. *P. sumana* Spreng. pl. nov. fasc. 2 p. 70 n° 134 (1815); Steining. beschreib. europ. arten das gattung *Pedicularis* in bot. centralbl. vol. 29 ann. 1887 p. 377; Sag. et Schn. carp. centr. vol. 2 p. 417; A. Kern. sched. ad fl. exsic. austro-hung. fasc. 6 n° 2117. *P. Hacquetii* Graf in Flora ann. 1834, I p. 40 à 42; Rchb. icon. fl. germ. vol. 20 tab. 154. *P. exaltata* Auct. hung. transs., Grec. consp. p. 444 și pl. vasc. ceahl. p. 54-vix Bess. *P. exaltata* var. *carpatica* Porciu enum. pl. faner. năseud. p. 74 et exsic. !; ejus. diagn. pl. vascul. transs. p. 222.— 4 Iulie-August. După localitățile enumerate în Conspect, adiție: Buceci pe Caraimanu (*P. exaltata* var. *carpatica* Grec. pl. indig. 1901); Rarău; Ceahlău pe Chica-Baiului (*P. exaltata* Grec. pl. indig. 1900) și pe Izvorul-Alb multă (Grinț. exsic. anu 1906).—Caulescentă, florile galbene.

b. Rostrate, nedentifere: labra superioară a corolei prelungă în lung rostru (cioc) cu vârful obtus, nedentat.

\* 5. *P. Jaquinii* Koch in Röhl deutsch. fl. edit. 3<sup>o</sup> vol. 4 p. 363 (1833); Koch syn. p. 621; Sturm deutsch. fl. fasc. 20. *P. rostrata* b. *Jaquinii* Rchb. icon. fl. germ. vol. 20 tab. 121.— 4 Iulie-August. Regiunea alpină la locuri mlăștinoase pe lângă izvoare. Culmea Ceahlăului (Grec. pl. vascul. ceahl. p. 65).—Acaulă, florile roze.

\* 6. *P. Baumgartenii* Simk. termes. füz. X. 1886 p. 82; ejus enum. pl. transs. p. 431; Grec. pl. vascul. ceahl. p. 64. *P. tuberosa* Baumg. mant. p. 61 (1846) et auct. transs. ex parte-non L.—Vulgar *Darie*, ca și cele lalte.— 4 Iulie-August. Livezi, la poalele Ceahlăului (Grec. pl. vascul. ceahl. p. 65).—Caulescentă, florile galbene.

c. Rostrate, dentifere: labra superioară a corolei prelungită în lung rostru (cioc) cu vârful dentat, în care urmează speciile:

7. *P. campestris* Griseb. et Sch. iter. hung. n° 162 (Consp. p. 445).—Parângu.

8. *P. palustris* L. spe. p. 845 (Consp. p. 445).—Predeal valea Roș-novei (pl. indig. 1900).

*Rhinanthus alpinus* Baumg. enum. transs. vol. 2 p. 160 (Consp. p. 445).—Adiție: vulgar *Cione* și cele următoare.—Regiunea alpină. In Parângu pe Mirul-Mare; Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901); Ceahlău la Șea.

*Rh. minor* Ehrh. beitr. vol. 6 p. 144 (Consp. p. 445):

α *simplex* Grec. consp. p. 446.—Livezi. Dealu-Mare; Grozăvești în Putna; Slănic.

*γ. angustifolius* Koch syn. p. 626.—Livezi montane. Buceci la Urătore (pl. indig. 1901); Slănic.

**Rh. major** Ehrh. beitr. vol. 6 p. 144 (Consp. p. 446). — Livezi. Poalele Negoiiului la stâna Podeanului (parvulum subglaber); Râmnic (pl. indig. 1901); Dealu-Mare la Valea Călugărească; pădurea Cotmeana (Argeș); Grozăvești în Putna; Slănic; Bicăz (pl. vasc. ceahl. p. 95).

*β. hirsutus* F. Schullz arch. de flore ann. 1842 p. 32 (Consp. p. 446). — Livezi. Govora: Grozăvești în Putna.

Adiție dupe acesta (Consp. p. 446):

\* **4. Rh. montanus** Saut. nachträge zur phanerogamen flora von Tirol und Salzburg in «Flora» tom. XL ann. 1857 p. 180. *Alectorolophus montanus* Fritsch verh. d. zool. botan. gesellsch. wien, 1898 p. 322: «Was ist *Rhinanthus montanus* Saut.» — Livezi, locuri deschise. Pe Lotru sus la Voineasa și Vidra.

**Euphrasia Rostkoviana** Heyne arzneigew. vol. 9 tab. 7 (Consp. p. 446). — Livezi montane. Buceci la Poeana-Țapului; poalele Ceahlăului la Bicăz (pl. indig. 1899 și 1900); Voineasa în Vâlcea.

\* *β. montana*. — **E. montana** Jord. pugill. pl. nov. p. 132 (1852); Boreau fl. centr. de la france vol. 2 p. 493; Wettst. monogr. d. gatt. euphr. p. 194. *E. officinalis γ. montana* Fries. ap. Rchb. icon. fl. germ. vol. 20 tab. 111 fig. 1. — Livezi montane. Predeal pe Susaiu și spre Schit; Piatra-Neamțu pe Cernegura (pl. indig. 1900); Slănic.

Caulul simplu, subțire flexuos sau prea puțin ramos; foile distante, vestmântul de peri puberuli și glanduliferi prea puțin, a locuri lipsă.

**E. stricta** Host fl. austr. vol. 2 p. 185 (Consp. p. 447). — Stânci, locuri pietroase în regiunea montană. În Parângu poalele Mirului; pe Negoii (pl. indig. 1900) și pe Lespezi, pe Argeș la Cumpăna pe valea Caprei, pe Buda, în Cheea-Argeșului și sus pe Arefu; Slănic.

*b. pubibunda* Simk. enum. transs. p. 432. — Slănic pe Șandru.

**E. minima** Jacq. ap. Schleich. catal. p. 22 (Consp. p. 447). — În regiunea alpină, locuri pietroase. Buceci la Schitu-Ialomitei (pl. indig. 1901); Ceahlău (pl. vasc. ceahl. p. 66); gura Pravățului pe Lotru sus la Vidra.

**E. salisburgensis** Funck nachricht. salzb. in Hoppe taschenb. p. 184 et 190 (Consp. p. 447). — Regiunea alpină. Pe Parângu; pe Prislopu (pl. indig. 1899), Negoii și Lespezi în Argeș; Rarău; Ceahlău (pl. vasc. p. 66).

\* *β. minuta* Gremli neue beitr. vol. 4 p. 25 (1877). *E. salisburgensis var. parvula* Wettst. neue gattung euphr. p. 228 (1896). — Buceci pe culmea Caraimanului (pl. indig. 1901).

**Odontites verna** Rchb. fl. germ. excurs. vol. 2 p. 359 (Consp. p. 447). — Livezi tuferișe. Căinenii din Argeș (pl. indig. 1890); Techirghiol-Movilă pe malurile mării.

**O. serotina** Rchb. fl. germ. excurs. vol. 2 p. 359 (Consp. p. 447).—Livezi, tuferișe, locuri pietroase și humifere. Pe muntele Arefu în Argeș; București, Fundeni; coastele Ialomiței pe la Urziceni, Coșereni, Speteni; Techirghiol-Movilă pe malurile mării.

**O. lutea** Rchb. l. c. (Consp. p. 448).—În regiunea șesurilor. Pe malurile Ialomiței pe la Dridu, Speteni; în Dobrogea pe la Murfatlar, Babadag, Niculițel, Telița.

**Bartsia alpina** L. spe. p. 389 (Consp. p. 448).—Regiunea alpină. Parângu pe Mirul-Mare; Negoiu și pe Paltina; Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901); Ceahlău.

### ACANTHACEÆ R. Br.

**Acanthus longifolius** Host fl. austr. vol. 2 p. 217 (Consp. p. 448).—Crânguri, tuferișe. Vârciorova (pl. indig. 1900); Segarcea spre dealu viilor. în Dolji.

### OROBANCHACEÆ Lindl.

A se pune ca numire capitală, în loc de *Orobanche cruenta* Bartl. în Consp. p. 448, cea următoare:

1. **O. gracilis** Smith. in transact. of. linn. soc. tom 4 p. 172 (1797); Halácsy consp. fl. græc. vol. 2 p. 450 et auct. ex. p. *O. cruenta* Bartl. rar. pl. ital. decad. 3 p. 56 (1810) cu menținerea citatelor din Koch, Reuter în DC. prodr., Reichenbach, Schlechtendal și Langethal, Boissier (Consp. p. 448).—4 Iunie. Iulie. Parazitic pe Ononis, în câmpii la Brăila; pe Trifoi la Crainici în Mehedinț (pl. indig. 1900); Slănic pe muntele Șandru.

**O. caryophyllacea** Smith trans. of. linn. soc. tom 4 p. 169 (Consp. p. 449).—Pe lângă păduri, rărișuri, livezi. Parazitic pe Galium Schultesii. Bicăz pe muntele Crasna (pl. indig. 1900).

**O. Epithymum** DC. fl. fr. vol. 3 p. 490 (Consp. p. 449).—Parazitic pe rădăcini de Thymus. Pe muntele Arefu în Argeș; Pitești pe dealurile de la Valea-Mare; Bușteni în valea Cerbului (pl. indig. 1901).

După Halácsy, consp. fl. græc. vol. 2 p. 451, această specie este identică cu *O. alba* Steph. in Willd. spe. pl. vol. 3 p. 350 (1800) și care are dreptul de prioritate ca numire capitală; însă mare parte de autori le considerează ca deosebite.

Numirea de *O. rubens* Wallr (Consp. p. 449) să se corecteze astfel:

5. **O. lutea** Baumg. enum. transs. vol. 2 p. 215 (1816); Simk. enum. transs. p. 434. *O. rubens* Wallr. sched. vol. 1 p. 307 (1822); Koch syn. p. 615; DC. prodr. vol. 11 p. 25; Rchb. icon. fl. germ. vol. 20 tab. 171;

Boiss. fl. orient. vol. 4 p. 511; Schlechtd. Langeth. deutsch. flora vol. 18 fig. 1750. *O. Medicaginis* Duby botan. gall. vol. 1 p. 349 (1828). — 4 Iunie-Iulie. Parazitic pe rădăcini de Luzernă. Livezi la Bușteni spre valea Jepilor (pl. indig. 1901); Ceahlău (*O. rubens* Grec. pl. indig. 1900).

**O. flava** Mart. ap. F. W. Schultz deutsch. orobanch. p. 9 fig. 5 (Consp. p. 450). — 4 Iunie. Iulie. Adiție: parazitic pe rădăcini pe Tussilago și de Petasites. Predeal în valea Roșnovei; Bușteni în valea Jepilor (pl. indig. 1901).

Adiție dupe aceasta (Consp. p. 450):

\* 7<sup>b</sup>. **O. Teuerli** F. W. Schultz in Flora ann. 1835 p. 200 c. icone; Koch syn. p. 615; Rchb. icon. fl. germ. vol. 20 tab. 169; DC. prodr. vol. 11 p. 21; Boiss. fl. orient. vol. 4 p. 508; Schlechtd. Langeth. deutsch. fl. vol. 18 fig. 1751. — 4 Iulie. August. Parazitic pe rădăcini de Thymus. — Buceci la Poeană-Costilei (pl. indig. 1901).

**O. lucorum** Al. Braun. ap. Schultz in annal. d. gewk. d. regensb. bot. gesel. vol. 5 p. 504 (Consp. p. 450). Pe rădăcini de Rubus cæsius, pe la Cegani distr. Ialomița; Piatra-Neamțu.

**O. loricata** Rchb. iconogr. bōtan. vol. 7 p. 41 fig. 917 (Consp. p. 450). — Pe rădăcini de Artemisia campestris la Călimănești (pl. indig. 1901)

**O. Cumana** Wallr. orobanch. p. 58 (Consp. p. 450). — Pe rădăcini de Artemisii, la Cegani distr. Ialomița; Techirghiol-Movilă, frecuent.

**Phellpæa purpurea** Grec. consp. p. 451. *Ph. cærulea* C. A. Mey. enum. pl. cauc. p. 104 (1831); DC. prodr. vol. 11 p. 5; Rchb. icon. fl. germ. vol. 20 tab. 149; Schlechtd. Langeth. deutsch. fl. vol. 18 fig. 1764. *Orobanche purpurea* Jacq. fl. austr. vol. 1 p. 108 (1773). *O. cærulea* Vill. pl. dauph. vol. 2 p. 406 (1789). — Pe rădăcini de Achillei, pe la comuna Lătin distr. Brăila.

**Ph. ramosa** C. A. Mey. enum. pl. cauc. p. 104 (Consp. p. 451). — Pe rădăcini de Porumb, la Petricani distr. Neamțu (pl. indig. 1900); în culturile de Tutun, la comuna Maea distr. Ilfov și pe la Brăila; Bivolari distr. Iași.

**Lathræa squamaria** L. spe. p. 848 (Consp. p. 451). — Păduri umbroase în Ceahlău pe Isvoru-Alb (pl. vasc. ceahl. p. 66).

### UTRICULARIACEÆ Endl.

**Pinguicula alpina** L. spe. p. 25 (Consp. p. 451). — Regiunea alpină. Buceci la Omu și pe Caraimanu (pl. indig. 1899 și 1901); Ceahlău la Boambe (pl. indig. 1900).

**P. vulgaris** L. spe. p. 25 (Consp. p. 451). — Regiunea alpină. Pe muntele Suru (pl. indig. 1899), Negoiu, Lespezi și Paltina în Argeș; Buceci pe Caraimanu (pl. indig. an. 1901).



*Utricularia vulgaris* L. spe. p. 21 (Consp. p. 452). — Plantă imersă. In ape limpezi necurgătoare, heleșteuri. Craiova în lacurile de la Serca; Măcin în lacurile dunărene.

### LABIATÆ Juss.

*Mentha silvestris* L. spe. p. 804 (Consp. p. 452):

α. *candicans* Grec. consp. p. 452. — Câmpuri, drumuri, locuri inculte. Govora; Curtea-de-Argeș; Slănic.

β. *vulgaris* Benth. (Consp. p. 453). — Vârciorova; Curtea-de-Argeș.

γ. *nemorosa* Benth. (Consp. l. c.) — Curtea-de-Argeș; Bușteni (pl. indig. 1901); Onești pe cursul Taslăului; Slănic pe la Cascadă; în Dobrogea pe la Isaccea, Acictepe, Ortachioi.

δ. *crispa* Benth. (Consp. l. c.). — Locuri aprice pe lângă căi la Agiud.

*M. viridis* L. spe. p. 804. (Consp. p. 453): — *crispata*. Vulgar Ismăcreață.

*M. aquatica* L. spe. p. 804 (Consp. 453): — α. *genuina* Gren. Godr. fl. fr. 2 p. 651. — Pădurea Ghighiu lângă Ploești (pl. indig. 1899); lunca Prahovei la pădurea Tinoasa; Cotorca în Ialomița; Bălănești distr. Roman (pl. Indig. an. 1899). — β. *hirsuta* Koch. — Locuri joase, umede. București, Fundeni-Mărcuța; Isaccea, Jijila, Ghecet distr. Tulcea.

*M. sativa* L. spe. p. 805 (Consp. p. 455). — Botoșani; Fălciu. —

*M. arvensis* L. spe. p. 806 (Consp. p. 455). — Brănești la pădurea Pustnicu; Măcin (pl. indig. 1899).

*Lycopus europæus* L. spe. p. 30 (Consp. p. 455). — Adiție: vulgar *Picioru-lupului*. Govora; Curtea-de-Argeș.

*Salvia officinalis* L. spe. p. 34 (Consp. p. 456). — Adiție: vulgar *Joae*.

*S. Æthiopis* L. spe. p. 39 (Consp. p. 457). — Agiud; Techirghiol.

*S. austriaca* Jacq. fl. austr. vol. 2 tab. 112 (Consp. p. 457). — Iași pe la pădurea Bârnova; Constanța spre Horoslar, Murfatlar.

*S. pratensis* L. spe. p. 35 (Consp. p. 457):

γ. *dumetorum* Grec. consp. p. 457. *Salvia dumetorum* Andr. ap. Bess. enum. pl. volh. podol. bess. p. 3 et 40. — Pădurea Comana (pl. indig. 1900).

δ. *Andrzejowski* Grec. consp. p. 457 sec. Blocki exsicc. ! Predeal pe Clăbucetu-Taurului; lunca Prahovei la pădurea Tinoasa.

*S. silvestris* L. spe. p. 34 (Consp. p. 458). Câmpuri, locuri inculte, drumuri. Govora; Curtea-de-Argeș; Brănești; Măcin, Greci; Techirghiol.

β. *nemorosa* Grec. consp. p. 458. *S. nemorosa* L. spe. p. 35. — Zimnicea; Techirghiol malurile mării.

\* γ. *albiflora*. — Câmpuri, livezi. Chitila, Bufta pl. indig. 1901).

**S. betonicaefolia** Etting. comment. salv. n° 49 (Consp. p. 458). — Crânguri, mărăcinişuri. Constanţa în Valul-Traian (pl. indig. 1900).

**Ş. nutans** L. spe. p. 39 (Consp. p. 458). — Mărăcinişuri. Constanţa pe la Hassancea, Murfatlar.

La Trib. III. *Ocimodæ* să se zică: Corola ușior bilabiată etc.

**Ocimum Basilicum** L. spe. p. 833 (Consp. p. 458). — Adiție: vulgar *Bucioc* (Transs.).

La trib. IV. *Thymæ* să se zică: Corola ușior bilabiată etc.

Speciile genului **Origanum** (Consp. 459) se vor modifica în nomenclatura lor precum urmează:

**1. Origanum vulgare** L. spe. p. 842; Koch syn. p. 639; Benth. in DC. prodr. vol. 12 p. 193; Rchb. icon. fl. germ. vol. 18 tab. 6 fig. I; Ledeb. fl. ross. vol. 3 p. 343; Boiss. fl. orient. vol. 4 p. 551. 4 Iulie. August. Vulgar *Boască. Dost. Milot. Solovârf. Şovârf*. — Livezi, tufe-rişe, în părți montane și câmpene. — Vârciorova; Techirghiol-Movilă pe malurile mării: *forma genuina, eglandulosa* (pe la noi cam rară).

β. *virens* Benth. in DC. l. c. var. δ.; Ledeb. l. c.; Schur enum. tr. p. 524. *O. vulgare* α. *albiflorum* Schur l. c. (1866). Cheea-Argeşului.

Florile sale laxgloboso-spicate snt de un purpuriu palid albicios, bracteele și caliciul de un verde deschis pubescente neglandulare.

γ. *glandulare*. — **O. Barcense** Simk. enum. transs. p. 441; Grec. consp. p. 459. — Livezi, crânguri, Curtea-de-Argeş în Valea Calului; Constanţa.

Florile sale tot cum la forma genuină și în spicuri lungicele cilindrice, însă bracteele și caliciul de culoare purpurie închisă sunt presărate cu mici punctulețe glandulare aurii. Este forma cea mai comună în România.

δ. *megastachyum* Koch syn. p. 639. **O. megastachyum** Link enum. hort. berol. vol. 2 p. 114 (1822). *O. vulgare* β. *prismaticum* Gaud. fl. helv. vol. 4 p. 78 (1829); Rchb. icon. fl. germ. vol. 18 tab. 61 fig. II. — *O. macrostachyum* Link handb. p. 468 (1829). *O. Barcense* β. *macrostachyum* Grec. consp. p. 459. — Tuferișe, livezi la locuri aprice. Cernavoda; Babadag, Niculițel, Telița.

**2. O. Majorana** L. spe. p. 824. — Vulg. *Magheran, Majuranulă*. Plantă horticolă, destul de populară.

**Thymus Chamædrys** Fries novit. fl. suec. ed. 2° p. 197 (Consp. p. 459). — Pe locuri pietroase cu iarbă, livezi. Valea Jiului pe la Păiuș, Lainici; Voineasa pe valea Jidoaei; Negoii și Clăbucetu; Agapia.

β. *albiflorus*. — Predeal pe Clăbucetu-Taurului, a rar.

**Th. alpestris** Tausch pl. select. bohém. et herb. fl. bohém. n° 1139 et 1140; Freyn in A. Kern. sched. ad fl. austro-hung. n° 189 (Consp. p. 460). — Regiunea alpină și subalpină pe locuri pietroase. — Parângu pe Mirul-Mare; Negoii; Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 190p); Slănic.

**Th. pulcherrimus** Schur bot. runder. ann. 1854 p. 74 (Consp. p. 460).—  
Adiție : sinonim *Th. montanus* γ. *Chamaledon* Heuff. enum. pl. banat.  
p. 140. Regiunea alpină. Negoiu și Lespezile; Predeal.

Adiție dupe acesta (Consp. p. 460):

\* **3<sup>b</sup>. Th. Borbasii** H. Braun ap. Borbás «symbolæ ad thymos europ.  
mediæ præcipue hung. cognoscendos» in közlem. 1890 p. 104 ; Porciu  
diagn. pl. vascul. transs. p. 230.—X *Th. pulcherrimus-lanuginosus* H.  
Braun in litt. 1886.— 4 Iulie. August. Regiunea alpină. Negoiu pe mun-  
tele Paltina.

Ramurile florifere tetragone, numai pe anguli bifar-pubescente, ad-  
scendente, subțiri, lungărețe, perii de pe anguli denși, mai lungi ca dia-  
metrul ramurilor; foile obovatspatulate, ovatlanceolate sau obovate, cu lungi  
peri albicioși pe margini și pe fațe, marginea fără nervură caloasă circon-  
ferentă anastomosantă; caliciul păros, tubul său egalând pedunculul res-  
pectiv.

**Th. montanus** W. et Kit. pl. rar. hung. vol. 1 tab. 71 (Cons. p. 460).—  
Livezi. Curtea-de-Argeș pe Sânicora; Slănic; Agapia.

**Th. marginatus** A. Kern. æst. bot. zeit. ann. 1874 p. 184 (Consp.  
p. 460).—A se consulta și Porciu diagn. pl. vasc. transs. p. 232.—Stânci,  
locuri pietroase în regiunea alpină. Negoiu, Lespezi; Buceci pe Caraimanu  
(pl. indig. 1901); Ceahlău (pl. vasc. ceahl. p. 67).

Folle au nervură caloasă marginală circonferentă și anastomozată;  
caulii numai pe muchii pubescenti.

**Th. comosus** Heuff. ap. Griseb. et Sch. itér hung. n<sup>o</sup> 178 (1852);  
Heuff. enum. pl. banat. p. 140 ; Rchb. icon. fl. germ. vol. 18 tab. 68 ;  
Neilr. diagn. p. 99. *Th. transsilvanicus* Schur ap. Fuss. verh. siebenb. ver.  
ann. 1851 p. 147 solum nomen; Schur verh. siebenb. ver. ann. 1859 des-  
criptum; ej. enum. transs. p. 528. *Th. nummularius* Simk. enum. transs.  
p. 443 (1886), Grec. consp. p. 461-non M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 2 p. 58  
(1808).—Stânci montane. Sinaia; pe Lotru la Voineasa, Vidra.

Foile au nervură caloasă marginală circonferentă ; caulii pe toată  
suprafața pubescenti.

β. *hirsutior* Grec. consp. p. 461.—*Th. lanuginosus* var. *hirsutior*  
Rochel pl. pannon. ap. M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 3 p. 403 (1819) sub  
*Th. nummularium*-sed non *Th. lanuginosus* Link.—*Th. humifusus* β. *ma-  
crophyllus* Rchb. fl. germ. excurs. p. 312 (1831). *Th. Serpyllum vul-  
garis nummularius* Rchb. icon. fl. germ. vol. 18 tab. 63 fig. 2. *Th. Ro-  
chelianus* Celak. in Flora ann. 1882 p. 563. *Th. comosus* Schur. enum.  
transs. p. 529 (1866)-non Heuff.—Predeal, livezile de la Schit.

**Th. Marschallianus** Willd. spe. pl. vol. 3 p. 141 (Consp. p. 461).—  
Livezi. Severin, Vârciorova (pl. indig. 1899); București, Pantelimon; Fe-

tești, Hagieni, Țândărei; Iași la Copou (pl. indig. 1901); Bârlad la Crângu (*Th. collinus* Grec. pl. indig. 1901).

**Th. Serpyllum** Fries novit. ed. 3<sup>o</sup> p. 195 (Consp. p. 461).—Brăila. Adiție, dupe acesta (Consp. p. 462):

\* 8<sup>b</sup>. **Th. austriacus** Bernh. ap. Rchb. fl. germ. excurs. p. 312 (1831). Simk. enum. transs. p. 442 quoad synonymon. *Th. lanuginosus* Baumg. enum. transs. vol. 2 p. 181 (1816); Porciu diagn. pl. vasc. transs. p. 227-non Mill. dict. n<sup>o</sup> 8 (1785), nec Schkuhr bot. handb. vol. 2 p. 164 (1808). *Th. pannonicus* var. *elegans* Kotschy zool. bot. gesell. 1853 p. 65—sed à *Th. pannonico* All. vix diversus.—4 Iunie-August. Livezi, tuferișe. Dealurile Cernețului (pl. indig. 1899); Vidra în Putna (pl. indig. 1901); Constanța (pl. indig. 1900).

**Th. Jaukæ** Celak. in Flora ann. 1883 p. 147 (Consp. p. 462).—Livezi în părțile montane. Soveja în Putna; Măcin (pl. indig. 1899).

**Th. zygioides** Griseb. spicil. fl. rumel. vol. 2 p. 118 (Consp. p. 462). — Locuri pietroase. Măcin pe poalele munților Pricopanului; Greci pe Țuțuiatu; Constanța; locuri năsipioase la Ivești distr. Tecuci.

**Calamintha Nepeta** Link et Hoffmass. pl. portug. p. 141 (Consp. p. 463). — Coaste, dealuri, pe locuri pietroase. Babadag, Slava-rusească; (*C. Nepeta* β. *parviflora* Grec. pl. indig. 1900 p. 36).

**C. officinalis** Moench meth. p. 409 (Grec. consp. p. 464).—Păduri, tuferișe, pe locuri pietroase. Govora; pe dealuri la Jercălăi pe la Urlați; Odobești pe dealul Lupoaea (pl. indig. 1900); Slănic; munții Măcinului, Slava-rusească spre Babadag.

**C. Baumgartenii** Grec. consp. p. 464. *Melissa Baumgartenii* Simk. enum. transs. p. 445 (1886). — Regiunea alpină și subalpină, locuri pietroase. Parângu pe Mândra; Suru (pl. indig. 1899); Negoii și pe Lespezi; Buceci pe Jepii-mari (pl. indig. 1900 și 1901).

**C. Patavina** Host fl. austr. vol. 2 p. 133 (Consp. p. 464). — De astădată iarăși la Vârciorova pe valea Bahnei, frecventă; Măcin la poalele munților (pl. indig. 1899 și 1900).

**C. suaveolens** Boiss. fl. orient. vol. 4 p. 582 (Consp. 465).—Locuri aspre, aprice. Comana pe coastele despre Gurbanu; Cernavoda, Murfatlar.

**Melissa officinalis** L. spe. p. 827 (Consp. p. 465). — Păduri, tuferișe pe locuri pietroase. Vârciorova la gura Cerovățului; Tismana dealul Govineștilor; Curtea-de-Argeș subspontanee; Slănic pe muntele Pufu.

**Nepeta Cataria** L. spe. p. 796 (Consp. p. 466). Drumuri, garduri rustice, locuri virane. Curtea-de-Argeș, Corbeni, Cheea-Argeșului.

**N. nuda** L. spe. p. 797 (Consp. p. 466). Crânguri, margini de păduri. Vârciorova pe valea Bahnei; Curtea-de-Argeș, Cheea-Argeșului.

**Glechoma hederacea** L. spe. p. 807 (Consp. p. 467).—Adiție: vul-

gar *Pristinioară*. Păduri umbroase, dumbrave. Govora; Curtea-de-Argeș, la Cumpăna pe valea Budei; Brănești pădurea Cernica; Dealu-Mare.

**Melitis Melissophyllum** L. spe. p. 832 (Consp. p. 468). — Păduri, dumbrave. — Pădurea Preajba în Romanai (pl. indig. 1900); Curtea-de-Argeș pe dealurile Rugetului; Dealu-Mare.

**Lamium maculatum** L. spe. p. 809 (Consp. p. 468). — Păduri umbroase. Govora; Curtea-de-Argeș pe dealurile Hodiei, Cumpăna; Otopeni în Ilfov; pădurea Crângu la Buzău (pl. indig. 1900); pădurea Crângu la Focșani (pl. indig. 1900); Iași la Copou și Răpedea; pădurea Buhaiu în Dorohoiu (pl. indig. 1901).

**L. album** L. spe. p. 809 (Consp. p. 469). — Pe lângă garduri și locuințe rustice, locuri dosnice. Predeal (pl. indig. 1900).

\* **β. nemorale** Grec. pl. indig. an. 1900 p. 37. — Păduri subalpine. — Predeal pe Susaiu, tărâm humifer afănat (pl. indig. 1900).

Robustă și mult dezvoltată în toate părțile sale; florile de asemenea și de un alb-lactescent.

**Galeobdolon luteum** Huds. fl. angl. p. 258 (Consp. p. 469). — Adiție: vulgar: *Gălbenușă*. — Păduri umbroase, dumbrave. Govora; Curtea-de-Argeș; pădurea Otopeni; Dealu-Mare.

**Galeopsis Ladanum** L. spe. p. 810 (Consp. p. 469). — Adiție: vulgar *Balbisa*. La locuri deschise. Brăila pe la Vădeni lunca Siretului; comuna Herța în Dorohoi.

**G. angustifolia** Ehrh. sec. Hoffm. deutsch. fl. vol. 2 p. 8 (Consp. p. 470). — Locuri pietroase sau aspre, tuferișe. Govora în parcul stabilimentul balnear, a locuri, rar.

**G. Tetrachit** L. spe. p. 810 (Consp. p. 470): — *var. acuminata*. — *G. acuminata* Rchb. fl. germ. excurs. p. 323 (1831); ejus. icon. fl. germ. vol. 18 tab. 30. — Margini de păduri, tuferișe. Predeal în valea Roșnovei; Slănic.

**G. speciosa** Mill. dict. n° 3 (Consp. p. 470). — Păduri umbroase, la locuri umede răcoroase. Govora; la Negoii pe Lespezi și în jos la Cumpăna pe valea Caprei; Curtea-de-Argeș; poalele Caraimanului (pl. indig. 1901); monăstirea Ghighiu și pădurea Tinoasa; Slănic; Bicaz (pl. indig. 1899).

**G. pubescens** Bess. primit. fl. galiz. vol. 2 p. 27 (Consp. p. 470). — Locuri umbroase, garduri și locuințe rustice. Călimănești, Brezoiu; Curtea-de-Argeș.

**Stachys germanica** L. spe. p. 812 (Consp. p. 471). — Adiție: vulgar *Pavăză*. — Tuferișe, locuri deschise. Govora; Curtea-de-Argeș, Albești.

**S. alpina** L. spe. p. 812 (Consp. p. 471). — Margini de păduri, tuferișe în regiunea montană subalpină. Buceci la Urlătoarele (pl. indig. 1901); Comănești pe valea Ciobănașului; Slănic pe munții Șandru; Ceahlău.

**S. silvatica** L. spe. p. 811 (Consp. p. 471). — Păduri, dumbrave. Govora; pe Argeș la Cumpăna; pădurea Otopeni și Pustnicu în Ilfov; Ceahlău pe Chica-Baiului (pl. vasc. ceahl. p. 68).

**S. palustris** L. spe. p. 811 (Consp. p. 471). — Locuri băltoase sau tinoase. Slănic; Brăila, Măcin în bălțile dunărene.

**S. annua** L. spe. p. 813 (Consp. p. 472). — Garduri, pe lângă locuințe rustice, drumuri. Curtea-de-Argeș; Agiud; Techirghiol-Movilă.

**S. patula** Griseb. spicil. fl. rumel. bithyn. vol. 2 p. 142 (1844); Benth. in DC. prodr. vol. 12 p. 489. *S. sideritioides* C. Koch în linnæa 1848 vol. 21 fasc. 6 p. 692; Velen. fl. bulg. p. 455-non Gillies sec. Benth. labiat. p. 740 (1839). *S. recta* β. *sideritioides* Boiss. fl. orient. vol. 4 p. 740. Locuri inculte. Isaccea, Jijila, Măcin.

β. *linearifolia* Grec. consp. p. 472. — 4 Iulie. August. Câmpuri și în plantațiile de salcâmi la Techirghiol-Movilă.

**S. arenariaeformis** Rouy în bull. soc. bot. de france 1890 vol. 12 ser. 2<sup>o</sup> p. 116 (Consp. p. 473). — În stepele Ialomiței la Hagieni; pe la pădurea Andronache în Ilfov plasa Mostiște.

**S. recta** L. mant. p. 82 (Consp. p. 474). — Locuri deschise. Caracăl pe coastele viilor (pl. indig. 1900); între Ivănești și Odobești la Piticheasa (pl. indig. 1900); Constanța pe lângă calea ferată (pl. indig. 1900); Slănic; poalele Parângului în sușul pe Găuri.

**Betonica officinalis** L. spe. p. 810 (Consp. p. 475). — Adiție: vulgar *Cuișoriță*. — Livezi, tuferișe, poeni. Govora; Curtea-de-Argeș; Brănești.

**Sidertis montana** L. spe. p. 802 (Consp. p. 475). — Locuri aprice, tărâm pietros, pietriș. Măcin, Ortachioi, Greci pe dealul Bujor; Constanța (pl. indig. 1900); Techirghiol-Movilă, copios.

**Marrubium peregrinum** β. L. spe. p. 816 (Consp. p. 476). — Locuri pietroase sau aspre. Vârciorova în sus pe Bahna; Constanța (pl. indig. 1900) Techirghiol-Movilă; Greci, Cerna, Carjelari distr. Tulcea.

**M. præcox** Janka œst. bot. zeit. an. 1875 (Consp. p. 476). — Locuri aprice sterile. Comana; stepele Ialomiței pe la Cotorca, Hagieni, Țândărei; Bârlad la Dealu-Mare (pl. indig. 1901); Mircești distr. Vaslui.

**M. vulgare** L. spe. p. 816 (Consp. p. 477). — Vulgar. *Băltătură. Unguraș*. — Locuri inculte, păragini, garduri, locuințe rustice. Pe Bahna la Ilovița; Curtea-de-Argeș; Constanța (pl. indig. 1900); Techirghiol-Movilă.

**Phlomis pungens** Willd. spe. pl. vol. 3 p. 121 (Consp. p. 478). — Locuri aprice inculte. Agiud; Hagieni, Țândărei.

**Ph. tuberosa** L. spe. p. 819 (Consp. p. 478). — Brănești.

**Scutellaria orientalis** var. β L. spe. p. 834; Benth. in DC. prodr. vol. 12 p. 413; Ledeb. fl. ross. vol. 3 p. 395; Boiss. fl. orient. vol. 4 p. 682 (Consp. p. 478). — Locuri pietroase, stânci. Măcin, Greci.

**S. altissima** L. spe. p. 836 (Consp. p. 479). — Păduri, dumbrave. Pe Prahova la Tinoasa; Rediul Stăncenilor la Botoșani (pl. indig. 1900).

**Brunella vulgaris** L. spe. p. 837 exclus. var.  $\beta$  (Consp. p. 479). — Adiție: vulgar *Coroabă*. — Păduri, tuferișe, locuri ierboase. In Argeș pe muntele Lespezi, la Cumpăna în valea Caprei; Corbeni, Curtea-de-Argeș; Slănic; Ceahlău și pe Petru-Vodă.

**B. grandiflora** Moench meth. p. 414 (Consp. p. 480). — Păduri, dumbrave câmpene. Govora; Brănești pădurea Pustnicu și Cernica.

**B. alba** Pall. ap. M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 2 p. 67 (Consp. p. 480). — Livezi, crânguri. Govora; Curtea-de-Argeș; Corbeni; Comana.

$\beta$ . *laciniata* Grec. consp. p. 480. **B. laciniata** L. spe. p. 837 exclusiv var.  $\beta$  et  $\gamma$ . — Livezi deschise. Slănic.

**Ajuga hybrida** A. Kern. œst. bot. zeit. 1874 p. 382 (Consp. p. 481). — Livezi, crânguri. Caracal pe la pădurea Romula (pl. indig. 1900); Comana.

**A. Laxmanni** Benth. labiat. p. 697 (Consp. p. 482). — Locuri deschise, crângușoare. Mărășești.

**Tenierium Scordium** L. spe. p. 790 (Consp. p. 482). — Locuri joase umede, mlăștinoase. Pe Colentina la Fundeni-Mărcuța.

**T. Chamædrys** L. spe. 790 (Consp. p. 483). — Locuri uscate, tuferișe, crânguri, livezi. Govora; Curtea-de-Argeș, Corbeni; Slănic; Măcin; Greci; Techirghiol-Movilă pe malurile mării: *forma hirsutior*.

Adiție sub acesta :

\*  $\beta$ . *gracilior*. — Livezi, tufertșe pe coaste. Agiud.

Caul cu mult mai înalt (30—35 cent.), flexuos și mult mai subțire comparativ cu al speciei comune.

**T. Polium** L. spe. p. 792 (Consp. p. 483):

*a. vulgare* Benth. in DC. prodr. vol. 12 p. 392 var.  $\gamma$ ; Grec. l. c. — Livezi uscate, pietriș cu iarbă. Roșiești distr. Tutova; Techirghiol-Movilă.

$\beta$ . *angustifolium* Benth. l. c. var.  $\zeta$ ; Grec. l. c. — Locuri aprice, tărâm cam năsipos, la Poeana spre Piscu lângă Calafat.

**T. prostratum** Schur enum. transs. p. 547 (Consp. p. 484). — Locuri pietroase, pe dealul Runcului în Gorji (pl. indig. 1901).

## PLUMBAGINACEÆ Lindl.

**Armeria alpina** Willd. enum. h. berolin. vol. 1 p. 333 (var *pumila* Fuss.). — Consp. p. 484. — Regiunea alpină pe stânci. Pe Negoiu și Lespezi; Buceci la Omu (pl. indig. 1899) și pe Caraimanu (pl. indig. 1901).

**Statice Gmelini** Willd. spe. pl. vol. 1 p. 1524 (Consp. p. 485). — Locuri joase salifere. Stepele Ialomiței la Cotorca și la Valea-Sărăturilor; Măcin pe la bălțile de la Carcaliu și Turcoaea.

**S. Besseriana** Rœm. et Sch. syst. veget. vol. 6 p. 789 (Consp. p. 485).—Tărâm lœss năsipos. Stepele Ialomiței pe la Hagieni, Țândărei; Techirghiol.

### PRIMULACEÆ Vent.

**Lysimachia punctata** L. spe. p. 210 (Consp. p. 486).—Păduri, în munții Slănicului.

**L. vulgaris** L. spe. p. 209 (Consp. p. 486). — Păduri, locuri umbroase. Curtea-de-Argeș; Isvoarele distr. Dâmbovița; Slănic.

**Anagallis arvensis** L. spe. p. 211 (Consp. p. 487).—Adiție: vulgar *Schinteoară*. Garduri rustice, tuferișuri. Curtea-de-Argeș; Techirghiol.

**Androsace maxima** L. spe. p. 203 (Consp. p. 487).—Locuri ierboase. Cotorca în Ialomița; Brăila (pl. indig. 1901); Podu-Turculu (pl. indig. 1900); pe muntele Carol lângă Hancearca distr. Tulcea.

**A. elongata** L. spe. p. 1668 (Consp. p. 487).—Locuri ierboase, tărâm fertil. Podu-Turcului pe la pădurea Bodeasa (pl. indig. 1900); Bârlad (pl. indig. 1901).

**A. lactea** L. spec. p. 204 (Consp. p. 488).—Adiție: vulgar *Laptele-stâncilor*—Regiunea alpină pe stânci. În Argeș pe Suru (pl. indig. 1899), Negoii și Lespezi; Buceci la Omu și pe Caraiman (pl. indig. 1901); Ceahlău (pl. indig. 1900).

**A. obtusifolia** All. fl. pedem. vol. 1 p. 90 tab. 46 (Consp. p. 488).—Regiunea alpină, pe stânci. În Argeș pe Suru (pl. indig. 1899); Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901).

**A. Chamæjasme** Host synopsis. pl. austr. p. 95 (Consp. p. 488).—Regiunea alpină pe stânci. Buceci la Obârșia-Ialomiței și la Omu (pl. indig. 1899), Caraimanu (pl. indig. 1901).

**A. arachnoidea** Schott analec. bot. p. 17 (Consp. p. 488). — Regiunea alpină, pe stânci. Buceci la Omu (pl. indig. 1899) și pe Caraiman (pl. indig. 1901); Ceahlău (pl. vasc. ceahl. p. 69).

**Primula longiflora** All. fl. pedem. vol. 1 p. 92 tab. 39 (Consp. p. 488).—Regiunea alpină, stânci, locuri ierboase. În Argeș pe Suru (pl. indig. 1899) și lângă Negoii pe Lespezi; Buceci pe Caraimanu.

**P. acaulis** Jacq. miscell. vol. 1 p. 158 (Consp. p. 488).—Livezi, tuferișe pe lângă păduri. Câmpulung pe Flămânda; la pădurea Măgura distr. Bacău; Târgu-Neamțu (pl. indig. 1899); Vârciorova (pl. indig. 1900).

**β. caulescens** Koch syn. p. 674. —Livezi, tuferișe. Câmpulung în Li-vedea-Bărăției și la Flămânda (pl. indig. 1899); Pitești la Trivale.

**P. elatior** Jacq. miscell. vol. 1 p. 158, adăogând și sinonimii sei dupe A. Kerner sched. fl. exsic. austro-hung. n<sup>o</sup> 1368 (Consp. p. 489).—Livezi, rărișuri, în regiunea subalpină. Sinaia; Ceahlău.



**P. officinalis** Jacq. miscell. vol. 1 p. 159 (Consp. p. 489).—Adiție: vulgar *Caltă. Anghelină*.—Livezi, tuferișe. In Vrancea la comuna Mera poeana Roșioara; în Neamțu la Petricani; în Botoșani la Rediul Stăncenilor (pl. indig. 1900).

**P. suaveolens** Bertol. in Desv. journ. de bot. ann. 1813 p. 76 (Consp. p. 489).—Poeni, stânci, în regiunea subalpină quasi alpină. Buceci la Urlătoarele (pl. indig. 1900), Sinaia pe Furnica; Piatra-Neamțu pe Petricica; Ceahlău (pl. vasc. ceahl. p. 69 cu observație).

**P. Auricula** L. spe. p. 205: *forma dentato-serrata* nostra. Consp. p. 490.—Stânci calcare, pe muntele Piatra-Cloșanilor în Mehedinț (pl. indig. 1899) și pe muntele Sturu în Gorji.

**P. minima** L. spe. p. 205 (Consp. p. 490).—Stânci, locuri pietroase, în culmi alpine. In Argeș pe Suru (pl. indig. 1899) și Negoiu; Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901); Parângu pe Găuri la Căldare.

**Cortusa Matthioli** L. spe. p. 206 (Consp. 490).—Stânci, locuri pietroase în văi montane subalpine quasi alpine. Cheea-Argeșului pe la Cetatea Vlad-Țepeș, copios; Buceci la Urlătoarele (pl. indig. 1900); Ceahlău (*var. pubens* Schott, Grec. pl. indig. 1900).

**Soldanella montana** Willd. <sup>9</sup>enum. hort. berol. vol. 1 p. 192 (Consp. p. 490).—Adiție: vulgar *Degitărele. Potirașe*.—Stânci, locuri ierboase în regiunea alpină. Parângu pe Mirul-mare; Argeș pe Suru; Buceci pe Vîrfuc-Doru și Furnica (Grec. enum. an. 1880 p. 39 și Consp. p. 490); pe Babele, Caraiman și Costila (Consp. p. 490); Ceahlău (*S. alpina* Grec. p. 490 și pl. indig. an. 1900 p. 38-non L.), mai adăogând: Buceci pe Furnica, la Urlătoarele și pe Caraiman aflată și în urmă (pl. indig. 1900 și 1901).

β. *hungarica* Simk. enum. pl. transs. p. 461; Porciu diagn. pl. vascul. transs. p. 240. *S. alpina* β. *hungarica* Grec. consp. p. 491.—Buceci pe Costila (Consp. l. c.).

Varietate slabă de *S. montana* Willd. ce se aseamănă mult și cu *S. alpina* L. care, propriu-zisă, nu vine la noi și care diferă cu osebire prin foile sale reniforme întregi, baza deschisă, având lobii îndepărtați, florile mai măricele; pe când la *S. montana* foile sunt orbiculare sau subrotunde, profund cordate, subtil și repand crenate, baza închisă că lobii adesea se ating, florile întru câțva mai mici. Var. *hungarica* are foile mai mici, cum ar fi cele de *S. alpina*, însă nu reniforme, dar în felul celor de *S. montana*, florile cum la cea din urmă; iar în cea ce privește përositatea pedicelelor, glandulele sale sunt ceva mai stipitate și asprișoare. Ea stă pe regiuni alpine mai superioare de cum *S. montana* Willd. tipica.

De suprimat *Soldanella alpina* L. (Consp. p. 490).

**S. pusilla** Baumg. enum. transs. I p. 138 (Consp. p. 491).—Regiunea

alpină superioară. Negoiu (în anu 1907); Buceci la Omu (pl. indig. 1899); Parângu la poalele Mândrei pe lângă zăpadă veche.

### PLANTAGINACEÆ Lindl.

**Plantago major** L. spe. p. 163 (Consp. p. 491): *forma comminuis, genuina*.—Locuri cu iarbă, Govora; Curtea-de-Argeș; Câmpina.

*var. δ. sabulosa* Grec. consp. p. 491.—Panciu pe lângă Iazul Apostoleanu.

**P. Cornuti** Gouan illustr. p. 6 (Consp. p. 492).—Locuri joase nășipoase salifere. Cotorca în Ialomița; Constanța pe lângă Tăbăcărie, lacul Tusla (pl. indig. 1900) și pe litoralul mării la Techirghiol.

**P. sibirica** Poir. encycl méth. suppl. 4 p. 433 (Consp. p. 492).—Synon. *P. Cornuti* Guebh. pl. mold. n° 569 exsicc. ap. Dcsne in DC. prodr. vol. 13 p. 698-non Gouan nec. Jacq. *P. Schwarzenbergiana* Schur. enum. transs. p. 561.—Locuri joase sărate. Podu-Iloaei pe Bahlui (Iași).

**P. gentianoides** Sibth. et Sm. fl. græc. vol. 1 p. 104; Dcsne in DC. prodr. vol. 13 p. 721; Grec. consp. p. 492. *P. uliginosa* Baumg. enum. transs. vol. 1 p. 89. Regiunea alpină, la locuri umede sfagnoase. Parângu pe Mirul-mare; în Muscel pe Găinațu și Păpușea.

**P. media** L. spe. p. 163 (Consp. p. 492).—Livezi, locuri ierboase. Govora; Curtea-de-Argeș; Dealu-Mare.

**P. lanceolata** L. spe. p. 164 (Consp. p. 492).—Livezi, locuri ierboase. Govora; Curtea-de-Argeș; Câmpulung.

β. *irrigua* Dcsne in DC. prodr. vol. 13 secț. 1 p. 716 (Consp. p. 493).—București la Șoșea, Brănești.

γ. *hungarica* Grec. consp. p. 493. **P. hungarica** W. et Kit. pl. rar. hung. vol. 3 tab. 203.—Brănești; Brăila (pl. indig. 1901).

**P. maritima** L. spe. p. 165 (Consp. p. 493).—Locuri joase salifere cam nășipoase. Stepele din Buzău pe Călmățui pe la Caragelele (*forma genuina: foliis glabris integerrimis*).

**P. tenuiflora** W. et Kit. pl. rar. hung. vol. 1 tab. 39 (Consp. p. 494).—Locuri joase salifere. Iași în lunca Bahluiului.

**P. arenaria** W. et Kit. pl. rar. hung. vol. 1 tab. 51 (Consp. p. 494).—Adiție: vulgar *Ochiu-Lupului*.—Dunele danubiane din Dolj, lângă Calafat la Poeana și Piscu; Bârlad (pl. indig. 1901); Măcin, Turcoaea, Iglița; Techirghiol-Movilă.

Adiție dupe *Plantago* (Consp. p. 494):

\* 2. **LITTORELLA** L. n° 1328

\* 1. **L. lacustris** L. mant. p. 160 et 295; Sturm deutsch. fl. fasc. 41;

Koch syn p. 685; Desne in DC. prodr. vol. 13 part. I p. 737; Gren. Godr. fl. fr. vol. 2. p. 732; Rehb. icon. fl. germ. vol. 17 tab. 75. fig. 3 et 4. *Plantago uniflora* L. spe. p. 167.—Vulg. *Chenaru-bălților*. In ostrovurile dunărene la Brăila, năsipurile umede pe lângă marginea bălților.

## CLASA V

## Dicotiledoane Apetale Hermafrodite.

## AMARANTACEÆ R. Br.

Se va suprima numirea capitală de *Amarantus Blitum* L. (Consp. p. 495) păstrând numirea de:

2. *Amarantus silvestris* Desf. catal. hort. paris. ann. 1804 p. 44 et ann. 1815 p. 52; Koch syn. p. 690; Gren. Godr. fl. fr. vol. 3 p. 4; Schlecht. Langeth. deutsch. fl. vol. 9 fig. 850. *A. pallidus* M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 2 p. 399 (1808). *A. Blitum*  $\alpha$ . *silvestris* Moq.-Tand. in DC. prodr. vol. 13 part. 2<sup>o</sup> p. 263; Ledeb. fl. ross. vol. 3 p. 858.—Vulg. *Știr*.—☉ Iulie-Septemv. Mai ales la locuri cu pietris, locuri sterpe, pe lângă garduri vechi. Curtea-de-Argeș în gară; București, Herestrău; Comana; Adjud; Viziru distr. Brăila.

3. *A. viridis* L. spe. p. 1405 n<sup>o</sup>. 12 sec. Moq.-Tand. in DC. prodr. vol. 13 part. 2<sup>o</sup> p. 273 sub *Euxolus* var.  $\beta$ . *adscendens*-non All. nec Vill. nec. Willd.; Poll. palatin. vol. 2 p. 608. *Albersia viridis* Kunth fl. berlin. vol. 2 p. 144 (1838); Ledeb. fl. ross. vol. 3 p. 859. *Amarantus Blitum* Koch syn. p. 690; Schlecht. Langeth. deutsch. fl. vol. 9 fig. 860 et auct. plur.-non L.—vulg. *Știr-prost*.—☉ Iulie-Septemv. Locuri virane, pe lângă garduri rustice și ziduri vechi. București, Fundeni-Mărcuța; (pl. indig. 1901).

Adiție în § 2: *Euxolus*. (Consp. p. 495):

\* 4. *A. deflexus* L. mant. p. 295 (1762); Gren. Godr. fl. fr. vol. 3 p. 3. *A. Euxolus deflexus* Rafin. fl. tell. p. 42 n<sup>o</sup> 556 (1838), Moq.-Tand. in DC. prodr. vol. 13 part. 2<sup>o</sup> p. 275. *Albersia deflexa* Boiss. fl. orient. vol. 4 p. 992 (1879).—☉ Iulie-Septemv. Locuri virane, pe la garduri și ziduri vechi. București (pl. indig. 1901 p. 22 și în urmă); Caracal (pl. indig. 1900 p. 38).

*Polygonum arvense* L. spe. p. 50.— $\alpha$ . *majus*. *P. majus* Al. Braun in Koch taschenb. p. 436 (1844); Koch. p. 695; Grec. consp. p. 495. — *P. arvense*  $\alpha$ . *longifolium* Neill. diagn. p. 109 (1867).—Stepele Ialomiței pe la Cotorca, Hagieni, Țândărei.

β. *brevifolium* Neilr. diagn. p. 109 (1867). *P. arvense* L. legitimum et Auct. plur. *P. verrucosum* Lang. in syllog. ratisbon. vol. 1 p. 179 (1824); Grec. consp. p. 495. Locuri joase cam sărate, în stepele Buzeo-Brăilene pe Călmățui la Caragelele și Rușetu.

\* γ. *filifolium* Neilr l. c. *P. Heuffelii* Lang. l. c. (1824); Moq.-Tandon in DC. prodr. vol. 13 partea 2<sup>o</sup> p. 336.—⊙ Iulie-Septemvre. Locuri năsipose, petriș mênunt. Pe la pădurea Vanghelie-Zappa în Ialomița.

### CHENOPODIACEÆ Lindl.

*Salsola Kali* L. spe. edit. I p. 222 (1753), Grec. consp. p. 496. — Șesuri de lœss năsipos, locuri joase sărate, arenele maritime. Stepele Brăilei pe la Viziru, Brăila; stepele Ialomiței pe la Dridu, Coșereni, Hagieni; Măcin Turcoaea, Iglița; marginea mării la Techirghiol-Movilă.

β. *angustifolia* Fenzl (Consp. p. 496). — Tot în regiunea stepelor. Agiud în Putna; Speteni, Borănești, Cotorca, Hagieni în Ialomița; Techirghiol-Movilă.

Adiție dupe aceasta (Consp. p. 496):

\* *S. Soda* L. spe. ed. 1762 p. 323; Koch syn. p. 693; Moq.-Tand. în DC. prodr. vol. 13 part. 2<sup>o</sup> p. 189; Fenzl în Ledeb. fl. ross. vol. 3 part. 2<sup>o</sup> p. 803; Gren. Godr. fl. fr. vol. 3 p. 32; Boiss. fl. orient. vol. 4 p. 953.—⊙ Iulie-Septemvre. Locuri sărate, în stepele Buzeo-Brăilene pe Călmățui la Caragelele și Rușetu.

*Suaeda maritima* Dumort. fl. belg. p. 22 (Consp. p. 497).—Locuri sărate. Pe lângă lacul Boii-Negri distr. Brăila (P. Enculescu) și pe lângă lacul Techirghiol.

Adiție subț aceasta:

β. *salinaria*.—*Suaeda salinaria* Simk. enum. transs. p. 466 (1886) et botan. transs. recentiores. *Schoberia salinaria* Schur. enum. transs. p. 568 (1866). *Suaeda maritima* var. *angustifolia* Andræ bot. zeit. tom. XIII p. 899-non Fenzl in Ledeb. fl. ross. vol. 3 p. 788 (1851)=*S. filiformis* Dumort. fl. belg. p. 22.—⊙ August-Septemvre. La locuri sărate. Stepele Ialomiței pe la Cotorca; stepele Buzului pe albia Călmățuiului pe la Caragelele; Măcin pe valea Slatina spre Greci; marginea lacului Techirghiol-Movilă subț stabilimentul balnear.

Ca și aceea din Transilvania, planta noastră diferă înțru cătva de adevărata formă occidentală de *Suaeda maritima* Dumort. prin înfățșarea sa: mult mai robustă, glauco-pruinoasă și chiar de la bază mult ramificată în ramuri jos procumbente apoi ascendente; foile mai groase și mai cărnoase, cilindracee sau cam plane, spre vîrf acute; florile tot în glomerule axilare a câte 2—3. Dacă prin florile sale nu diferă esențial, totuși

prin înfățișarea sa cu mult mai robustă și mai ramificată se impune ca deosebire de forma specifică occidentală

Se apropie mult și de *Suaeda salsa* Pall. ce, cu adevărat, crește în părțile Rusiei austro-orientale mărginașe cu Marea Caspică spre Astrachan și în Tuckestan. Astfel fiind, planta noastră ar forma o linie de trecere între aceste două specii.

***Halimocnemis triandra*** Moq.-Tand. în DC. prodr. vol 13 part. 2<sup>o</sup> p. 197. *H. volvox* C. A. Mey. (Consp. p. 497).—Locuri joase sărate. Stepele sărate Buzeo-Brăilene pe Călmățuiul pe la Caragelele.

***H. crassifolia*** C. A. Mey. în Lebed. pl. altai. vol. 1 p. 385 n<sup>o</sup>. 5 (Consp. p. 497).—Tot asemenea la locuri sărate. Stepele Buzeo-Brăilene pe Călmățuiul; Valea-Largă distr. Iași.

***Salicornia herbacea*** L. spe. p. 5 (Consp. p. 497).—Adiție: vulgar *Căpriță*.—Locuri joase sărate. Pe Călmățuiul la Caragelele; Măcin pe valea Slatina spre Greci și spre lacul Iglia; marginile lacului Techirghiol.

***Camphorosma ovata*** W. et Kit. pl. rar. hung. vol. 1 tab. 63 (Consp. p. 498).—Locuri joase sărate. Valea Sărătorele în Ialomița; Valea-Largă distr. Iași.

***Kochia scoparia*** Schrad. neu. journ. an. 1809 p. 85 (Consp. p. 498).—Prin grădini rustice și subsponatane. Cotorca; Brăila; Agigea, Techirghiol.

***K. arenaria*** Roth ap. Schrad. journ. vol. 1 p. 307 tab. 2 an. 1800 (Consp. p. 499).—In șesurile năsipose pe la Hanul Conache distr. Tecuci.

***K. prostrata*** Schrad. neu. journ. an. 1809 p. 85 (Consp. p. 499).—Locuri aprice, loess năsipos și năsipuri în regiunea stepelor. Hagieni, Cegani; Măcin spre Turcoaia și Iglia; Constanța (pl. indig. 1900); Techirghiol-Movilă (cu *var. rubella* Moq.-Tand.).

***K. hirsuta*** Nolte nov. fl. holsat. p. 24 (Consp. p. 499).—Locuri sărate. Stepele Brăilei pe Călmățuiul pe la comuna Batogu; marginea lacului Techirghiol sub stabilimentul balnear Movilă.

***Chenopodium hybridum*** L. spe. p. 319 (Consp. p. 499).—Locuri inculte umbroase, pe la păduri, garduri rustice. Govora; Curtea-de-Argeș; lunca Prahovei pe la Tinoasa, Crivina.

***Ch. urbicum*** L. spe. p. 318 (Consp. p. 500).—Locuri inculte, părăgini, comune rurale și urbane, pe la garduri. Curtea-de-Argeș; Câmpina; Dealu-Mare; Cotorca; Măcin, Babadag.—Adiție după acesta:

\* 2.<sup>a</sup> ***Ch. intermedium*** Mert. et Koch. deutsch. fl. vol. 3 p. 297 (1826); Sturm. deutsch. fl. fasc. 15. *Ch. urbicum* β. *intermedium* Moq. Tand. chenopod. enum. p. 32 (1840); ejus in DC. prodr. vol. 13 part. 2<sup>o</sup> p. 70; Koch syn. p. 696. *Ch. urbicum var. grandidentatum* A. Dietr. fl. regni boruss. n<sup>o</sup> 894 (1844). — ☉ Iulie-Septemvrie. Locuri inculte, părăgini, garduri. Curtea-de-Argeș.

**Ch. album** L. spe. p. 319; Sturm. deutsch. fl. fasc 75: — *genuinum* Koch syn. p. 696 *var. α*; Moq.-Tand. in DC. prodr. vol. 13 part. 2<sup>o</sup> p. 71 *var. α*; Ledeb. fl. ross. vol. 3 p. 697 *var. β* *lusus* 1; Gren. Godr. fl. fr. vol 3 p. 19; Grec. consp. p. 500. *Ch. candicans* Lam. fl. fr. vol. 3 p. 248 (1805). — ☉ Iulie-Septemvire. Locuri inculte și virane, părăgini, căi comunale pe la garduri. Curtea-de-Argeș malul dinspre gară; Constanța, Techirghiol.

*β. viride* Moq.-Tand. in DC. prodr. vol. 13 part. 2<sup>o</sup> p. 71 *var. ε*; Gren. Godr. fl. fr. vol. 3 p. 19. **Ch. viride** L. spe. p. 319; Sturm. deutsch. fl. fasc. 75. *Ch. album β. cymigerum* Koch. syn. p. 696.—La locuri cu genuinul. Curtea-de-Argeș; București; Tuzla (pl. indig. 1900); Techirghiol-Movilă, Constanța.

*γ. lanceolatum* Gren. Godr. fl. fr. vol. 3 p. 19. **Ch. lanceolatum** Mühlenb. in Willd. enum. h. berol. vol. 1 p. 291 (1809). *Ch. album var. concatenatum* Thuill. fl. paris. p. 125; Sturm. deutsch. fl. fasc. 75.—Curtea-de-Argeș; București; Constanța, Techirghiol, Tuzla.

Aceasta diferă de *var. β*, cu care adesea se poate confundă, prin foile sale, deasemenea tot verzi, însă oblungi, ovat-lanceolate și lanceolate cam înguste, întregi sau aproape întregi.

**Ch. opulifolium** Schrad. in Koch et Ziz. catal. pl. palat. p. 6 (Consp. p. 500).—Drumuri, locuri virane, garduri. București; Constanța; Techirghiol.

**Ch. polyspermum** L. spe. p. 321 (Consp. p. 500). Locuri umbroase, păduri. Curtea-de-Argeș; pe Prahova la Tinoasa; Fundeni; Niculițel, Telița.

**Blitum glaucum** Koch ap. Sturm. deutsch. fl. fasc. 75 tab. 1 (Consp. p. 501).—Locuri joase sărate. Techirghiol pe marginea lacului (Chenopodium glaucum Grec. pl. indig. 1900); Slănic.

**B. Bonus-Henricus** C. A. Mey. in Ledeb. fl. altai. vol 1 p. 11 (Consp. p. 501).—Regiunea alpină, subalpină, tărâm negru, pe la stâne. Pârângu pe Prislopu; Negoiu pe Lespezi și Paltina; Predeal pe Clăbucetu-Taurului; Slănic pe Șandru.

**B. virgatum** L. spe. p. 7. (Consp. p. 502).—Locuri de cultură, tărâm fertil. Iași la Bârnova.

**Obione pedunculata** Moq.-Tand. chenopod. enum. p. 75 (Consp. p. 502).—Locuri sărate. Stepele Brăilei la lacul Boii-Negrii; Batogu.

\* **2. O. portulacoides** Moq.-Tand. chenopod. enum. p. 75 n<sup>o</sup> 17 (1840); ejus in DC. prodr. vol. 13 part. 2<sup>o</sup> p. 112; Gren. Godr. fl. fr. vol. 3 p. 14; Schlechtd, Langeth. deutsch. fl. vol. 9 fig. 888. *Atriplex portulacoides* L. spe. p. 1493. *Halimus portulacoides* Wallr. sched. p. 117 (1822), Sturm. deutsch. fl. fasc. 80; Koch syn. p. 700.—Oarecum 4. Iulie. Septemvire. Locuri joase sărate. Pe Călmățui comuna Batog; Valea-Largă

distr. Iași ; Măcin pe valea Slatina; Babadag, Hagilar ; Turcoaea, Iglița.

**Ceratocarpus arenarius** L. spe. p. 1375 (Consp. p. 503).—Regiunea stepelor uscate. Vetrișoara distr. Fălciu; Măcin, Turcoaea, Iglița; Constanța pe la Alacapù (pl. indig. 1900).

Speciile genului **Atriplex** se vor așeza precum urmează :

**ATRIPLEX** L. gen. n° 1153.

Secția I<sup>a</sup>: **Dichospermum** Dumort. Bracteele florilor femele la maturitate devin membranoase și palide cu vinișoare subțirele reticulate, rămân cu totul separate.

1. **A. hortensis** L. spe. p. 1493; Sturm. deutsch. fl. fasc. 79; Koch syn. p. 701; Moq.-Tand. in DC. prodr. vol. 13 part. 2<sup>o</sup> p. 91; Ledeb. fl. ross. vol. 3 p. 713; Boiss. fl. orient. vol. 4 p. 907; Schlechtd. Langeth. deutsch. fl. vol 9 fig. 890.—Vulg. *Lobodă. Lobodă bună* și de cultură.—☉ Iulie. August. In cultură și subspontanee. Curtea-de-Argeș; București; Târgu-Ocna: toate tipice.

β. *microtheca* Lorr. et Barr. fl. montp. p. 559 (1876). **A. microtheca** Moq.-Tand. in DC. prodr. vol. 13 part. 2<sup>o</sup> p. 91 (1849); Grec. consp. p. 505.—Lœss năsipos. Malurile Mărei Negre la Techirghiol-Movilă, Constanța la vii.

2. **A. nitens** Schkuhr handb. vol. 3 p. 541 tab. 348 (Consp. p. 503).—Lœss năsipos. Malurile Mărei Negre la Techirghiol-Movilă.

A se suprimă din Conspect cuvintele de frecvență ale acestei specii în ce privește partea cis-danubiană a țării.

Secția II<sup>a</sup>: **Teutliopsis** Dumort. Bracteele florilor femele la maturitate sunt foliacee, la bază concrescute în oarecare întindere. La noi specii anuale.

§. I Bracteele la bază puțin concrescute, în marea parte libere, la maturitate rămân verzi, ierbacee, conforme.

3. **A. oblongifolia** W. et Kit. pl. rar. hung. vol. 3 tab. 221 (Consp. p. 503).—Locuri inculte, drumuri, locuințe rustice. Techirghiol-Movilă.

4. **A. patula** L. spe. p. 1494 (Consp. p. 503).—Lunca Prahovei la Tinoasa; Periș; București.

β. *erecta* Grec. consp. p. 503. **A. erecta** Huds. fl. angl. ed. 1 p. 376 (1762); Smith fl. brit. vol. 3 p. 1903 (1804).—La locuri sărate. București; Cotorca distr. Ialomița.

5. **A. latifolia** Wahlenb. fl. suec. vol. 2 p. 660 (Consp. p. 504).—La locuri joase umede, aprice sau sărate. Lunca Prahovei la Tinoasa, Crivina; pe Colentina la Fundeni-Mărcuța.

\* β. *microsperma*.—**A. microsperma** W. et Kit. pl. rar. hung. vol. 3 tab. 250 (1812).—non tab. 221 quæ ad. *A. patulam* spectat (Consp. p. 504).—Tuferișe. București parcul la Șosea.

\* *γ. salina* Koch syn. p. 702. *A. patula* var. *salina* Wallr. sched. p. 505 (1822). *A. patula γ. farinosa* DC fl. fr. vol. 2 p. 113 (1805) — non Forsk. — La locuri joase sărate. Cotorca în Ialomița; Techirghiol-Movilă pe marginea lacului și pe malul mării.

6. *A. littoralis* L. spe. p. 1494 (Consp. p. 504). — La locuri joase sărate. Comuna Bărbuleștii pe valea Părăul-Sărat în Ialomița; Valea-Largă distr. Iași.

§ 2<sup>o</sup>. Bracteele până pe la mezloc concrescute, la maturitate în jumătatea lor inferioară devin cartilaginoide, indurate și albicioase, spre vârf verzui, denticulate.

7. *A. Tatarica* L. spe. edit. 1753 p. 1053 (Consp. p. 504 exclus. synonymo *Urvillæi*). — La locuri inculte ruderales, joase sau sărate. Agiud, Focșani.

β. *sinuata*. — *A. sinuata* Hoffm. deutsch. fl. vol. 2 p. 277 (1808). *A. laciniata γ. sinuata* Moq.-Tand. chenopod. enum. p. 57 (1840). *A. laciniata α. discolor* Lus. 3: *sinuata* Ledeb. fl. ross. vol. 3 p. 719, 720. *A. laciniata* Sturm deutsch. fl. fasc. 80 tab. 2; Koch syn. p. 703-non L. — La locuri inculte, locuri virane. București foarte comună; Constanța.

*γ. diffusa*. — *A. laciniata δ. diffusa* Moq.-Tand. l. c. p. 57; Ledeb. fl. ross. vol. 3 p. 720 lus. 2; *A. laciniata c. salina* Schur enum. transs. p. 577. — La locuri sărate. Măcin pe valea Slatina, pe la Hagilar și Satu-Nou spre Babadag; Techirghiol-Movilă pe marginea lacului și spre satorul Eforiei Spitalelor.

8. *A. rosea* L. spe. p. 1493 (Consp. p. 504). — La locuri uscate aspre inculte și ruderales. Curtea-de-Argeș; București; Techirghiol-Movilă

## POLYGONACEÆ Lindl.

*Rumex maritimus* L. spe. p. 478 (Consp. p. 505). — Locuri joase oarecum sărate. Călimănești; Fundeni-Mărcuța; Cotorca pe valea Cotorceanca în Ialomița; Isaccea, Ghecet, Jijila.

\* β. *pygmaeus*. — Plantă cu totul micuță și subțirică, ca 5—8 cmt. înălțime. Pe Colentina la Fundeni-Mărcuța.

Numirea de *R. palustris* Sm. a se înlocui, ca numire capitală, prin următoarea, fiind mai veche:

2. *R. limosus* Thuill. fl. paris. edit. 2 p. 182 (1799). *R. palustris* Smith fl. brit. vol. 1 p. 394 (1800); Sturm deutsch. fl. fasc. 73; Koch syn. p. 704; Ledeb. fl. ross. vol. 3 p. 500; DC. prodr. vol. 14 p. 59; Schlecht. Lang. deutsch. fl. vol. 9 fig. 827. *R. palustris d. limosus* Celak prodr. fl. bohem. p. 158 (1871) — ☺ Iulie-Septemvrie. Mlăștinele Colentinei la Fundeni-Mărcuța.



**R. pulcher** L. spe. p. 477 (Consp. p. 505). — Locuri inculte, drumuri. București, Băneasa, Herestrău.

**R. obtusifolius** L. spe. p. 478 (Consp. p. 506). — Locuri inculte, tuferișe. București la Șosea spre Școala de Agricultură.

Între altele, diferă de cel precedent, prin lipsa de foi a verticilastrelor de flori.

Adiție după *Rumex crispus* L. (Consp. p. 506) :

\* **6<sup>b</sup>. R. Patientia** L. spe. p. 476 ; Sturm deutsch. fl. fasc. 73 n<sup>o</sup> 14 ; Koch syn. p. 706 ; Meisn. in DC. prodr. vol. 14 p. 51 ; Ledeb. fl. ross. vol. 3 p. 507. — 7 Iulie. August. Locuri umede, șianțuri, garduri rustice și în cultura verdețurilor alimentare : vulg. *Stevie*. *Stevie bună*. *Șpanac englezesc*, celui cultivat, îi zic zarzavagii în București.

**R. conglomeratus** Murr. prodr. fl. goetting. p. 52 (Consp. p. 506).

Locuri umbroase, tuferișe, păduri. Govora ; Curtea-de-Argeș ; Slănic.

**R. viridis** Smith fl. brit. vol. 1 p. 390 (Consp. p. 507). — Păduri, locuri umbroase sau dosnice în părțile montane și submontane. Pe Argeș la Cumpăna în valea Caprei, Cheea Argeșului, Curtea-de-Argeș pe dealurile Hodiei și ale Rugetului ; pădurea Tinoasa în Prahova ; Predeal.

**R. Hydrolapathum** Huds. fl. angl. ed. 2 vol. 1 p. 154 (Consp. p. 507). — Locuri băltoase salifere. Cotorca în Ialomița ; Măcin în bălțile dunărene și pe la Tulcea.

**R. alpinus** L. spe. p. 480 (Consp. p. 507). — Regiunea montană subalpină și quasi alpină, pe la stâne și în părți umede pe lângă pârauri. Parângul pe Mirul-Mare ; munții Negoilui pe Lespezi și Paltina : la Cumpăna pe valea Caprei ; Slănic pe Șandru.

**R. arifolius** All. miscell. fl. taurin. vol. 5 pars 2<sup>o</sup> p. 94 (Consp. p. 508). — Munții Parângului pe Mirăuțu spre poale.

**R. acetosella** L. spe. p. 481 (Consp. p. 58). — Adiție : vulgar *Macrișul-cailor*. — Livezi în părți uscate. Râmnic în lunca Oltului ; pe Argeș la Cumpăna în livedea dela gura Budei, copios ; Curtea-de-Argeș.

**Oxyria digyna** Campdera monogr. rum. p. 155 tab. 3 (Consp. p. 509). — Regiunea alpină culminantă. Suru pl. indig. 1899), Negoiu ; Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901) și la peștera Ialomiței (pl. indig. 1899).

**Polygonum Bistorta** L. spe. p. 516 (Consp. p. 509). — Livezi în regiunea montană subalpină și quasi alpină. Munții Negoilui pe Podeanu, Lespezi și Paltina ; Predeal ; pe Lotru la Voineasa și Vidra.

**P. viviparum** L. spe. p. 516 (Consp. p. 509). — Stânci, locuri ierboase în regiunea alpină. Parângu pe Găuri la Căldare ; Suru (pl. indig. 1899), Negoiu și pe Lespezi ; Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901) ; Ceahlău (pl. indig. 1900).

**P. lapathifolium** L. spe. p. 517 (Consp. p. 510). — Locuri joase ude,

șianțuri ude, garduri rustice. Lunca Argeșului și în Curtea-de-Argeș; Crivina pe la pădurea Tinoasa calea ferată.

**β. *incanum*** Koch syn. p. 711 (Consp. p. 510). — Lunca Colentinei pe la Băneasa, Herestrău; lunca Ciorogârlei la Bragadiru.

**γ. *danubiale*** Grec. consp. p. 510. **P. *danubiale*** A. Kern. veget. verhn. 1456 et in œst. bot. zeit. ann. 1875 p. 254. Adiție: *P. prostratum* Wimm. fl. siles. p. 316 (1849) ca sinonim.

**P. *persicaria* α.** L. spe. p. 518 (Consp. p. 510). — Pe locuri joase ude sau mlăștinoase. Sinaia (pl. indig. 1899); lunca Prahovei pe la pădurea Tinoasa.

**P. *mite*** Schrank bayer. fl. vol. 1 p. 668. (Consp. p. 510). — La locuri umede. Slănic.

**P. *Hydropiper*** L. spe. p. 518 (Consp. p. 510). — Locuri umede, pe la garduri și părăgini, în Curtea-de-Argeș.

**P. *aviculare*** L. spe. p. 519 (Consp. p. 511). — Adiție: vulgar *Heriică*.

**P. *arenarium*** W. et Kit. pl. rar. hung. vol. 1 p. 69 tab. 67 (Consp. p. 512). — Locuri năsipose, în stepele Ialomiței pe la Hagieni, Țândărei, și ale Brăilei pe la plantațiile de la comuna Tătaru (P. Enculescu).

**P. *Bellardii*** All. fl. pedem. vol. 2 p. 206 tab. 90 (Consp. p. 512). — În dunele maritime de la Tuzla (pl. indig. 1900).

**P. *dumetorum*** L. spe. p. 521 (Consp. p. 512). — Tuferișe, garduri rustice. Govora pe la măgura Mătușea Floarea; Curtea-de-Argeș; pădurea Tinoasa pe Prahova; Slănic.

#### DAPHNACEÆ Lindl.

**Daphne Mezereum** L. spe. ed. 1 (1753) p. 356 (Consp. p. 513). — Tuferișe în părțile montane subalpine și quasi alpine. Pe Lotru la Voineasa în valea Jidoaea; pe Argeș în valea Caprei și pe muntele Paltina; Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901); văile Ceahlăului (pl. indig. 1900).

**Thymelea arvensis** Lam. fl. fr. vol. 3 p. 218 (Consp. p. 513). — La locuri sterpe sau inculte. În Ilfov pe la pădurea Dascălu-Creața plasa Mostiște; în Ialomița la Cotorca și la Sinteasca; Techirghiol-Movilă.

#### ELÆAGNACEÆ Lindl.

**Hipophaë rhamnoides** L. spe. p. 1452 (Consp. p. 513). — Pe râpele Argeșului la Oești; malurile Cricovului pe la Urlați.

#### LORANTHACEÆ Don.

**Viscum album** L. spe. p. 1451 (Consp. p. 515). — Parazitic pe Meri și Peri selbatici. Piatra-Neamțu; Oltenesti în Fălciu.

**Loranthus europæus** L. spe. p. 1672 (Consp. p. 515). — Parazitic pe Stejari. Oltenești în Fălciu; în Argeș pădurea Cotmeana.

### SANTALACEÆ R. Br.

**Thesium ramosum** Hayne in Schrad. journ. bot. ann 1800 vol. 1 p. 30 tab. 7 (Consp. p. 516). — Locuri ierboase. Poenile din pădurea Siminicea distr. Botoșani.

**Th. simplex** Velen. fl. bulg. p. 499 (Consp. p. 515). — Locuri ierboase. Brănești pe la pădurea Pustnicu și Cernica; Iași la Copou; Murfatlar.

**Th. alpinum** L. spe. edit. 1 p. 207 (Consp. p. 516). — Locuri ierboase. Bușteni pe jos și pe poalele Caraimanului (pl. indig. 1901); Slănic pe muntele Șandru.

**Comandra elegans** DC. prodr. vol. 14 p. 636 (Consp. p. 516). — Tuferișe, rărișuri de Gârnițe. Brănești pădurea Cernica.

### ARISTOLOCHACEÆ Juss.

**Asarum europæum** L. spe. p. 633 (Consp. p. 517). — Adiție: vulgar *Lingura-popei*. Păduri umbroase. Brănești pădurea Pustnicu.

## CLASA VI.

### Dicotiledoane Apetale Unisexuate.

#### URTICACEÆ Lindl.

**Parietaria erecta** Mert. et Koch fl. germ. vol. 1 p. 825 (Consp. p. 518). — Adiție: vulgar *Mătrice*. — Păduri pe locuri pietroase. În Dobrogea la Greci pe Țuțuiatu și la Taița.

**Cannabis sativa** L. spe. p. 1457 (Consp. p. 518). — Adiție: individelor femele vulgar *Aldan*. *Câneța-de-sămînță*.

**Humulus Lupulus** L. spe. p. 1457 (Consp. p. 518). — Tuferișe, margini de păduri, zăvoiuri. Govora pe valea Hinței; Curtea-de-Argeș, Flămânzeni; pădurea Tinoasa pe Prahova; Agiud în lunca Siretului.

#### EUPHORBIACEÆ Adr. de Juss.

**Euphorbia carniolica** Jacq. fl. austr. append. p. 34 tab. 14 (Consp. p. 521). — Păduri subalpine conifere. În Argeș pe muntele Arefu; Predeal

pe Urzicar (pl. indig. 1900), Buceci în valea Jepilor (pl. indig. 1901) și pe Caraimanu (pl. indig. 1901).

**E. lingulata** Heuff. enum. banat. p. 192 (Consp. p. 821).—Păduri, tuferișe. Severin pe dealul Buliga (pl. indig. 1899); Govora în valea Hinței.

**E. palustris** L. spe. p. 662 (Consp. p. 521).—Locuri joase băltoase. Comana la Padina-lui-Vasile (pl. indig. 1900) și pe Călniște pe lângă calea ferată despre Grădiștea.

**E. amygdaloides** L. spe. p. 663 (Consp. p. 522).—Păduri, dumbrave. Govora; Curtea-de-Argeș pe dealurile Hodiei și ale Rugetului, pe muntele Arefu și la Cumpăna pe Buda și Capra; Buceci în valea Jepilor (pl. indig. 1901); în Bacău la Comănești; Ceahlău.

**E. exigua** L. spe. p. 654 (Consp. p. 522).—Locuri năsipose, prundișuri. Pe valea Slănicului.

**E. falcata** L. spe. p. 654 (Consp. p. 522).—Constanța prin vii (pl. indig. 1900).

Adiție dupe aceasta (Consp. p. 522):

\* **13<sup>b</sup>. E. Peplus** L. spe. p. 658; Koch syn. p. 730; Rchb. icon. fl. germ. vol. 5 fig. 4773; Ledeb. fl. ross. vol. 3 p. 570; Boiss. fl. orient. vol. 4 p. 112; DC. prodr. vol. 15 p. 141; Schlecht. Lang. deutsch. fl. vol. 20 fig. 2080.—☉ Iunie-August.—Tarâm humifer fertil. Techirghiol-Movilă în parcul hotelului, cam rară.

**E. Gerardiana** Jacq. fl. austr. vol. 5 tab. 436 (Consp. p. 523).—În regiunea stepelor danubiane și pontice. Rîmnicu-Sărat spre Puești (pl. indig. 1901); în Ialomița pe la Hagieni, Țândărei; în Brăila pe la Brăila (pl. indig. 1901) și pe la Ghermănești; Măcin și Carcalțu; Constanța pe la Horoslar (pl. indig. 1901); Techirghiol, Tuzla.

**E. Esula** L. spe. p. 660 (Consp. p. 523).—Locuri aprice inculte. Coastele Ialomiței pe la Speteni, Borănești distr. Ialomița, a rar; Techirghiol-Movilă în parcul hotelului.

**E. lucida** W. et Kit. pl. rar. hung. vol. 1 tab. 54 (Consp. 524).—Locuri joase umede. băltoase. Herestrău, Băneasa pe cursul Colentinei.

**E. agraria** M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 1 p. 375 (Consp. p. 524).—Câmpuri, locuri fertile. Bârlad (pl. indig. 1901); Iași (pl. indig. 1901; Greci, Cerna, Balabancea; Constanța (pl. indig. 1900); Techirghiol-Movilă pe litoralul mării.

**E. glareosa** M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 1 p. 373 (Consp. p. 524).—Câmpuri, la locuri aprice sterile. În Ialomița pe la Hagieni, Țândărei; în Dobrogea pe la Creci pe dealu Bujoru și spre Măcin; Murfatlar (pl. indig. 1900); Techirghiol-Movilă.

**E. Myrsinites** L. spe. p. 661 (Consp. 624).—Locuri pietroase, stânci montane. Măcin, Greci pe munții Pricopanului (pl. indig. 1899).

**Mercurialis perennis** L. spe. p. 1465 (Consp. p. 525).—Păduri, dumbrave. Curtea-de-Argeș pe dealurile Hodiei și ale Rugetului.

**M. ovata** Sternb. et Hoppe denkschr. p. 170 tab. 4 (Consp. p. 525).—Caracâl la pădurea Preajba (pl. indig. 1900); pădure la Drăgăneasa distr. Tecuci (pl. indig. 1900); Bicaz (pl. indig. 1900).

### CALLITRICHACEÆ Link.

**Callitriche verna** L. spe. p. 6 sensù amplior (Consp. p. 526). —Vulgar *Drențe*.—Ape limpezi stagnante, pe valea Slănicului.

### CERATOPHYLLACEÆ Grey.

**Ceratophyllum demersum** L. spe. p. 1409 (Consp. p. 526).—Heleșteuri. Monăstirea Căldărușani; Monăstirea Cernica, Pantelimon, Mărcuța-Fundeni pe cursul Colentinei.

### CUPULIFERÆ Ach. Rich.

**Fagus silvatica** L. spe. p. 1416 (Consp. p. 527).

Deosebit de pădurile regiunii montane subalpine și alpestre, unde Fagul constituie elementul predominant al pădurilor, prezența sa este asemenea de notat în pădurile din districtul Iași la Răpedea și Bârnova, precum și în districtul Vaslui la Dobrovățu și Cazacu.

**Quercus. Robur** α. L. fl. suec. ed. 2<sup>o</sup> p. 340 (Consp. p. 527).—Păduri, sporadic (răzleț). Curtea-de-Argeș pe dealurile Hodiei și la Valea Calului; Piatra-Neamțu; în Dobrogea pe dealurile montane la Atmagea, Ciucarova, Slava și Babadag.

**Q. sessiliflora** Salisb. prodr. stirp. hort. chap. p. 395 (Consp. p. 528).—Adiție: vulgar *Grădun*.—Păduri, adesea formând masive. Govora; Curtea-de-Argeș pe dealurile vecine; Iași la Răpedea și Bârnova; Vaslui la Dobrovăț; Babadag, Greci, Măcin.

β. *Welandii* Wierzb. ap. Heuffel enum. banat. p. 159. *Q. sessiliflora* var. β. Grec. consp. p. 528. *Q. condensata* Schur enum. transs. p. 606 (1866). Pădurile din Dobrogea septentrională la Greci pe Taița și Țiganca; Văcăreni, Isaccea.

**Q. pubescens** Willd. spe. pl. vol. 4 p. 450 (Consp. p. 528). Adiție: vulgar *Șledun* în Mehedinți.—Păduri, tuferișe, adesea în mici masive sau sporadic (răsleț), pe dealurile montane în Dobrogea septentrională la Atmagea, Ciucarova, Slava, Ortachioi, Acpunar.

**Carpinus Betulus** L. spe. p. 1416 (Consp. p. 529).—Păduri, dum-

brave, în districtul Iași la Răpedea și Bârnova, în districtul Vaslui la Dobrovău și Cazacu; în Dobrogea pădurile dela Greci.

### SALICACEÆ Lindl.

**Salix fragilis** L. spe. p. 1443 (Consp. p. 530).—Adiție la numirile vulgare din Consp. : *Lozie*. *Mlaje* cum și la toate Sălciile cu ramurile lungi și mlădioase.

**S. viminalis** L. spe. p. 1448 (Consp. p. 532).—Adiție: vulgar *Străvaț*.

**S. rosmarinifolia** L. spe. p. 1438 (Consp. p. 532).—Asemenea.

**S. hastata** L. spe. p. 1443 (Consp. p. 532).—Văi subalpine quasi alpine. Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901); Negoiu.

**S. cinerea** L. spe. p. 1449 (Consp. p. 532).—Adiție: vulg. *Zaloaga*.

**S. silesiaca** Willd. spe. pl. vol. 4 p. 660 (Consp. p. 533).—Pe Lotru la Voineasa, Vidra; Buceci pe poalele Caraimanului (pl. indig. 1901); Ceahlău (pl. vasc. ceahl. p. 73).

**S. Caprea** L. spe. p. 1448 (Consp. p. 533).—Vulg. *Iov*. —Păduri pe dealurile submontane. Govora calea la măgura Mătușea-Floarea; Curtea-de-Argeș; Michăești distr. Muscel.

**S. reticulata** L. spe. p. 1446 (Consp. p. 533).—Regiunea alpină înaltă. Negoiu; Buceci la Omu (pl. indig. 1899 și 1901).

**S. retusa** L. spe. p. 1445 (Consp. p. 533).—Piscuri alpine. Negoiu (pl. indig. 1899 și în urmă anu 1907); Buceci la Omu (pl. indig. 1899) și pe Caraimanu (pl. indig. 1901); Ceahlău (pl. vasc. ceahl. p. 73).

**S. herbacea** L. spe. p. 1445 (Consp. p. 534).—Piscuri alpine. Pârângu pe Mândra; Negoiu; Buceci la Omu (pl. indig. 1901).

**Populus alba** L. spe. p. 1463 (Consp. p. 534).—Lunca Ialomiței pe la Urziceni; lunca Dunărei pe Borcea la Fetești.

**P. tremula** L. spe. p. 1464 (Consp. p. 534).—Păduri în regiunea dealurilor submontane. Govora; Curtea-de-Argeș; Michăești distr. Muscel.

### BETULACEÆ Bartl.

**Betula pubescens** Ehrh. Beitr. vol. 6 p. 98:—*β. carpatica* Sag. et Schn. fl. carp. centr. vol. 2 p. 464; Grec. consp. p. 535. **B. carpatica** W. et Kit. ap. Willd. spe. pl. vol. 4 p. 464. Păduri. La poalele Ceahlăului (pl. indig. 1899).

**Alnus glutinosa** Gært. fruct. vol. 2 tab. 90 (Consp. p. 536).—Prundișuri pe albia râurilor. Bușteni pe valea Jepilor (pl. indig. 1901).

**A. incana** Willd. spe. pl. vol. 4 p. 335 (Consp. p. 536).—Prundișuri pe albia râurilor, văi subalpine. Azuga, Bușteni (pl. indig. 1901).

**A. viridis** DC. fl. fr. vol. 3 p. 304 (Consp. p. 535).—Regiunea alpină. Parângul pe Mirul-Mare; Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901 și în urmă an. 1906 Marc. Br.).

## II. EMBRIOGENE MONOCOTILEDONAE.

### CLASA VII.

#### Monocotiledonae Periante.

##### ALISMACEÆ Lam.

**Alisma Plantago** L. spe. p. 486 et Auct. omn. (Consp. p. 541).—Bălți, smârcuri, mlăștini. Govora, Curtea-de-Argeș, Oești; Crivina, Tinoasa; Brăila, Măcin.

\* *b. stenophyllum*. — *A. Plantago Michalētii b. stenophyllum*. Aschers. et Græbn. synops. mitt. europ. fl. vol. 1 p. 383. *A. Plantago* L. β. *lanceolatum* Gren. Godr. fl. fr. vol. 3 p. 165; Rchb. icon. fl. germ. vol. 7 fig. 101, an *A. lanceolatum* Wither. bot. arr. brit. pl. ed. 3<sup>o</sup> vol. 2 p. 362 (1796)?—Adesea cu congenera sa. Este mai multă formă întâmplătoare de cât varietate proprie.

**Sagittaria Sagittæfolia** L. spe. 1410 (Consp. p. 541).—Bălți, lacuri, smârcuri. Căldărușani, Paserea, Cernica; Brăila, Vădeni; Galați (pl. indig. 1899); Măcin, Tulcea.

**Butomus umbellatus** L. spe. p. 532 (Consp. p. 541).—Bălți, lacuri, smârcuri, stuhării. Pe Colentina pe la Buftea, Chitila (pl. indig. 1901); Paserea, Căldărușani; Brăila, Vădeni; Măcin, Tulcea.

##### HYDROCHARIDACEÆ Lindl.

**Hydrocharis Morsus-ranæ** L. spe. p. 1466 (Consp. p. 542).—Plutitoare pe ape limpezi stagnante, heleșteuri, stuhării. Căldărușani, Paserea, Fundeni-Mărcuța, Cernica; Măcin, Tulcea.

Adiție dupe acesta (Consp. p. 542):

\* 2. **VALLISNERIA** L. gen. n<sup>o</sup> 1907. Mich gen. n<sup>o</sup> 10.

\* 1. **V. Spiral** L. spe. p. 1441; Koch syn. p. 770; Rchb. icon. fl. germ. vol. 7 tab. LX fig. 108—110; Gren. Godr. fl. fr. vol. 3 p. 303; Ledeb. fl. ross. vol. 4 p. 46; Lindem. fl. cherson. vol. p. 193 — 4 Iulie-Septemvrie. Immersă în ape limpezi stagnante. În lacul Snagovu (Z. Panțu

anal. acad. rom. 1906 ser. II tom. XXVIII n° 9 p. 311 și exic!). Citată și în Dobrogea în lacul Crapina distr. Tulcea de Macovei și Scrib. (Annales scientifiques de l'Université de Jassy tome III, 4° fasc. Janv. 1906).

## ORCHIDACEÆ Ach. Rich.

**Orchis Morio** L. spe. p. 1333 (Consp. p. 542).—Livezi, prunării, tuferișe. Pitești la Trivale (pl. indig. 1901); Câmpina (pl. indig. 1899); Bicz (pl. indig. 1900); Ceahlău la schitu Durău; Piatra-Neamțu.

**O. pallens** L. mant. p. 202 (Consp. p. 543).—Sol humifer, pe stânci cu tuferișe. Vârciorova în poeana de la gura Cerovățului, (pl. indig. 1900); Babadag, Bașchioi, Ciucarova.

**O. ustulata** L. spe. p. 1333 (Consp. p. 543).—Livezi, poeni. Predeal coastele dela Schit; Câmpina; Slănic, Târgu-Ocna (pl. indig. 1899); Burdujeni (pl. indig. 1899); Măcin, Greci.

**O. coriophora** L. spe. p. 1332 (Consp. p. 543).—Adiție: sinonimii *O. cunicina* Crantz stirp. austr.p. 498 (1769). *O. cassidea* M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 3 p. 600 (1819). *O. fragrans* Poll. elem. vol. 2 p. 155 (1811); Rchb. icon fl. germ. vol. 13 tab. 14.—Livezi, poeni, tuferișe. Pe la comuna Zlătărei în Vâlcea (pl. indig. 1901); Curtea-de-Argeș în livedea cimitirului; Mihăești în Muscel; Bușteni (pl. indig. 1899); Ceahlău (pl. indig. 1900); Piatra-Neamțu pe Cozla și pe la Țibucani; Măcin, Greci.

**O. Simia** Lam. fl. fr. vol. 3 p. 507 (Consp. p. 543).—Păduri, tuferișe. Nicolitel, Taița distr. Tulcea plasa Tulcea (pl. indig. 1900).

**O. militaris** L. spe. p. 1333 (Consp. p. 543).—Adiție: vulg. *Porranici* (Trans.).—Valea Bezdadului la Moroieni în Dâmbovița (pl. indig. 1900); pădurea Otopeni în Ilfov.

**O. purpurea** Huds. fl. angl. ed. 1 p. 334 (Consp. p. 544).—Păduri. Otopeni; Brănești păd. Pustnicu și Cernica.

**O. globosa** L. spe. p. 1332 (Consp. p. 544).—Livezi, poeni, în regiunea montană. Pe Lotru sus la Voineasa și Vidra; în Argeș pe Suru (pl. indig. 1899); Predeal, Bușteni (pl. indig. 1900) și Sinaia; Bicz (pl. indig. 1900) și la Schitu Durău.

**O. speciosa** Host. fl. austr. vol. 2 p. 527 (Consp. p. 544).—Livezi, poeni, în regiunea montană și submontană. Baea-de-Aramă (pl. indig. 1900); Buceci în Valea Ialomiței (pl. indig. 1899), Bușteni, Sinaia (pl. indig. 1900 și 1901); Ceahlău, Piatra-Neamțu pe Cozla.

**O. elegans** Heuff. in Flora an. 1835 vol. 1 p. 250; ejus. pl. banat. p. 166 (Consp. p. 544).—Locuri umede, locuri mlăștinoase. București pe cursul Colentinei pe la Fundeni-Mărcuța, Panteleimon; Cucuteni în distr. Dâmbovița (pl. indig. 1900).



**O. sambucina** L. spe. p. 1344; Rchb. icon, fl. germ. vol. 13 orchid. tab. 60 fig. 1 (Consp. p. 544) Livezi, poeni, în regiunea montană subalpină. Ceahlău (pl. indig. 1900).

**O. cordigera** Fries novit. mant. vol. 3 p. 130 (Consp. p. 545).— Adiție: sinonimii *O. cordiger banaticus* Asch. et Græbn. syn. mit. europ. vol. 3 p. 741. *O. cordigera d. foliosa* Klinge revis. orch. cordig. angust. p. 19, 27 (1893). *O. foliosa* Schur. enum. transs. p. 642 (1866).—Livezi, poeni subalpine. Predeal pe la Schit și în valea Râșnovei pe la gura Brădetului și pe Urzicar (pl. indig. 1900); Parângu pe Păcleș.

**O. maculata** L. spe p. 1335 (Consp. p. 545).—Livezi, poeni, în regiunea montană subalpină și alpestră. Bicaz (pl. indig. 1899) în parcul Cerbilor (pl. indig. 1900); Schitul Țibucani.

β. *macrostachys* Asch. et Græbn. syn. mitt. europ. vol. 3 p. 748. Sinon. **O. macrostachys** Ten. pl. rar. sicil. vol. 1 p. 7 (1817). **O. sacculifera** Brong. in Bory expéd. de Morée p. 259 (1832) tab. 30 fig. 1; Heuff. enum. banat. p. 167; Neilr. diagn. p. 117. *O. maculata* β. *saccigera* Rchb. icon. fl. germ. vol. 13 orchid. tab. 57; Boiss. fl. orient. vol. 5 p. 73; Grec. consp. p. 545. *O. macedonica* Griseb. reise. rumel. vol. 2 p. 302 (1840). *O. lancibracteata* C. Koch. in linn. vol. 22 ann. 1849 p. 284.—Livezi, poeni, în regiunea montană. După localitățile arătate în conspect, a se adăuna: pe Lotru la Voineasa, Vidra; în Argeș pe munții Lespezi și Paltina; Predeal; Buceci pe la Urlătoare (p. indig. 1901); Slănic; Piatra-Neamțu. pe Cernegura (pl. indig. 1900); Ceahlău.

**O. incarnata** L. fl. suec. ed. 2<sup>o</sup> p. 312 (Consp. p. 545).—Livezi, poeni pe lângă păduri. În Argeș pe muntele Lespezi; Bacău pe dealuri (pl. indig. 1901); Tarcău; Bicaz (pl. indig. 1899); Piatra-Neamțu pe Cernegura (pl. indig. 1900) și pe la Schitu Țibucani.

**Platanthera bifolia** Rich. mém. mus. d'hist. natur. vol. 4 p. 20 (Consp. p. 545).—Păduri montane și submontane. Râmnic (pl. indig. 1901); pe Prislopu în Argeș (pl. indig. 1899); Câmpina; Slănic pe muntele Pufu; Tarcău; Bicaz (pl. indig. 1900); Ceahlău pe la Schitu Durău.

**Cœloglossum viride** Hartm. scand. fl. p. 329 (Consp. p. 546).—Regiunea alpină quasi subalpină. Sinaia la Poeana-Stânci; Ceahlău [pl. vasc. ceahl. p. 76).

Adiție subț acesta :

\* β. *bracteatum* Richter pl. europ. vol. 1 p. 278 (1899). **Orchis bracteata** Willd. spe. vol. 4 p. 34 (1805). *Habenaria bracteata* R. Br. in Ait. hort. kew. vol. 5 p. 192 (1813). *Platanthera viridis* var. *bracteata* Rchb. icon. fl. germ. vol. 13 orchid. tab. 83 fig. 1.—Păsciuni alpine quasi subalpine. Slănic pe muntele Șandru.

**Gymnadenia conopsea** R. Br. in Ait. hort. kew. vol. 5 p. 191

(Consp. p. 546).—Livezi montane. Predeal; Bicăz (pl. indig. 1899 și 1900); Ceahlău (pl. indig. 1900 și 1901).

*β. leucantha* Schur enum. transs. p. 644 (Consp. l. c.).—Livezi. Predeal; Câmpulung pl. indig. 1899); Tarcău.

**G. odoratissima** Rich. mém. mus. d'hist. natur. vol. 4 p. 57 (Consp. p. 546).—Livezi montane. Pe muntele Prislop în Argeș (pl. indig. 1899); Ceahlău (pl. indig. 1900)?

**G. albida** Rich. mém. mus. d'hist. natur. vol. 4 p. 35 (Consp. p. 546).—Livezi subalpine quasi alpine. Parângu pe Mirul-Mare; poalele Negoiului la Stâna-Podeanului; Predeal pe muntele Urzicaru (pl. indig. 1900)

**Hermium monorehis** R. Br. in Ait. hort. kew. vol. 5 p. 191 (Consp. p. 546).—Livezi alpine, subalpine. Ceahlău (pl. indig. 1900).

**H. alpinum** Lindl. bot. registr. vol. 18 tab. 1499 [Consp. p. 547].—Regiunea alpină pe stânci cu iarbă. Buceci în Valea-Albă pe Costila la 1800 m. (pl. indig. 1900).

Adiție după acesta (Consp. p. 547):

5<sup>b</sup>. OPHRYS L. gen. n<sup>o</sup> 101.

\* **1. O cornuta** Stev. in mém. soc. natur. de mosc. tom. II (1809) p. 175 : *forma banatica* Panțu și Procop. Procopovici în public. societ. naturalistilor din România No. 2 (1891) cu tabulă! *O. Scolopax d. cornuta* Rchb. icon. fl. germ. vol. 13 (1851) tab. 108 fig. I plantă è Banatù. *O. oestrifera* (M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 2 p. 369) *var. c. cornuta* Boiss. fl. orient vol. 5 p. 79 (1884); K. Richter pl. europ. vol. 1 p. 264. *O. Scolopax* Host. fl. austr. vol. 2 p. 541 (1831)-non Cavan. icon. vol. 2 p. 46 (1793). 4 Mai. Junie. Vulg. *Albină*. Locuri cu iarbă pe lângă păduri pe dealuri. La Scăeni în Prahova, în consorțiu cu *Himantoglossum hircinum* Spreng. (Elena Stămătescu) și la Valea Călugărească (Marcel Brânză).

**Nigritella nigra** Rchb. fl. germ. excurs. p. 121 (Consp. p. 547). — Păsciuni în regiunea alpină. Buceci la Omu (pl. indig. 1899) și pe Caraimanu (pl. indig. 1901); munt. Mocirliu plaiul Cloșanilor (pl. indig. 1900).

**Anacamptis pyramidalis** Rich. mém. mus. d'hist. natur. vol. 4 p. 47 (Consp. p. 247).—Livezi, poeni, în regiunea montană și a dealurilor mari. Căineni de Argeș (pl. indig. 1899); Sinaia pe la Poeana Stânei (pl. indig. 1899); Dealu-Mare la Valea-Călugărească; munții Vrancei pe la Schitul Buluc (pl. indig. 1900); Panciu; Bicăz pe Chica-Baiului (pl. indig. 1900).

**Himantoglossum hircinum** Spreng. syst. vol. 3 p. 694 (Consp. p. 547).—Pe lângă păduri, rășișuri, poeni. In o live de pruni la Monăstirea Cernica (Grec. enum. pl. român p. 56 an. 1880); pădurea Cernica (Z. Panțu); în pădure la Speteni distr. Ialomița (Gh. Grinț).

**Cephalanthera pallens** Rich. de orchid. annot. p. 38 (Consp. p. 548). — Păduri. Monăstirea Bunea în Dâmbovița (pl. indig. 1900); Petricani distr. Neamțu.

**C. ensifolia** Rich. l. c. p. 38 (Consp. p. 548). — Păduri, tuferișe. Predeal pe muntele Urzicaru (pl. indig. 1900); pădurea Otopeni; Slănic; Piatra-Neamțu pe Cozla; pădurea Dobrovățu distr. Vaslui; pădurea Bărnovei distr. Iași; pădurea Pomârla distr. Dorohoi.

**C. rubra** Rich. l. c. p. 38 (Consp. p. 548). — Păduri, răișuri, poeni. Slănic; Piatra-Neamțu pe Cernegura (pl. indig. 1900).

**Epipactis latifolia** All. fl. pedem. vol. 2 p. 151 (Consp. p. 548). — Păduri, locuri umbroase umede. Broșteni distr. Rîmniciu-Sărat (pl. indig. 1900); Slănic; Piatra-Neamțu spre Biserici (pl. indig. 1901), Petricani și Ceahlău (Grinț. exsic.)

**E. rubiginosa** Koch syn. ed. 2<sup>o</sup> p. 801 (Consp. p. 549). — Păduri, locuri umbroase umede. Slănic.

**E. palustris** Crantz stirp. austr. p. 462 (Consp. p. 549). — Locuri umede mlăștinoase sfagnice. Slănic; Bieaz (pl. indig. 1899).

**Listera ovata** R. Br. in Ait. hort. hew. vol. 5 p. 201 (Consp. p. 549). — Păduri umbroase, dumbrave. Pădurea Otopeni în Ilfov; pe dealurile mari la Râmnic; Curtea-de-Argeș; Predeal; Slănic pe muntele Pufu; Ceahlău pe la Schitul Durău, Piatra pe Cernegura (pl. indig. 1900).

**Neottia Nidus-avis** Rich. orchid. annot. p. 29 (Consp. p. 549). — Păduri, dumbrave, pe la rădăcini bătrâne. Lerești distr. Muscel (pl. indig. 1899); Predeal pe la Schit și pe la poalele Urzicarului (pl. indig. 1900); Buceci la Urlătoarele (pl. indig. 1901); Bicaz (pl. indig. 1899); Slănic; Piatra-Neamțu pe Cozla; Măcin, Greci.

**Epipogium aphyllum** Swartz summa veget. scand. p. 32 (Consp. p. 550). — Păduri montane, pe la tulpina bătrânilor Molifți. Sinaia pe Piscu-Cânelui, pe Piatra-Arsă (pl. indig. 1899), Valea Jepilor la Bușteni. (pl. indig. 1901); Slănic pe muntele Dobrului; Ceahlău (pl. vasc. p. 77).

**Corallorrhiza innata** R. Br. in. Ait. hort. kew. vol. 5 p. 208 (Consp. p. 550). — Adiție vulgar *Burzoși*.

**Cypripedium Calceolus** L. spe. p. 1346 (Consp. p. 550). — Adiție vulgar *Blabornică. Papucu-Doamnei*. — Păduri. Piatra-Neamțu pe Cernegura; pădurea Dobrovățului distr. Vaslui, sporadic.

## IRIDACEÆ Lindl.

**Crocus reticulatus** M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 1 p. 28 (Consp. p. 550). — Locuri ierboase aprice. Băilești distr. Dolji (pl. indig. 1899); Focșani la pădurea Crângu (pl. indig. 1900); Constanța.

Adiție dupe aceasta în § 1<sup>o</sup> Reticulați.

\* 1<sup>b</sup>. **C. Pallasii** M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 3 p. 35 (1819); Ledeb. fl. ross. vol. 4 p. 109; Rchb. icon. fl. germ. vol. 9 fig. 796 et 797; Brânză fl. dobrog. p. 410. **C. autumnalis** M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 1 p. 27 (1808) non Broter. **C. campestris** Herb. botan. registr. vol. 29 misc. 30 (1843). **C. hybernus** Friv. in Griseb. spicil. fl. rumel. vol. 2 p. 374 (1844). **C. sativus** β. **Pallasii** Maw. gard. chron. N. S. XVI (1881), Boiss. fl. orient. vol. 5 p. 100. — 4 Septemvire, Octomvire. — Stepele meridionale ale Dobrogei: Constanța, Murfatlar.

Parțial reticulat: tunicele bulbului paralelo-fibroase în partea inferioară, reticulato-anastomosate în cea superioară. Specie automnală.

**C. Heuffelianus** Herb. in journ. of hort. societ. vol. 2 p. 273 (Consp. p. 551). — Livezi. păsciuni, în regiunea montană și submontană. Pucioasa distr. Dâmbovița; dealu Podarilor aproape de Craiova (pl. indig. 1899); Horezu în Vâlcea (pl. indig. 1901); Curtea-de-Argeș pe valea Argeșului sus la Padina în poalele muntelui Glodu-Mare; Sinaia, Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901); Bacău pe dealurile vecine la Ocoale (pl. indig. 1899); în Dorohoi pe dealuri la Șendriceni (pl. indig. 1901).

**C. banaticus** Gay in bullet. Fer. vol. 25 p. 220 (Consp. p. 551). — Livezi, poeni, rășiuri. Râmnic pe dealurile mari vecine (pl. indig. 1901); Sinaia pe Piscu-Cânelui (pl. indig. 1899).

**C. moesiaceus** Ker-Gawler in botan. magaz. ad tab. 652 et in anal. of botan. vol. 1 p. 222 (Consp. p. 551). — Tuferișe, rășiuri, poeni, pe la pădurea Otopeni și la Șindrilita în Ilfov.

Adiție, dupe acesta (Consp. p. 551);

\* 5. **C. chrysanthus** Herb. in journ. of hort. societ. ann. 1847 vol. 2 p. 385; Boiss. fl. orient. vol. 5 p. 111. **C. annulatus** var. **chrysanthus** Herb. in bot. magaz. tab. 3862 (1841). **C. sulphureus** Griseb. spicil. fl. rumel. vol. 2 p. 373 (1841)-non Ker-Gawl. in bot. magaz. t. 652 (1803). — 4 Martie. Aprilie. Locuri ierboase, rășiuri, crânguri, pe dealurile muntoase la Cataloi aproape de Tulcea.

Aduce și se poate confunda cu precedentul de care diferă cuosebire prin tunicele bulbilor: orizontalicește circular-curmăte în partea lor de jos, — nu întregi; spata a două foi, uni-trifloră, — nu monofilă; stigmele spatulate portocalii, — nu clavate galbene.

**Gladiolus imbricatus** L. spe. p. 52 (Consp. p. 551). — Livezi, tuferișe, la locuri umede. Curtea-de-Argeș la Valea-Calului; Câmpu-Lung pe la Flămânda; Predeal; Slănic; Bicăz (pl. indig. 1899).

**Iris ruthenica** Dryand in Ait. hort. hew. ed. 2<sup>o</sup> vol. 1 p. 117 (Consp. p. 552). — Livezi montane subalpine și alpine. In Argeș pe muntele Paltina; Buceci în Valea-Cerbului (pl. indig. 1899) și pe Caraimanu (pl. indig. 1901).

**I. Sintenisii** Janka adat. p. 173 ((1876); ejus termész. füzet. vol. 1 part. IV ann. 1877 p. 3 edit. separata descriptum; Boiss. fl. orient. vol. 5 p. 128; Velen. fl. bulg. p. 532; Grec. consp. p. 552. *I. graminea* Griseb. spicil. fl. rumel. vol. 2 p. 370 (1844)-non Lin. *I. Pseudo-Cyperus* Schur enum. transs. p. 657 (1866), Kanitz pl. roman. suppl. p. 247; Borb. florist. közlemén. XV köttet 1878 p. 359; Brânză fl. dobrog. p. 408.— 4 Mai. Iunie. Pe lângă localitățile enumerate în conspect, a se adăuna: în livezi la Călugăreni distr. Botoșani (pl. indig. 1900); pe la pădure la Zorleni și la Crângu lângă Bârlad (pl. indig. 1901); Măcin spre Ghecet (pl. indig. 1901).

În cea mai multă asemănare cu *I. graminea* L. în toate privirile; dar deosebirea patentă și principală, dupe constatările noastre, precum am înscris-o în Conspect și de care autorii supracitați nu fac mențiune, constă în ovarul său scurt-stipitat, având tubul periantului foarte lung,— iar nu cu ovarul lung-stipitat și tubul periantului foarte scurt, aproape nul cum la *I. graminea* L. Cele lalte diferențe așternute de autori sunt mai mult subtilități de cât niște caractere patente.

**I. graminea** L. spe. p. 58 (Consp. p. 552).— Livezi, crânguri, tuferișe. Bicaz (pl. indig. 1899); pe la pădurea Rediu și la Curtești distr. Botoșani (pl. indig. 1900, 1901).

Adiție, după aceasta (Consp. p. 552):

\* **3<sup>b</sup>. I. sibirica.** L. spe. p. 57; Ledeb. fl. ross. vol. 4 p. 96 var.  $\alpha$ ; Koch syn. ed. 2<sup>o</sup> p. 810; Rchb. icon. fl. germ. vol. 9 fig. 768; Boiss. fl. orient. vol. 5 p. 126. *I. pratensis* Lam. dict. encycl. vol. 3 p. 300 (1789). *I. angustifolia* Gilib. exerc. phytol. vol. 2 p. 498 (1792).—Locuri joase subsalse. Bârlad (pl. indig. 1901); la Petica în Suceava (pl. indig. 1899).

Odinioară aflat și citat de Csihak și Szabo, cu necertitudine menționat în Prodromul D-rului D. Brânză, prezența sa la noi se confirmă.

**I. pumila.** L. spe. p. 56 (Consp. p. 553).

Adiție:

\*  **$\beta$ . lutea** Ker-Gawler in bot. magaz. tab. 1209 (1809); Rchb. icon. fl. germ. vol. 9 fig. 753. *I. transsilvanica* Schur æst. bot. zeit. 1860 p. 353. *I. Clusiana a. transsilvanica* Schur enum. transs. p. 655 (1866)—*I. pumila* *II. transsilvanica* Asch. et Graeb. syn. mitt. europ. vol. 3 p. 471 (1906).—Locuri ierboase aprice, la Constanța spre Tuzla și spre Murfatlar; Greci, Hagighiol.

\*  **$\gamma$ . minor**, purpureo-violacea, Rchb. deutsch. fl. vol. 9 p. 4 (1847). *I. Clusiana* Tausch in Flora ann. 1829. I erg. bl. p. 49 sec. Rchb. fl. germ. excurs. p. 80 n<sup>o</sup>. 556; ejus icon. fl. germ. vol. 9 fig. 755 (1847); Schur enum. transs. p. 655. *I. transsilvanica* var. *atroviolacea* Schur loco cit. *I. pumila* Curt. in bot. magaz. tab. 9.—Stepele meridionale ale Dobrogei pe la Mangalia; Techirghiol-Movilă; Greci.

**I. variegata.** L. spe. p. 56 (Consp. p. 553). — Hagieni distr. Iale-mița, în plantația de Salcâmi (P. Enculescu)

### AMARYLLIDACEÆ Lindl.

**Narcissus radiiflorus.** Salisb. prodr. p. 225 (Consp. p. 554). — Adiție: vulgar *Fulie*.

**Leucojum vernum** L. spe. p. 414 (Consp. p. 554). — Adiție: vulgar *Peleșel*. — Pădurea Nanov lângă Alexandria (pl. indig. 1899).

**Galanthus nivalis** L. spe. 413 (Consp. p. 555). Adiție: vulgar *Ghiligei* (Transs). — Curtea-de-Argeș pe dealurile vecine, Cheea-Argeșului sus la Padina în poalele munt. Glodu-Mare; Câmpina (pl. indig. 1899).

Adiție, după acesta (Consp. p. 555):

\* 2. **G. plicatus** M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 3 p. 255 (1819); Roem. et Sch. syst. veget. vol. 7 p. 728; Ledeb. fl. ross. vol. 4 p. 114; Boiss. fl. orient. vol. 5 p. 145. — 4 Martie și pe la începutul Aprilie. Crânguri, rărișuri. Brăila, Măcin, Greci (pl. indig. 1901).

### DIOSCOREACEÆ Lindl.

**Tamus communis** L. spe. p. 1458 (Consp. p. 555). — Adiție: vulgar *Brâe* (în Vlașca) pe la Zădărici, Clejani; Curtea-de-Argeș în păduri pe dealurile Hodiei și ale Rugetului; Brănești pădurea Pustnicu.

### ASPARAGACEÆ Ach. Rich.

**Asparagus tenuifolius** Lam. encycl. méth. vol. 1 p. 204 (Consp. p. 555). — Păduri, dumbrave. Curtea-de-Argeș; Dealu-Mare; Otopeni, Brănești pād. Pustnicu și Cernica; Cotorca, Dudeasca la pădurea Arionoaea în Ialomița; Măcin, Greci în pădurea Teilor și Taița.

**A. officinalis** L. fl. suec. ed. 2<sup>o</sup> p. 108 (1755); ejus spec. pl. ed. 2<sup>o</sup> p. 448 var.  $\gamma$ . *altis* (exclus var.  $\alpha$  et  $\beta$ ). *A. officinalis campestris* Grec. enum. pl. român. p. 57 (1880) solum nomen. — Consp. p. 555. — Livezi, crânguri, tuferișe. Călimănești, Cozia; Coșereni, Urziceni în Ialomița; poalele Ceahlăului pe la Durău; Agiud.

**A. pseudoscaber** Grec. consp. p. 556. — Adiție: sinonimii *A. scaber* Blocki în Baenitz herb. europ. ann. 1891 prospect. et exsicc.! — non Brign. *A. officinalis b. pseudoscaber* Aschers. et Græbn. syn. mitt. europ. vol. 3 p. 295 (1905). În Delta-Dunărei pe la Satu-Nou și Letea aproape de Sulina.

Adiție, dupe acesta (Consp. p. 556):

\* 3<sup>b</sup>. **A. scaber** Brign. fasc. pl. ferojul. p. 22 (1810); Roem. et

Schult. syst. veget. vol. 7 p. 318; Koch syn. p. 813; Vis. fl. dalm. vol. 1 p. 161; Gren. Godr. fl. fr. vol. 3 p. 231; Ledeb. fl. ross. vol. 4 p. 198; Boiss. fl. orient. vol. 5 p. 336. *A. officinalis*  $\alpha$ . *maritimus* L. spe. ed. 2<sup>o</sup> p. 448. *A. amarus* DC. catal. hort. monspel. p. 81 (1813). *A. marinus* Rchb. fl. germ. excurs. p. 118 (1830); ejus icon. fl. germ. vol. 10 tab. DXX fig. 971-non Pall.—4 Iunie. Iulie. Prin mărăcinișuri și burueni pe malul mării subț vii la Constanța (pl. indig. 1900 p. 42).

**A. verticillatus** L. spe. p. 450 (Consp. p. 556).—Locuri aspre aprice inculte. Techirghiol-Movilă pe malurile mării spre barcagii și pe malurile lacului Techirghiol în fața stabilimentului balnear; Babadag, Niculițel, Telița.

Adiție dupe acesta:

\* **5. A. trichophyllus** Bunge enum. pl. chin. boreale n<sup>o</sup> 369 (1831); Ledeb. fl. ross. vol. 4 p. 197; Boiss. fl. orient. vol. 5 p. 334. —4 Iunie. Iulie.—Locuri joase umede salsuginoase. Caracoiu spre Gargaliș (pl. indig. 1900 p. 42).

**Streptopus amplexifolius** DC. fl. fr. vol. 3 p. 174 (Consp. p. 556).—Văi montane umede umbroase. Pe Lotru sus, la Voineasa în valea Voinești și la Vidra în gura Pravățului.

**Majanthemum bifolium** DC. in Rédout. liliac. tab. 216 (Consp. p. 557). Păduri, dumbrave. Câmpulung; pădurea Vânătorilor în Putna (pl. indig. 1900); Bicăz pe Bâta-Vacei (pl. indig. 1899 și 1900); în Neamțu la Petricani; Fălticeni (pl. indig. 1901).

\* *var. latifolia*.—Lunca Prahovei în pădurea Tinoasa.

Foile cu mult mai largi în lățimea lor de cum la forma tipică, lungimea lor tot ca cea normală.

**Convallaria majalis** L. spe. p. 441 (Consp. p. 557).—Adiție: vulgar *Mărgărit*.—Pădurea Tinoasa pe Prahova; pădurea Otopeni; Odobești în pădurea Bobu distr. Putna (pl. indig. 1900).

**Polygonatum officinale** All. fl. pedem. vol. 1 p. 131 (Consp. 557).—Păduri. La poalele Ceahlăului pe la Durău; Dobrogea septentrională la Greci dealu Teilor, Taița, Țiganca.

**P. multiflorum** All. fl. pedem. vol. 1 p. 131 (Consp. p. 558).—Păduri, dumbrave. Govora; Curtea-de-Argeș; Otopeni; Bicăz (pl. indig. 1900); Ceahlău.

**P. latifolium** Desf. annales du muss. vol. 9 p. 50 (Consp. p. 558).—Prin păduri, dumbrave. Govora; Curtea-de-Argeș; Căldărușani, Paserea Cernica.

**P. verticillatum** All. fl. pedem. vol. 1 p. 131 (Consp. p. 558).—Păduri, tuferișe, în regiunea montană. Pe Lotru sus, la Voineasa și Vidra; în Argeș pe muntele Paltina și în valea Budei; Ceahlău pe la Schitul Durău; Slănic.

**Ruscus aculeatus** L. spe. p. 1474 (Consp. p. 558).—Adiție: vulgar *Merișor-glimpos* (Mehedinți).

**Paris quadrifolia** L. spe. p. 527 (Consp. p. 559).—Adiție: vulgar *Boaba-vulpei*. *Poala-vulpei*.—Păduri, dumbrave. Govora; Curtea-de-Argeș; Câmpina (pl. indig. 1899); Buceci în Valea Jepilor (pl. indig. 1901); Ceahlău pe la Schitul Durău (pl. indig. 1900).

### LILIACEÆ DC.

**Tulipa silvestris** L. spe. p. 438 (Consp. p. 559).—Tuferișe. Iași pe la pădurea Rediului (pl. indig. 1899).

**T. Biebersteiniana** Rœm. et Sch. syst. veget. vol. 7 p. 382 (Consp. p. 559).—Tuferișe, dumbrave. În Romanați la pădurea Romula (Reșca) lângă Caracăl; vulgar *Laptele-păsărei* (pl. indig. 1900).

**Fritillaria tenella** M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 1 p. 269 (Consp. p. 559).—Păduri, dumbrave, rărișuri. Lângă Caracăl la pădurea Romula (pl. indig. 1900): vulgar *Lalea-pestriță*; Alexandria la pădurea Nanov (pl. indig. 1899).

**Lilium Martagon** L. spe. p. 435 (Consp. p. 560).—Păduri, dumbrave, tuferișe. Curtea-de-Argeș dealurile Hodiei și la Valea-Calului; Câmpina; Dealu-Mare; Otopeni, Brănești.

**Lloydia serotina** Rchb. fl. germ. excurs. p. 102 (Consp. p. 560).—În regiunea alpină. În Argeș pe Suru (pl. indig. 1899); Buceci la Obârșia-Ialomitei (pl. indig. 1899) și pe Caraimanu (pl. indig. 1901); Ceahlău la Lespezi.

**Erythronium Dens-canis** L. spe. p. 437 (Consp. p. 560).—Adiție: vulgar *Măseoa-Ciutei*. Păduri, dumbrave, tuferișe. Caracăl la pădurea Romula (pl. indig. 1900); Pitești la Trivale (pl. indig. 1901); pădurea la Varnița în Putna.

**Anthericum ramosum** L. spe. p. 445 (Consp. p. 561). Livezi, crânguri. Brănești spre Pasărea; Slănic.

Adiție după genul **Anthericum** L. (Consp. p. 561):

\* 6<sup>b</sup>. **ASPHODELINE** Rchb. fl. germ. excurs. p. 116.

\* 1. **A. lutea** Rchb. fl. germ. excurs. p. 116 (1830); ejus icon. fl. germ. vol. liliac. fig. 1121; Ledeb. fl. ross. vol. 4 p. 193; Boiss. fl. orient. vol. 5 p. 316; Halácsy consp. fl. græc. vol. 3 p. 216. *Asphodelus luteus* L. spe. p. 443. 4 Maiu. Iunie. Tuferișe pe coastele aprice la Tepé spre Mălcoci distr. Tulcea (*Asphodelus luteus* Grec. pl. indig. an. 1900 p. 43).

**Ornithogalum Boucheanum** Grec. consp. p. 561. *Myogalum Boucheanum* Kunth enum. vol. 4 p. 348 (1841). Livezi, tuferișe, ogoară, sol



fertill. Hanu-Doctorului în Dolji (pl. indig. 1900); Constanța pe la Murfatlar și pe la Bostănărie.

**O. tenuifolium** Guss. prodr. fl. sicul. vol. 1 p. 413 (Consp. p. 562).—Crânguri, tuferișe, sol fertil. Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901); Brănești; pădurea Comana (pl. indig. 1900); Brăila pe la Monument.

**O. refractum** Kit. in Willd. enum. hort. berol. suppl. p. 18 (Consp. p. 562).—Crângulețe, ogoare, sol fertil. Ulmeni livezile despre Călmățui în Teleorman (pl. indig. 1899); Coadă-Ghiolului lângă Ostrov în Dobrogea (pl. indig. 1901); Constanța (pl. indig. 1899).

**Gagea stenopetala** Fries mant. vol. 3 p. 23 (Consp. p. 563).—Ogoare, locuri de cultură, tuferișe. Pe la pădure la Otopeni și Andronache; Buzeu la Crângu (pl. indig. 1899); Piatra-Neamțu; Iași la Copou.

*β. pratensis* Koch syn. p. 823 (Consp. l. c.).—Brănești.

**G. arvensis** Rœm. et Sch. syst. veget. vol. 7 p. 547 (Consp. p. 564).—Crânguri, rărișuri, tărâm humifer. Caracăl și Alexandria (pl. indig. 1899); Constanța, Murfatlar.

**G. lutea** Ker-Gawler bot. magaz. tab. 1200 (Consp. p. 565).—Adiție sinonimu *G. transsilvanica* Schur enum. transs. p. 667 (1866).—Păduri, dumbrave. Sinaia pe la S-ta Ana; Dealu-Mare la Valea Călugărească; Otopeni; Focșani la pădurea Crângu (pl. indig. 1900).

**Scilla bifolia** L. spe. p. 443 (Consp. p. 565). Păduri, dumbrave, crânguri. Curtea-de-Argeș; Caracăl la pădurea Romula (pl. indig. 1900); Bârlad la pădurea Crângu.

*β. nivalis* Baker in journ. linn. soc. vol. 13 p. 239 (1873); Boiss. fl. orient. vol. 5 p. 227. **S. nivalis** Boiss. diagn. ser. 1<sup>o</sup> fasc. 5 p. 63 (1844) pro specie. *S. praecox* Schott. bot. zeit. vol. 9 p. 283 (1851)-non Willd. spe. pl. vol. 2 p. 128 (1799). *S. alpina* Schur in verh. siebenb. ver. vol. 3 p. 90 (1852). *S. bifolia β. gracillima* Grec. consp. p. 565 (1898).—In Mai. Buceci pe Caraimanu la 1600 m. alt. pe lângă zăpadă (pl. indig. 1901 p. 25).

**S. autumnalis** L. spe. p. 443 (Consp. p. 565).—Locuri joase. Alexandria pe la pădurea orașului (pl. indig. 1900).

**Nectaroscordum bulgaricum** Janka pl. nov. turcic. brev. fasc. 2 p. 7 (Consp. p. 566).—Păduri, dumbrave, sol humifer. Monăstirea Paserea în pădurea Pustnicu.

**Allium ursinum** L. spe. p. 431 (Consp. p. 566).—Păduri, dumbrave. Căldărușani, Paserea; Focșani în pădurea Crângu (pl. indig. 1900); Greci în pădurea Taița.

**A. atropurpureum** W. et Kit. pl. rar. hung. vol. 1 tab. 17 (Consp. p. 566).—Câmpuri, locuri fertile, ogoare. Cioroiu în Romanați (pl. indig. 1901); Herestrău, Băneasa, dar aci din întâmplare sau incidental și abia un fir aflat până acum (pl. indig. 1900).

**A. Schœnoprasum** L. spe. p. 432 (Consp. p. 567),—Vulgar *Aiuș*. Bulbii acestuia în cultură se numesc *arpagici*; cel selbatic în Moldova se numește *Chișărău*. Regiunea alpină pe Ceahlău (pl. indig. 1899 și 1900).

A se schimbă numirea de *A. acutangulum* Schrad. (Consp. p. 567) astfel :

**A. angulosum** L. spe. p. 430.—Synon. *A. angulosum* β. *pratense* Lam. et DC fl. fr. vol. 3 p. 222 (1805); Mert. et Koch deutsch. fl. vol. 2 p. 521. *A. angulosum* β. *majus* Trevir. monogr. all. p. 10 (1822). *A. danubiale* Spreng. mant. vol. 1 p. 38 (1807); Rœm. et Sch. syst. veget. vol. 7 p. 1077. *A. acutangulum* Schrad. ind. semin. hort. gœtting. ann. 1808 ; Koch. syn. p. 828 ; Rchb. icon. fl. germ. vol. 10 fig. 1095; Boiss. fl. orient. vol. 5 p. 249; Schlechtd. Langeth. deutsch. fl. vol. 3 fig. 248; Grec. consp. p. 567. — 4 Iunie-August. — La localitățile indicate, adiție: Iași la Copou pe la grădina Pester (pl. indig. 1901)-și pe dealuri pe la Bârnova (pl. indig. 1899).

**A. montanum** Schmidt. fl. bohem. cent. 4<sup>o</sup> n<sup>o</sup>. 48 (1794); Rchb. icon. fl. germ. vol. 10 fig. 1094 ; Grec. consp. p. 567. *A. angulosum* α. *petraeum* Lam. et DC. fl. fr. vol. 3 p. 222 (1805). *A. angulosum* α. *minus* Trevir. monogr. all. p. 9 (1822). *A. acutangulum* γ. *calcareum* Mert. et Koch dutsch. fl. p. 521 (1826). *A. fallax* Rœm. et Sch. syst. veget. vol. 7 p. 1072 (1829); Koch. syn. p. 828 ; Schlechtd. Langeth. deutsch. fl. vol. 3 fig. 247 ; Boiss. fl. orient. vol. 5 p. 248-non Don monogr. p. 36. *A. transsilvanicum* Lerchenf. ap. Schur verh. siebenb. ver. vol. 4 (1853) p. 94. *A. leptophyllum* Schur en. transs. p. 674 (1866).—Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901); Câmpulung pe Piatra-Nămăeștiului.

**A. ammophilum** Heuff. in Flora ann. 1835 vol. I p. 241 (Consp. p. 567).—Adiție la sinonomie: *A. senescens* Baumg. enum. transs. vol. 1 p. 290 (1816)-non L. *A. angulosum* δ. *flavescens* Regel all. adh. cogn. monogr. p. 145 (1875)-sed non *A. flavescens* Bess. — *A. angulosum* B) *ammophilum* Aschers. et Græbn. syn. mitt. europ. vol. 3 p. 123 (1905).—Adiție : vulgar *Aișor*. — Pe loess năsipos sau humifer. În Tutova la stația Roșiești pe la pădure.

Numirea capitală de *A. ochroleucum* W. et Kit. (Consp. p. 568) a se corecta astfel :

**A. xanthicum** Griseb. et Schenk iter hung. in Wieg. arch. ann. 1852 p. 358 ; Schur enum. transs. p. 672. *A. ochroleucum* Rchb. icon. fl. germ. vol. 10 fig. 1090-non W. et Kit. pl. rar. hung. vol. 2 tab. 186 (1804). *A. Steveni* var. δ. et ε. Ledeb. fl. ross. vol. 4 p. 177 (1853). *A. globosum* B) *xanthicum* Aschers. et Græbn. syn. mitt. europ. vol. 3 p. 151 (1905).—Buceci pe Caraimanu (*A. ochroleucum* Grec. pl. indig. 1901 p. 25) ; Parângu pe Mirul-Mare.

Numirea capitală de *A. saxatile* M. Bieb. (Consp. p. 568) se va schimba astfel :

**A. globosum** Réd. lilia. vol. 3 tab. 179 (1807); M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 1 p. 262; Regel all. adh. cogn. monogr. p. 197; Rchb. icon. fl. germ. vol. 10 fig. 1088: caul rotunzior a 2—3 foi în tierțul inferior, florile rubicunde. *A. saxatile* M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 1 p. 264 (1808): caul scapiform nud sau aproape nud, florile alburii cam rozeaoare; Rchb. icon. fl. germ. vol. 10 fig. 1087. *A. Stevenii* Willd.  $\alpha$ .  $\gamma$ . ap. Ledeb. fl. ross. vol. 4 p. 176, 177 (1853).— 4 Iunie. Iulie. Stânci, locuri ierboase, subsol calcar. Pe muntele Consulu la Alibeichioi (*A. saxatile* Grec. consp. p. 568); Greci pe Țuțuiatu și Pricopan; Murfatlar pe coaste.

Diferențele de caul nud sau bi-trifil cum și de culoare mai mult sau mai puțin roșie a florilor sunt fără valoare specifică. Intre acesta și cel precedent diferențele sunt iarăși slabe. Foile lineare, subulate, cilindrice dar canaliculate, florile roșii sau rubicunde la acesta; foile obtuse, ceva mai plane și mai lăticele, florile ochroleuce și stația alpină la cel precedent: eacă totul, pe când fondul de caractere este același.

**A. flavum** L. spe. p. 428 (Consp. p. 568).—Stânci, locuri pietroase. Măcin, Greci pe munții Pricopanului.

Adiție dupe acesta, dar în gruparea: †† staminele incluse (Consp. p. 568):

\* **11<sup>b</sup>. A. moschatum** L. spe. p. 427; Koch syn. p. 828; Rchb. icon. fl. germ. vol. 10 fig. 1091; Boiss. fl. orient. vol. 5 p. 265. *A. capillare* Cavan. icon. et descript. vol. 3 tab. 206 fig. 1 (1794). *A. setaceum* W. et Kit. pl. rar. hung. vol. 1 tab. 68 (1802).— 4 Iulie. August.—Dealuri pietroase, locuri ierboase subsol calcar. Murfatlar pe coaste, a rar; muntele Cerna.

**A. paniculatum** L. spe. p. 428 (Consp. p. 568).—Tuferișe, locuri uscate. Roșiești distr. Tutova; Măcin pe la poalele Pricopanului; tuferișe pe la Sarichioi lângă Tulcea (pl. indig. 1900).

**A. fuscum** W. et Kit. pl. rar. hung. vol. 3 tab. 241 (1812).—Păduri, tuferișe, locuri pietroase. Valea Oltului spre Gura-Lotrului; Căineni de Argeș (pl. indig. 1899); Cheea-Argeșului; Nicorești pe dealuri (pl. indig. 1901); Greci (pl. indig. 1899).

**A. oleraceum** L. spe. p. 429 (Consp. p. 569).—Pe dealuri la Adjud.

**A. Scorodoprasum** L. spe. p. 425 exclus. var.  $\beta$ . (Consp. p. 569).—Brănești, Pasărea; Bârlad la Crângu.

Adiție dupe *A. Scorodoprasum* L. (Consp. p. 569):

\* **15<sup>b</sup>. A. vineale** L. spe. p. 428; Koch syn. p. 831; Rchb. icon. fl. germ. vol. 10 fig. 1075; Gren. Godr. fl. fr. vol. 3 p. 197; Boiss. fl. orient. vol. 5 p. 235. *A. laxiflorum* Tausch in flora ann. 1829 erg. bl. p. 46.—

4 Iunie. Iulie. Ogoare, locuri de cultură, pământ poros. Bufta pe la pădure (N. Jacobescu exsic.!).

**A. Ampeloprasum** L. spe. p. 423 (Consp. p. 569).—Tot un fel de Praz; cel cultivat se numește *Ceapă-de-vară*.

**A. atrovioleaceum** Boiss. diagn. pl. orient. ser. 1<sup>o</sup> fasc. 7 [p. 112 (Consp. p. 569). — Poeni, locuri ierboase, tuferișe. Băilești distr. Dolji (pl. indig. 1899); Chitila, Bufta (pl. indig. 1901); Comana.

**A. rotundum** L. spe. p. 423 (Consp. p. 570).—Câmpuri, holde, tuferișe. Dealu-Mare pe la Valea Călugărească; pădurea Tinoasa; Bârlad; Botoșani (pl. indig. 1899, 1901); Constanța.

Câte și trei aparțin în § 2. *Porrum* Don: *filamentele celor trei stamine interne late până sus și tricuspidate*, în gruparea celor cu umbela lipsită de bulbice la bază, spaturile scurte, capsulare, obtuse, necuspidate. Dar asemănarea între *A. atrovioleaceum* Boiss. și *A. rotundum* L. este cu mult mai însemnată decât cu cel-lalt. Cu portul înalt și robust, având tunicele externe ale bulbului fibroase, foile mult mai late, plane dar ușor canaliculat-conduplicate, capitulul globos mult mai voluminos și anterele exerte: *A. atrovioleaceum* Boiss.; cu portul mai mic și mai sufire, tunicele externe ale bulbului membranoase, foile mai înguste, capitulul mediocru, staminele incluse: *A. rotundum* L.

**A. sphærocephalum** L. spe. p. 426 (Consp. p. 570).—Câmpuri, livezi, holde. Bârlad la Crângu (pl. indig. 1901), stația Roșiești în Tutova.

**A. ascalonicum** L. spe. p. 423 (Consp. l. c.).—Adiție: vulgar *Hajmă*. *Hasme*. *Horcegi* (Transs.). În București: *Șalotă*. *Ceapă-franțuzească*.

**Muscari tenuiflorum** Tausch in Flora ann. 1841 vol. 3 p. 234 (Consp. p. 570).—Câmpuri, livezi, crânguri. Comana; Piatra-Neamțu.

**M. botryoides** Mill. dict. n<sup>o</sup> 1 (Consp. p. 571). — Livezi, crânguri, tuferișe. Piatra-Neamțu; Iași pe dealul Buznea (pl. indig. 1899).

Adiție dupe acesta:

\* 4. **M. transsilvanicum** Schur œst. bot. zeit. vol. 6 (1856) p. 237; ejus enum. transs. p. 676; Simk. enum. transs. p. 528. — 4 Aprilie și spre începutul lui Mai. — Livezi, crânguri, rărișuri. București pe la pădurea Mernani (*M. botryoides* Grec. consp. p. 571), Otopeni, Brănești spre pădurea Pustnicu; Afumați pe la pădurea Lileci.

Diferă de precedentul prin scapul său mai înalt dar mai subțire, prin foile sale lineare oblung-spatulate, plane, erecte. vârful ușor încovoiat a glugă micuță, mai scurte de cât scapul,—nu canaliculato-cilindrice, acute, stricte și depășind scapul; apoi racemul de flori mai rărișor și florile ceva mai pedicelate, cam asemuind cu cele de *M. racemosum* Mill.

Adiție dupe acesta:

\* 5. **M. neglectum** Guss. syn. fl. sicul. vol. 1 p. 411 (1842); Gren.

Godr. fl. fr. vol. 3 p. 218; Boreau fl. centr. de la France p. 620; Boiss. fl. orient. vol. 5 p. 296; Velen. fl. bulg. p. 566. *Botryanthus neglectus* Kunth enum. vol. 4 p. 679 (1842); Nym. consp. p. 734.— 4 Aprilie spre Mai. Locuri ierboase, crânguri, tuferișe. Cerneți în Piatra-Albă și la Brăila pe la Monument (pl. indig. 1899); Ostrov în pădurea Eschiol (pl. indig. 1901).

Existența sa în România meridională se explică și prin faptul că această specie este comună în partea occidentală a Bulgariei. Ea lipsește în Transilvania, Basarabia și Rusia pre cât se știe până acum.

• **Hyacinthus leucophæus** Stev. ap. Ledeb. fl. ross. vol. 4 p. 156 (Consp. p. 571).—Locuri ierboase, crângulețe, târâm fertil. Constanța prin vii și spre Murfatlar.

### COLCHICACEÆ DC.

**Colchicum autumnale** L. spe. p. 185 (Consp. p. 571).—Livezi montane, submontane. Valea-Argeșului la Padina în sus de Cheea-Argeșului sub Glodu-Mare; Valea-Popei în Muscel (pl. indig. 1899); Bicăz pe Bâta-Vacei (pl. indig. 1900).

**Veratrum album** L. spe. p. 1479: *var. Lobelianum* Bernh. ap. Schrad. in neue Journ. vol. 2 p. 356: florile în interior verzui (Consp. p. 572). Livezi montane. Parângu pe Mirul-Mare; pe muntele Lespezi sub Negoiu, valea-Argeșului la gura Budei și la poalele muntelui Glodul-Mare; Ceahlău (pl. vasc. ceahl. p. 78).

### JUNCAGINACEÆ Ch. Rich.

**Triglochin palustre** L. spe. p. 482 (Consp. p. 572).—Vulgar *Bros-carița*.—Locuri mlăștinoase, joase. Pe lângă Lacul-Amara în Ialomița.

### JUNCACEÆ Bartl.

Subt genul **Juncus** în § 1, gruparea *a* (Consp. p. 564) definiția să se lămurească astfel:

*a.* Foile constând numai din vagine simple, fără limb.

† Florile triandre.

**J. conglomeratus** L. spe. p. 464 (Consp. p. 573).—Locuri mlăștinoase sau băltoase. Predeal; pădurea Cernica.

**J. effusus** L. spe. p. 464 (Consp. p. 573).—Locuri mlăștinoase sau băltoase. Curtea-de-Argeș, Flămânzeni; Scuipați, Brănești în Ilfov; Monăstirea Suzana în Prahova.

† † Florile hexandre.

**J. glaucus** Ehrh. Beitr. vol. 6 p. 83 (Consp. p. 573).—Locuri mlăștinoase sau băltoase. Brănești, pădurea Cernica; pădurea Tinoasa în Prahova; Brăila, Măcin.

Adiție dupe acesta (Consp. p. 573):

\* **3<sup>b</sup>. J. diffusus** Hoppe in Flora ann. 1819 vol. 2 p. 186; Sturm deutsch. fl. fasc. 77; Koch syn. p. 839; Rchb. icon. fl. germ. vol. 9 fig. 921; Gren. Godr. fl. fr. vol. 8 p. 339; Schlechtd. Langeth. deutsch fl. vol. 3 fig. 166. ~~×~~ *J. glauco-effusus* Schnitzl et Frickhing. veget. der Jura ann. 1848. ~~×~~ *J. effusus-glaucus* Fr. W. Schultz in pollichia ann. 1863 p. 153; Asch. et Graeb. syn. mitt. europ. vol. 2 part. 2<sup>o</sup> p. 450.—4 Iulie. August. Locuri mlăștinoase. Pe Argeș în valea Caprei la Cumpăna.

**J. transsilvanicus** Schur verh. siebenb. ver. ann. 1851 p. 169 et ann. 1852 p. 92; ejus enum. transs. p. 684 (Consp. p. 573).—Tot pe locuri mlăștinoase, în regiunea alpină. Pe Păpușa la poeana S-tului Ilie.

*b*. Având vagine simple și foi vaginate cu limbul subulat.

**J. maritimus** Lam. encycl. méth. vol. 3 p. 264 (Consp. p. 573).—Dunele maritime, pe la Tuzla (pl. indig. 1900), Sanatorul Eforiei.

Urmează, apoi, secția 2<sup>o</sup> a § 1 din Conspect:

**J. Rochelianus** Rœm. et Sch. syst. veget. vol. 7 p. 1658 (Consp. p. 574).—Locuri ude sau mlăștinoase. Slănic.

**J. acutiflorus** Ehrh. Beitr. vol. 4 p. 82 (Consp. p. 574).—Locuri ude, mlăștinoase,—Vârciorova, Schela-Cladovei.

*γ. fluitans* Grec. consp. p. 574.—Mlăștini prin vâlcelele coastelor despre Schit la Predeal.

**J. articulatus** L. spe. p. 465 var. *α*. et *β*. *J. lamprocarpus* Ehrh. calam. n<sup>o</sup> 126 (Consp. p. 574).—Valea Argeșului la gura Budei; Cotorca în Ialomița; Slănic; Săvinești distr. Neamțu (pl. indig. 1900).

**J. atratus** Krock. fl. siles. vol. 1 p. 562 (Consp. p. 575).—Locuri băltoase. Vlădueni distr. Romanai (pl. indig. 1901).

**J. alpinus** Vill. pl. dauphin. vol. 2 n<sup>o</sup> 233 (Consp. p. 575).—În regiunea alpină. În Argeș pe Suru și Prislopu (pl. indig. 1899).

*β. carpaticus* Grec. consp. p. 575. **J. carpaticus** Simk. enum. transs. p. 537 (1886).—Locuri mlăștinoase în valea Roșnovei la Predeal.

**J. trifidus** L. spe. p. 465 (Consp. p. 575).—Regiunea alpină. Parângu pe Mirul-Mare; Negoiu (pl. indig. 1899) și pe Paltina; Buceci în valea Ialomiței; Păpușa.

**J. triglumis** L. spe. p. 467 (Consp. p. 575).—Regiunea alpină. Parângu pe Prislop; Negoiu (pl. indig. 1899); Buceci în valea Ialomiței (pl. indig. an. 1901).

**J. compressus** Jacq. enum. stirp. vindobon. p. 60 (Consp. p. 575).—

Bălți, gropi ude, năsipuri scurse. Pădurea Tinoasa pe lunca Prahovei; Zăvoiul Ciorogârlei la Bragadiru; Fundeni-Mărcuța; Măcin pe la balta Iglița.

Subt § 2. Anuali:

**J. bufonius** L. spe. p. 466 (Consp. p. 576).—Locuri năsipoașe umede sau scurse. Pe Argeș la gura Budei și la Cumpăna; Curtea-de-Argeș; pe la pădurea Ursache în Gorji; valea Slănicului.

\* **β. capillaceus**.—Regiunea alpină, tărâm negru humifer. Pe muntele Șandru la Slănic.

Cu aspectul negricios (*fuscus*), ca de 5—8 cent. înălțime, caulii subțirei capilari; florile de la extremități câte 2—3 fasciculate.

**Luzula pilosa** Willd. enum. hort.berol. vol. 1 p. 393 (Consp. p. 576).—Păduri montane. Negoiu (pl. indig. 1900); Câmpulung, Nămăești; Slănic; Bicăz (pl. indig. 1899).

**L. maxima** Lam. et DC. fl. fr. vol. 3 p. 160 (1805). *L. silvatica* Gaud. agrost. helvet. vol. 2 p. 240 (Consp. p. 577). Adiție; vulgar *Parașin*, astfel și cele următoare. Păduri, în regiunea montană. Dealurile mari la Cotmeana în Argeș (pl. indig. 1889); Slănic pe muntele Șandru; Ceahlău (pl. indig. 1889).

**L. spadicea** Lam. et DC. fl. fr. vol. 3 p. 159 (Consp. p. 577).—Regiunea alpină, pe Prislopul în Argeș (pl. indig. 1899) și în Parângu pe Mirul-Mare.

**L. albida** Lam. et DC. fl. fr. vol. 3 p. 159 (Consp. p. 577).—Păduri montane, stânci în văi umbroase umede. Pe Zănoaga în Argeș (pl. indig. 1899); Negoiu, Lespezi și în valea Caprci la Cumpăna; Piatra-Neamțu pe Cernegura (pl. indig. 1900).

**β. rubella** Gaud. agrost. helvet. vol. 2 p. 243 (Consp. p. 577).—Păduri montane, văi montane umbroase. Păiuș; Govora; Căinenii din Argeș (pl. indig. 1899); Negoiu, Paltina, Cheea-Argeșului; Predeal; Slănic și pe muntele Șandru; Ceahlău (pl. indig. 1901).

**L. campestris** Lam. et DC. fl. fr. vol. 3 p. 161 în strictul sens Consp. p. 577).—Adiție: sinonimii *L. campestris* α. *vulgaris* Gaud. fl. helvet. vol. 2 p. 572 (1828). *L. vulgaris* Buchen. in engl. bot. jahrb. vol. 7 p. 175 (1885).—Livezi în regiunea montană și α dealurilor mari. Plaiul Prislopului în Argeș (pl. indig. 1899); pe Lotru la Brezoiu în Vâlcea; Dealu-Mare la Valea Călugărească; Crucea-de-Jos în Putna (pl. indig. 1901); Buciumeni distr. Iași (pl. indig. 1901); Slănic pe muntele Pufu: var. *nemorosa* Rchb. icon. fl. germ. vol. 9 fig. 837.

**L. multiflora** Lejeune fl. env. spa vol. 1 p. 169 (Consp. p. 578 excluzând sinonimul *Juncus nemorosus* Host).—Păduri în părțile montane. Buceci la poale spre Bușteni (pl. indig. 1900); Negoiu și pe Lespezi.

Adiție subt această:

\* *β. congesta* Koch syn. p. 847 (1844); Ascher. et Græbn. syn. mitt. europ. vol. 2 part. 2<sup>o</sup> p. 524. *L. erecta β. congesta* Desv. journ. bot. vol. I p. 156 (1808). *L. congesta* Lejeune l. c. p. 169 (1811); Rchb. icon. fl. germ. vol. 9 fig. 834. *Juncus campestris* ζ. L. spe. p. 469. *J. congestus* Thuill. fl. env. paris ed. 2<sup>o</sup> 179 (1799).—Livezi montane. Predeal.

**L. nigricans** Desv. journ. de bot. vol. 1 p. 158 (Consp. p. 578). Synon. *Luzula sudetica* DC. fl. fr. vol. 5 p. 306. *Juncus sudeticus* Wild. spe. pl. vol. 2 p. 221 (1799). Regiunea alpină. Parângu pe Mirul-Marc; Negoiu pe Lespezi și Paltina.

**L. spicata** Lam. et DC. fl. fr. vol. 3 p. 161 (Consp. p. 578).—Regiunea alpină. In Parângu pe Păcleșu; pe Negoiu (pl. indig. 1899) și pe Lespezi; Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901).

## CLASA VI

### Monocotiledoane Aperiante.

#### CYPERACEÆ Juss.

**Cyperus flavescens** L. spe. p. 68 (Consp. p. 578). Locuri joase mlăștinoase sau scurse. Lunca Lotrului la Brezoi în Vâlcea; Comana; Tulcea în delta Dunărei; Constanța năsipurile umede pe la Tăbăcărie și Mamaea

**C. fuscus** L. spe. p. 69 (Consp. p. 579).—Locuri joase umede mlăștinoase sau scurse. Lunca Prahovei pădurea Tinoasa; Cernica; Urziceni.

**C. longus** L. spe. p. 67 (Consp. p. 579).—Locuri joase de alluvium. Isaccea, Jijila, Ghecet.

Adiție, dupe *Cyperus longus* L. (Consp. p. 579):

\* 6<sup>b</sup>. **C. badius** Desf. fl. atlant. vol. 1 p. 45 (1798); Sturm deutch. fl. fasc. 78; Koch syn. p. 849; Rchb. icon. fl. germ. vol. 8 fig. 673; Gren. Godr. fl. fr. vol. 3 p. 358; Boiss. fl. orient. vol. 5 p. 376. *C. thermalis* Dumort. fl. belg. p. 145 (1827). *C. longus var. badius* J. Gay in Cambess. enum. ins. balear. (1827).—4 Iulie. August. Locuri băltoase. Valea Turlacului între Racheș și Isaccea.

**C. Monti** L. fil. suppl. p. 102 (Consp. p. 479).—Locuri băltoase sau mlăștinoase scurse. Lunca Prahovei pădurea Tinoasa; Fundeni-Mărcuța; Scuipați în Ilfov.

**C. glomeratus** L. spe. p. 68 (Consp. p. 580).—Locuri umede, năsipuri ude sau scurse. Pioa-Pietrei în Ialomița; valea Turlacului între Racheș și Isaccea.



**Eriophorum vaginatum** L. spe. p. 76 (Consp. p. 580. — Mlăștini turfoase în regiunea alpină. Rarău pe Piatra-Zîmbrului.

**E. polystachyon** α. L. spe. ed. 1753 p. 52. — Mlăștini turfoase. Predeal pe înuntele Urzicar (pl. indig. 1900).

**E. latifolium** Hoppe taschenb. an. 1800 p. 108 (Consp. p. 581). — Mlăștini turfoase prin livezi subalpine. Predeal la Schit și pe valea Prahovei spre Azuga; Dâmbovicioara pe la Isvor; Ceahlău pe la Schitul Durău; în Suceava pe Rarău.

**Scirpus silvaticus** L. spe. p. 75 (Consp. p. 581). — Locuri băltoase sau mlăștinoase. Predeal pe valea Roșnovei; Dealu-Mare la Valea Călugărească; Slănic.

**Sc. maritimus** L. spe. p. 74 (Consp. p. 581). — Locuri băltoase. Lunca Prahovei pădurea Tinoasa; lacul Sinteasca în Ilfov.

**Sc. Michelianus** L. spe. p. 76 (Consp. p. 582). — Locuri băltoase, mlăștini. Brănești pădurea Cernica; Fundeni-Mărcuța; gura Ialomiței pe la Ploa-Pietrei (P. Enculescu).

**Sc. Holoschoenus** L. spe. p. 72 (Consp. p. 582). — Dunele danubiane la Poeana și Piscu în Dolji; dunele maritime la Tuzla (pl. indig. 1900).

**Sc. lacustris** L. spe. p. 72 (Consp. p. 582). — Locuri băltoase, stuhării. Pe Prahova la Tinoasa; Căldărușani; Brăila în ostrovu Chiciu-Măcinului și în bălțile dunărene la Tulcea.

**Sc. compressus** Pers. syn. vol 1 p. 66 (Consp. p. 583). — Locuri mlăștinoase alpine. Buceci în valea Ialomiței (pl. indig. 1900).

**Heleocharis palustris** R. Br. prodr. nov.-holl. vol. 1 p. 80 (Consp. p. 583). — Locuri băltoase. Pe Prahova pădurea Tinoasa; Pitești la Trivale (pl. indig. 1901); Cotorca în stepele Ialomiței; Măcin bălțile dunărene.

**H. uniglumis** Schult. mant. vol. 2 p. 88 (Consp. p. 583). — Mlăștini. Predeal în valea Roșnovei (pl. indig. 1900).

Adiție după acesta (Consp. p. 583):

\* **2b. H. ovata** R. Br. prodr. nov.-holl. vol. 1 p. 80 in annot. (1810); Koch syn. ed. 2<sup>o</sup> p. 852; Schlechtd. Langeth. deutsch. fl. vol. 5 p. 407. *Scirpus ovatus* Roth tent. fl. germ. vol. 2 p. 562 (1789); Sturm deutsch. fl. fasc. 10; Rchb. icon. fl. germ. vol. 8 fig. 700 et 701. *Sc. multicaulis* Gmel. fl. baden. vol. 1 p. 96 (1805). *Sc. turgidus* Pers. syn. vol. 1 p. 66 (1805). — ☉ Iunie. Iulie. Locuri mlăștinoase expuse inundațiilor de ape curgătoare, în valea Prahovei pe albia dintre Breaza, Câmpina și Comarnic (pl. indig. 1901 p. 26).

**H. acicularis** R. Br. prodr. nov.-holl. vol. 1 p. 80 (Consp. p. 583). — Locuri băltoase. Tulcea (pl. indig. 1899).

**Carex hirta** L. spe. p. 1389 (Consp. p. 584). Locuri ude, gropi,

bălți. Dealu-Mare la Valea Călugărească; pădurea Tinoasa; Comana spre valea Gurbanului; Mărășești; Tulcea.

**C. nutans** Host gramin. vol. 1 p. 61 tab. 83 (Consp. p. 584). — Locuri ude sau mlăștinoase. Dealu-Mare la Valea Călugărească; Brănești, Cernica; Brăila, Măcin prin bălțile dunărene; Techirghiol Sanatorul Eforiei.

Adiție după acesta (Consp. p. 584):

\* **2<sup>b</sup>. C. filiformis** L. spe. p. 1385; Sturm deutsch. fl. fasc. 53; Koch syn. p. 888; Rchb. icon. fl. germ. vol. 8 fig. 643; Gren. Godr. fl. fr. vol. 3 p. 451; Ledeb. fl. ross. vol. 4 p. 319. *C. splendida* Willd. prodr. fl. berlin. n<sup>o</sup>. 103 tab. 1 fig. 1 (1787) mala. *C. lasiocarpa* Ehrh. gramin. n<sup>o</sup>. 19 (1785). — 4 Maiu. Iunie. Locuri băltoase, mlăștini profunde. Buceci în valea Jepilor (pl. indig. 1901).

**C. riparia** Curt. fl. londin. vol. 4 (1780) tab. 60 (Consp. p. 584). — Bălți, heleșteuri, stufării. Lunca Prahovei pădurea Tinoasa; Băneasa, Herăstrău, Cernica; Brăila, Măcin bălțile dunărene; Curtea-de-Argeș la Flămânzeni.

\* **β. forma monstruosa.** Spicurile feminine voluminoase, pinat-compuse, tirsoide. În pădurea Tinoasa.

**C. paludosa** Gooden. transs. of linn. soc. vol. 2 p. 202 (Consp. p. 584). — Bălți, heleșteuri, stufării, mlăștini profunde. — Lunca Prahovei pădurea Tinoasa; Brănești, Cernica; Măcin balta Turcoaea; Caracăl pe la pădurea Romula (pl. indig. 1900).

**C. vesicaria** L. spe. p. 1388 (Consp. p. 585). Locuri băltoase. Comana în valea Spiridonului și în valea Gurbanului.

Adiție dupe acesta și în aceeași grupare (Consp. p. 585):

\* **5<sup>b</sup>. C. rostrata** Stokes in Wither. arrang. vol. 2 p. 1059 (1787); Simk. enum. transs. p. 556. *C. ampulacea* Gooden. in transs. of linn. soc. ann. 1794 vol. 2 p. 207; Koch syn. p. 886; Gren. Godr. fl. fr. vol. 3 p. 428; Ledeb. fl. ross. vol. 4 p. 318; Rchb. icon. fl. germ. vol. 8 fig. 659; Schlechtd. Langeth. deutsch. fl. vol. 6 fig. 545. *C. vesicaria* β. L. spe. p. 1389. *C. vesicaria* Huds. fl. angl. p. 413 (1762)-non L. var. α. 4 Iunie. Iulie. Mlăștini turfoase montane. Predeal în valea Roșnovei (pl. indig. 1900 p. 44).

**C. Pseudo-Cyperus** L. spe. p. 1387 (Consp. p. 585). — Stufăriile Colentinei la Chitila, Mogoșoaia, Cernica.

**C. silvatica** Huds. fl. angl. ed. 1 p. 353 (Consp. p. 585). — Păduri la locuri ude sau umede. Lunca Prahovei pădurea Tinoasa; Slănic.

**C. distans** L. spe. p. 1387 (Consp. p. 585). — Locuri joase ude sau scurse. Lunca Prahovei pădurea Tinoasa; Craiova lunca Jiului; Constanța.

**C. flava** L. spe. p. 1384 (Consp. p. 585). — Locuri mlăștinoase. Predeal în valea Roșnovei spre fund; Ceahlău pe la Schitul Durău.

**C. Michelii** Host syn. pl. p. 507 (Consp. p. 586).—Păduri. Lunca Prahovei pădurea Tinoasa; Brănești pădurea Cernica; Căldărușani.

Adiție dupe acesta (Consp. p. 586):

\* **12<sup>b</sup>. C. tenuis** Host gramin. vol. 4 p. 51 tab. 62 (1809); Koch syn. p. 883; Rchb. icon. fl. germ. vol. 8 fig. 601; Gren. Godr. fl. fr. vol. 3 p. 421. *C. brachystachys* Schrank natur. hist. briefe üb. österr. vol. 2 p. 285 (1785); Sturm deutsch. fl. fasc. 53; numire nepotrivită, deși mai veche, neacceptată de marea parte de autori. - 4 Iunie. Iulie. Locuri umede, tărâm pietros. Buceci în valea Ialomiței (pl. indig. 1901 p. 26).

**C. ventricosa** Curt. fl. londin. vol. 6 tab. 68 (Consp. p. 586).—Păduri montane, tărâm pietros, în Dobrogea septentrională, la Greci (pl. indig. 1889).

**C. tristis** M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 3 p. 615 (Consp. p. 586).—Regiunea alpină și subalpină pe stânci. Buceci în valea Ialomiței și în valea Jepilor (pl. indig. 1900).

**C. digitata** L. spe. p. 1383 (Consp. p. 587).—Stânci, livezi alpine, subalpine. Buceci pe la Urlătoare (pl. indig. 1900); Ceahlău (pl. indig. 1900); Dealu-Mare la Valea Călugărească sus pe înălțimi (Marc. Br.).

**C. verna** Chaix ap. Vill. pl. dauphin. vol. 2 p. 204 (Consp. p. 588).—Livezi la locuri uscate deschise Cotmeana în Argeș pe dealuri (pl. indig. 1899); Poeana-Țapului și la Sinaia; Dealu-Mare la Valea Călugărească; stepele Ialomiței la Cotorca.

**C. tomentosa** L. mantissa p. 123 (Consp. p. 588). Păduri. Caracăl la pădurca Romula (pl. indig. 1900); Lunca Prahovei pădurea Tinoasa.

**C. nigra** All. fl. pedem. vol. 2 p. 267 (Consp. p. 588). Regiunea alpină. Buceci pe Doamnele (pl. indig. 1901).

**C. atrata** L. spe. p. 1386 (Consp. p. 588). Regiunea alpină. Munții Negoilui pe Paltina; Păpușea; Buceci la Obârșia-Ialomiței; Ceahlău la Șea (pl. vasc. ceahl. p. 79).

**C. panicea** L. spe. p. 1387 (Consp. p. 589).—Văi montane umede umbroase. Pe Lotru la Voineasa în valea Voinășitei.

**C. pilosa** Scop. fl. caru. ed. 1772 p. 226 (Consp. p. 589).—Păduri, dumbrave umbroase. Dealu-Mare la Valea Călugărească; pădurea Tinoasa; Brănești pădurea Cernica; Vidra în Putna (pl. indig. 1901); Bacău la Fântânele (pl. indig. 1899); Dobrogea septentrională pădurea Taița.

**C. brevicolis** DC. fl. fr. vol. 5 p. 295 (Consp. p. 589).—Păduri pe munți pietroși, în Dobrogea septentrională la Nicolifet, Cocoși, Taița, sporadic.

**C. pallescens** L. spe. p. 1386 (Consp. p. 589).—Păduri în regiunea montană. Predeal în valea Roșnovei spre fund (pl. indig. 1900).

**C. glauca** Murr. prodr. fl. gœtting. p. 76 (Consp. p. 589).—Păduri

montane și pe dealurile mari. Bacău la Fontânele pe dealuri (pl. indig. 1899); Slănic.

β. *dinarica* Heuff. fragm. p. 63 (Consp. p. 589).—Stânci în văi sub-alpine umbroase. Buceci la Bușteni (pl. indig. 1900).

**C. pendula** Huds. fl. angl. ed. 1762 p. 352 (Consp. p. 590).—Păduri montane și pe dealurile submontane. Valea-Mare distr. Muscel plasa Potgoria (pl. indig. 1900); Slănic.

Nomenclatura de *Carex vulgaris* Fries (Consp. p. 590) se va modifica astfel:

**35. C. Goodenowii** Gay ann. scien. natur. vol. 2 ser. X p. 191 (1839); Gren. Godr. fl. fr. vol. 3 p. 402. *C. Goodenoughii* Sag. et Schn. fl. carpat. centr. vol. 2 p. 511 et Auct. pl. *C. caespitosa* Good. transs. of linn. soc. ann. 1794 vol. 2 p. 195 tab. 21 fig. 8-non L.; Sturm. deutsch. fl. fasc. 50. *C. vulgaris* Fries novit. fl. suec. mant. vol. 3 p. 153 (1842); Koch. syn. p. 872; Rchb. icon. fl. germ. vol. 5 fig. 581; Schlechtd. Langeth. deutsch. fl. vol. 6 fig. 489-non sat bona. *C. Goodenoughii* 1<sup>o</sup>, a: *elatior* Aschers. et Gräbn. syn. mitt. europ. vol. 2 part. 2<sup>o</sup> p. 95 (1902). *C. dacica* Heuff. in Flora 1835 vol. 1 p. 247; enum. banat. p. 185; Neilr. diagn. p. 130; Porciu diagn. p. 277.— 4 Iunie. Iulie. Mlăștini turfoase la Predeal în valea Roșnovei spre gura Brădetulu (pl. indig. 1900 p. 45, culeasă și în anul 1907 tot acolo).

Simonkai (enum. pl. transs. p. 549) și Porciu (diagn. l. c.) consideră pe *C. dacica* Heuff. ca specie proprie deosebită de *C. Goodenoughii* Gay (*C. vulgaris* Fries) subț cuvânt că ar avea foile rigide și plane, fructul «obsolete nervosis» ceea ce se constată și pe exemplare din Germania subț numele de *C. Goodenoughii* Gay, precum rezultă și din descrierea autorilor precitați cu privire la foi și nervația fructelor.

Adiție dupe acesta și în aceeași grupare (Consp. p. 590):

\* 35<sup>b</sup>. **C. caespitosa** L. spe. p. 1388; Rchb. icon. fl. germ. vol. 8 fig. 582 sec. Fries; Ledeb. fl. ross. vol. 4 p. 310; Schlechtd. Langeth. deutsch. fl. vol. 6 fig. 488. *C. pacifica* Drejer fl. exic. hafn. p. 292 (1842). *C. Drejeri* Lang. in Flora ann. 1842 p. 548; Koch syn. p. 872; Neilr. diagn. p. 130. *Vignea caespitosa* Rchb. fl. germ. excurs.— 4 Iunie. Iulie. Buceci în valea Ialomiței (pl. indig. 1901 p. 26).

**C. remota** L. spe. p. 1383 (Consp. p. 590).—Păduri, la locuri umede. Dealu-Mare la Valea Călugărească; pădurea Tinoasa pe Prăhova; Slănic; Piatra-Naemțu pe Cernegura; Dobrogea septentrională în pădurea Taița.

**C. canescens** L. spe. p. 1383 (Consp. p. 590).—Păduri, la locuri ude, rovinose. Pădurea Căldărușani (pl. indig. 1901); pădurea Tinoasa.

**C. leporina** L. spe p. 1381 (Consp. p. 591).—Lăvezi montane alpine, subalpine. Parângur la poalele Mândrei; munți Negoilului pe Paltina și Lespezi; Monăstirea Suzana; Slănic pe Șandru

**C. divulsa** Good. in transact. of linn. soc. ann. 1794 vol. 2 p. 160 (Consp. p. 591). — Păduri, la locuri umede sau mlăștinoase. Lunca Pravei pădurea Tinoasa.

**C. muricata** L. spe. p. 1382 (Consp. p. 592). — Păduri, la locuri cam năsipose umede sau scurse. Azuga (pl. indig. 1901); pădurea Tinoasa; București, Băneasa, Mogoșoaia; Piatra-Neamț pe Cozla; Cotorca pe la pădurea Arionoaia în Ialomița.

**β. virens** Koch syn. p. 866 (Consp. p. 592). — Locuri umbroase, păduri. Brănești pădurea Cernica; Căldărușani; Slănic.

**C. vulpina** L. spe. p. 1382 (Consp. p. 592). — Bălți, stufării băltoase, pe lângă și prin păduri. Pădurea Tinoasa; București dealu Piscu la Filaret.

**C. brizoides** L. spe. p. 1381 (Consp. p. 592). — Livezi montane. Slănic.

**C. præcox** Schreb. spicil. fl. lipsc. p. 63 (Consp. p. 592). — Livezi la locuri deschise uscate. Segarcea distr. Dolji; Căldărușani (pl. indig. 1901); Brănești pădurea Cernica; pădurea Tinoasa; Cotorca; Mărășești; Dealu-Mare la Valea Călugărească.

**C. disticha** Huds. fl. angl. ed. 1762 p. 347 (Consp. p. 593). — Stânci montane. Buceci în valea Ialomiței (pl. indig. 1901).

**C. curvula** All. fl. pedem. vol. 2 p. 294 (Consp. p. 593). — Regiunea alpină. — Parângu pe Mândra; Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901).

**Elyna spicata** Schrad. fl. germ. vol. 1 p. 155 (Consp. p. 594). — Piscuri alpine. Buceci la Omu 2508 m. alt. (pl. indig. 1901).

## GRAMINEÆ Juss.

**Tragus racemosa** Hall. hist. st. helv. vol. 2 p. 203 (Consp. p. 594). — Năsipuri, prunduri riverane. Cursul Ialomiței pe la Buești; Măcin pe la Carcaliu și Acpunar; Tuzla pe marginea lacului Techirghiol.

**Digitaria sanguinalis** Scop. fl. carn. ediț. 1760 p. 52 (Consp. p. 594). — Drumuri, garduri, locuri comunale virane. Govora; Curtea-de-Argeș; Brăila.

**Phalaris arundinacea** L. spe. p. 80 (Consp. p. 597). — Locuri umede livezi. Curtea-de-Argeș pe Sânicora; Chitila, Mogoșoaia; zăvoiu în ostrovu Chiciu-Măcinului.

**Ph. canariense** Lin. spe. p. 79 (Consp. p. 597). — Adiție: vulgar. *Meiu canarilor*. *Meiu-lung*. *Alpist*. Pe lângă căi comunale. Sarichioi în Tulcea (pl. indig. 1901).

**Anthoxanthum odoratum** L. spe. p. 40 (Consp. p. 597). — Livezi, tuferișe, păduri. Pe Parângu; Pitești la Trivale (pl. indig. 1900); Predeal; Bicaz, Piatra-Neamț (pl. indig. 1899).

\* *var. glaberrimum* Schur enum. transs. p. 725. *A. alpinum* Schur olim. — Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901 p. 26); Parângu.

*Crypsis aculeata* Ait. hort. hew. ed. 1. vol. 1 p. 48 (Consp. p. 598). — Locuri joase umede sau scurse sărate. Valea Sărăturile pe la Salcia, asemenea și la Cotorca pe Cotorceanca în stepele Ialomiței; Măcin pe la balta Iglița și în valea Slatina.

*C. alopecuroides* Schrad. fl. germ. vol. 1 p. 167 (Consp. p. 598). Locuri joase sărate. Măcin, Turcoaea, Satu-nou din vecinătate.

*Alopecurus laguriformis* Schur in verh. siebenb. ver. 1850 vol. 1 p. 182; ejus enum. transs. p. 727; Griseb. et Sch. iter hung. n<sup>o</sup>. 314; Simk. enum. transs. p. 561. *A. brachystachys* Janka in linn. 1860 p. 615 — non M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 3 p. 56 (1819); însă identic cu *A. brachystachys* M. Bieb. după C. Richter pl. europ. vol. 1 p. 38. — Grec. consp. p. 598. — În Argeș pe Prislopu (pl. indig. 1899).

*A. fulvus* Smith engl. bot. vol. 21 tab. 1467 (Consp. p. 599). — Locuri umede, năsipuri ude sau scurse. Pădurea Tinoasa lunca Prahovei; pe Ciorogârla la Bragadiru; București la Filaret.

*Phleum pratense* L. spe. p. 79 (Consp. p. 599). Livezi. Govora; Curtea-de-Argeș; valea Argeșului la gura Budei; Slănic.

*Ph. Boehmeri* Wibel prim. fl. werth. p. 125 (Consp. p. 599). Livezi, locuri deschise. Stepele Ialomiței la Hagieni; Techirghiol-Movilă.

Nomenclatura de *Ph. serrulatum* Boiss (Consp. p. 599) să se modifice astfel:

3. *Ph. montanum* C. Koch in linn. XXI an. 1848 p. 383; Halácsy consp. fl. græc. vol. 3 p. 345. *Ph. Boehmeri v. ciliatum* Griseb. in Ledeb fl. ross. vol. 4 p. 457 (1853); Boiss. fl. orient. vol. 5 p. 483-non Pour. nec Gilib. *Ph. serrulatum* Boiss. et Heldr diagn ser. 2<sup>o</sup> fasc. 4 p. 125 (1859). *Chilochloa collina* Schur enum. transs. p. 729 (1866). *Ph. collinum* Auct. transs. — Tuferișe, locuri pietroase. Măcin la poalele munților Pricopanului

*Ph. alpinum* L. spe. p. 88 (Consp. p. 600). — *Ph. commutatum* Gaud. agrost. helv. vol. 1 p. 40 (1811). *Ph. alpinum* β. *commutatum* Grec. consp. l. c. când aristele glumelor sunt fără cili, formă mai alpină ca cea vulgară. Livezi alpine și subalpine. Parângu pe Miru și Gruiu; Negoiu (pl. indig. 1899 și 1900); tot aci și *forma diminuta*; Buceci la Schitu-Ialomița (pl. indig. 1901); Predeal pe Clăbucetu-Taurului, jos pe la Schit și în valea Roșnovei; Ceahlău (*Ph. alpinum* var. β. *commutatum* Grec. pl. indig. 1899 p. 14 și 1900 p. 45).

*Beckmannia erucaeformis* Host gramin. vol. 3 p. 5 tab. 6 (Consp. p. 600). — Locuri băltoase, viroage. Vaslui.

*Sorghum halepense* Pers. syn. vol. 1 p. 101 (Consp. p. 601). — Constanța prin vii.

*S. vulgare* Pers.—Adiție: vulgar *Malai* sau *Mei-tătaresc*.

*S. saccharatum* Pers.—Vulg. *Mătore*. *Mătore cu bobu-negru*.

**Andropogon Ischæmum** L. spe. p. 1483 (Consp. p. 601).—Locuri aride, livezi uscate în părțile aprice. Stația ferată Govora; Câmpina; Hagiieni, Țândărei, Fetești; Agiud; Techirghiol-Movilă.

**A. Gryllus** L. spe. p. 1480 (Consp. p. 601). Locuri uscate aprice. Vârciorova în poeana de la gura Cerovățului, mult; Brăila; Măcin.

**Phragmites communis** Trin. fund. agrost. p. 134 (Consp. p. 602).—Bălți și mai ales bălțile mari dunărene. Brăila; Măcin; delta Dunărei până la Sulina: *var*  $\alpha$  et  $\beta$  Grec. consp. l. c.

**Agrostis alba** L. spe. p. 93 (Consp. p. 604).— $\alpha$ . *diffusa* Host.—Govora; Căineni din Argeș (pl. indig. 1899); Curtea-de-Argeș, Albești; Slănic.

$\beta$ . *major* Gaud. fl. helvet. vol. 1 p. 189 (Consp. l. c.).—Locuri umede, șanțuri. Curtea-de-Argeș.

$\gamma$ . *pontica* Grec. consp. p. 605.—Pe locuri joase umede sau tinoase. Marginea lacului Techirghiol laturea despre Sanatorul Eforiei.

$\delta$ . *coarctata* Schur enum. transs. p. 733; Grec. consp. p. 605. **Agrostis coarctata** Hoffm. deutsch. fl. vol. 1 p. 37 (1791). Adiție sinonimu *A. stolonifera*  $\gamma$ . *tenuis* Heuff. enum. ban. p. 190 (1858).—Pe locuri joase umede sau tinoase. Predeal; lunca Prahovei la Tinoasa; pe Colentina la Fundeni-Mărcuța; Slănic.

**A. vulgaris** Wither. arrang. brit. ed. 1 p. 132 (1776); Grec. consp. p. 605.—Livezi montane. Valea Argeșului la gura Budei și în valea Căprei la Cumpăna; Azuga, Bușteni (pl. indig. 1901); Bicăz pe muntele Corbina; valea Jiului la Păiuș, Lainici.

\*  $\beta$ . *geniculata*.—Valea Argeșului la gura Budei; Predeal; Slănic pe muntele Pufu.

Cele două-trei noduri inferioare, de la rădăcină, foarte geniculate, unele constituind aproape unghiuri drepte.

**A. canina** L. spe. p. 92 (Consp. p. 606).—Pe locuri joase ude sau tinoase. Lunca Prahovei pădurea Tinoasa; pădurea Cernica.

**A. rupestris** All. fl. pedem. vol. 2 p. 237 (Consp. p. 606).—Regiunea alpină, locuri pietroase. Parângu pe Mirul-Mare și Gruiu; Negoiu pe muntele Lespezi; Buceci în valea Ialomiței (pl. indig. 1901).

**Apera Spica venti** P. Beanv. agrost. p. 31 tab. 6 fig. 11 (Consp. p. 606).—Livezi. Curtea-de-Argeș; Slănic.

Adiție după genul **Apera** (Consp. p. 606):

\* 20b. **SPOROBOLUS** R. Br. prodr. nov.-holl. I p. 170.

\* 1. **S. pungens** Kunth gramin. vol. 1 p. 68 et enum. pl. omn. vol. 1 p. 210 (1833); Griseb. spicil. fl. rumel. et bithyn. vol. 2 p. 461;

Gren. Godr. fl. fr. vol. 3 p. 488; Boiss. fl. orient. vol. 5 p. 512. *Agrostis pungens* Schreb. gräser vol. 2 p. 46 (1772); Rchb. icon. fl. germ. vol. 1 agrost. fig. 140. *A. arenaria* Gouan. illustr. vol. 3 p. 3 (1773). *Vilfa pungens* P. Beaum. agrost p. 16 (1812). — 4 Iunie-Septemvrie. Locuri năsipose, dunele danubiane în cuprinsul Măcin, Turcoaea, Iglița.

Specie mediteraneană, cunoscută pe litoralul Spaniei orientale, al Franței meridionale, Italiei, Greciei și al insulilor sale, Dalmației, Albaniei și Macedoniei meridionale până acum. Aflarea sa în Dobrogea și în Țepești pe litoralul danubian merita o deosebită privire sub raportul ariei sale geografice și al florei noastre dobrogeane.

**Calamagrostis Epigeios** Roth tent. fl. germ. vol. 1 p. 34 (Consp. p. 606).— Locuri joase umede sau scurse, locuri aspre. Comana; Măcin pe lângă balta Iglița; malurile mării la Techirghiol-Movilă, Tuzla.

β. *Reichenbachiana* Grec. consp p. 607. Slănic.

Adiție dupe acesta (Consp. p. 607):

\* 1<sup>b</sup>. **C. bihariensis** (× *Epigeios-varia*?) Simk. enum. transs. p. 566. Pe Lotru în valea Voinășiței și în valea Jiului la Păiuș.

**C. littorea** DC. fl. fr. vol. 5 p. 255 (Consp. p. 607).— Prundișuri; marginea râurilor Văile Negoiului (pl. indig. 1900); Valea Slănicului la Slănic; ostrovu Chiciu-Măcinului.

**C. montana** Host gramin. p. 27 tab. 46 (Consp. p. 607).— Păduri, locuri umbroase, în regiunea montană și a dealurilor. Curtea-de-Argeș pe dealurile Hodiei și Rugetului; Valea-Mare în Podgoria Muscelului (pl. indig. 1900).

Adiție subț acesta :

\* β. *acutiflora* Koch syn. p. 906. **C. acutiflora** DC. fl. fr. vol. 5 p. 255 (1815); Rchb. icon. fl. germ. vol. 1 fig. 145. *Arundo acutiflora* Schrad. fl. germ. vol. 1 p. 217 (1806). Păduri montane. Slănic.

**C. arundinacea** Roth tent. fl. germ. vol. 2 p. 89 (Consp. p. 607).— Păduri, văi montane umbroase. Voineasa în valea Jidoarei; Valea Argeșului la Cumpăna și în Cheea-Argeșului pe stânci; Buceci la Urlatoare, valea Jepilor (pl. indig. 1901); Slănic; Monăstirea Neamțu; Bicaz (pl. vasc. ceahl. p. 80).

**Milium effusum** L. spe. p. 90 (Consp. p. 608). Adiție sinonimii *M. effusum* β. *elatius* Koch syn. ed. 2<sup>a</sup> p. 908 (1844). *M. transsilvanicum* Schur enum. pl. transs. p. 741 (1866). *M. effusum* var. *latifolium* Schur l. c.—Păduri, dumbrave umbroase. Govora; Curtea-de-Argeș pe dealuri; Buceci la Urlatoare (pl. indig. 1901); Brănești pădurea Pustnicu; munții Slănicului.

**Stipa pennata** Lin. spe. p. 145 Consp. p. 609). — Câmpuri aprice, în stepele Dobrogei la Megidie.



Speciile zise *S. Graffiana* Stev. și *Stipa Lessingiana* Trin. se vor trece ca varietăți sub *S. pennata* L. astfel:

β. *Graffiana* Lindem. fl. cherson. vol. 2 p. 283 (1882). *S. Graffiana* Stev. in bull. soc. nat. mosc. vol. 30 p. 368 (1857); Boiss. fl. orient. vol. 5 p. 503; Janka in œst. bot. zeit. ann. 1868 p. 341; Velen. fl. bulg. p. 604, *S. pulcherrima* C. Koch in linn. ann. 1848 p. 440. Locuri deschise, în părți uscate. Iași la Copou (pl. indig. 1901); comuna Cobile distr. Dorohoi (pl. indig. 1901). Caracterele diferențiale ved. Grec consp. p. 609.

γ. *Lessingiana* K. Richt. pl. europ. vol. 1 p. 32 (1890). *Stipa Lessingiana* Trin. et Rupr. in mém. acad. de petersb. vol VI ser. 7<sup>o</sup> p. 79 (1842); Ledeb. fl. ross. vol. 4 p. 450; Boiss. fl. orient. vol. 5 p. 502; Janka œst. bot. zeit. ann. 1868 p. 339. — Locuri deschise uscate aprice. Vaslui. — Caracterele diferențiale ved. Grec. consp. l. c.

*S. capillata* L. spe. p. 116 (Consp. p. 609). — Adiție: vulgar *Bucșau*. — Locuri deschise aprice, câmpuri goale Roșiești distr. Tutova; Constanța (pl. indig. 1900); Techirgiol Movilă spre Sanatorul Eforiei.

*Sesleria Heuffleriana* Schur sert. transs. n<sup>o</sup>. 3101 (1853); ejus enum. transs. p. 744 (1866) descripta (Consp. p. 609). — Adiție: sinonimu *S. Sadleriana* Janka in œst. bot. zeit. 1882 p. 309 sec. K. Richter pl. eur. vol 1. — Parângu pe Mirul-Mare; Buceci în valea Ialomiței (pl. indig. 1901).

*S. cœrulans* Friv. in Flora ann. 1836, part II p. 438 (Consp. p. 610). — Stânci, livezi alpine, subalpine. În Argeș pe Suru (pl. indig. 1899); Bicaz pe muntele Cosmița (pl. indig. 1900); Țeahlău (pl. indig. 1899) și la Durău pe Piatra Roasă (pl. vasc. ceahl. p. 80).

*S. disticha* Pers. syn. vol. 1 p. 72 (Consp. p. 610). — Stânci alpine. Pe Negoiu și Suru; în Parângu pe Pâcleșu.

*Koeleria cristata* Pers. syn. vol. 1 p. 97 (Consp. p. 610): — α. *genuina* Auct. — Livezi, mici tuferișe. Govora; Curtea-de-Argeș; Ivești distr. Tecuci.

Se va desființa *K. Fenzliana* ca specie (Consp. p. 611), trecând-o ca *varietate* sub *K. cristata* Pers. cu numirea și sinonimele următoare:

β. *montana* Haussm. fl. tir. p. 978 (1852); K. Richter pl. europ. vol. 1 p. 75. *K. cristata* var. *pseudoglacua* Schur. in œst. bot. zeit. 1857 p. 305. *K. Fenzliana* Schur l. c. p. 314 et enum. transs. p. 750 (1866). *K. rigidula* Simk. enum. transs. p. 570 (1886); Porciu diagn. p. 284 — Bușteni, pe malurile Prahovei.

Diferă de formă genuină prin foile bazale și caulinare rigide, pe margini cu o linioară albă cartilaginee, toate având vaginele glauce și glabre. Apoi urmând:

γ. *tanssilvanica* K. Richter. pl. europ. vol. 1 p. 75 (1890). *K. transsilvanica* Schur. in œst. bot. zeit. 1857 p. 313. Simk. enum. transs. p. 571.

*K. Fenzliana*  $\beta$ . *transsilvanica* Grec. consp. p. 611. — Livezi montane alpine quasi subalpine. Buceci pe laturile Furniceii.

Caracterisată prin foile verzi, mai lungi, mai moi, având vaginele și limbul glabre, stația alpină.

$\delta$ . *gracilis* Koch syn. p. 912 ( $\beta$ ). *K. gracilis*. Pers. syn. vol. 1 p. 907 (1805). *K. cristata*  $\gamma$ . DC. fl. fr. vol. 5 p. 269 (1815). — Comana,

Caracterizată prin foile sale foarte înguste, spicul prelung, îngust și subțirel.

*Aira cespitosa* L. spe. p. 96 (Consp. p. 611). — Livezi montane, stânci, în regiunea alpină inferioară și subalpină. Pe Argeș la Cumpăna în valea Caprei și în Cheea-Argeșului; Slănic.

$\beta$ . *Andræi* Porc. diagn. p. 284 (1893); Grec. Cons. p. 611. *Deschampsia Andræi* Aursw. ap. Andræ in bot. zeitung 1856 p. 205. — Livezi, păsciuni; în regiunea alpină. Parângu pe Mirul-Mare. Munții Negoiiului pe Lespezi; munții Slănicului pe Șandru; Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901).

\*  $\gamma$ . *depauperata*. — Micșorată în toate părțile sale: culm, foi și spi-cușoare. Livezi, stânci montane. — Pe la Cheea și Suzana în Prahova.

*A. flexuosa* L. spe. p. 96 (Consp. p. 611). — Livezi montane alpine, subalpine. Predeal pe muntele Urzicar (pl. indig. 1899) și pe la Schit.

*Avena fatua* L. spe. p. 118 (Consp. p. 613). — Locuri ierboase. Căi-neni din Argeș (pl. indig. 1899); Codăești distr. Vaslui (pl. indig. 1901).

*Avena alpina* Smith in linn. transs. vol. 10 p. 355 (1811); Grec. consp. p. 613. — Livezi montane subalpine. Predeal pe la Schit și în valea Roșnovei; Slănic.

*A. compressa* Heuff. in Flora ann. 1835 p. 244 (Consp. p. 614). — Livezi, rărișuri. Brănești pe la pădurea Cernica.

*A. versicolor* Vill. prosp. p. 16 (Consp. p. 614). — Regiunea alpină, pe Suru și Prislopul în Argeș (pl. indig. 1899); Parângu.

*A. flavescens* L. spe. p. 118 (Consp. p. 614). — Livezi montane. Predeal coastele de la Schit; Parângu.

*A. carpatia* Host gramin. vol. 4 tab. 31 (Consp. p. 615). Regiunea alpină, la Negoii pe Podeanu.

*A. dubia* Leers fl. herborn. 41 tab. 9 fig. 3 (Consp. p. 615). *Ventenata avenacea* Koel. gramin. p. 573 et 274. — Livezi, pe la drumuri, în regiunea câmpiană. Burila-Mică distr. Mehedinți.

*Arrhenatherum elatius* Mert. et Koch deutsch. fl. vol. 1 p. 546 (Consp. p. 615). — Livezi, locuri ierboase, rărișuri. Predeal; București pe la Șosea și în Cișmegiu (pl. indig. 1900); Panciu; Slănic.

*Holcus lanatus* L. spe. p. 1485 (Consp. p. 615). — Livezi, locuri

ierboase, rărișuri. Parângu pe la poale; Govora; Curtea-de-Argeș, Corbeni; Predeal; Slănic.

**Melica altissima** L. spe. p. 98 (Consp. p. 616). — Livezi, tuferișe. Periș pe la stupărie; dar abia un fir, deci accidental aci; Serbești distr. Cuvurlui; Mogoșești distr. Iași (P. Enculescu).

**M. nutans** L. spe. p. 98 (Consp. p. 616). — Adiție: vulgar *Margica*. — Buceci pe poalele Caraimanului (pl. indig. 1900 și 1901).

**M. uniflora** Retz. observ. vol. 1 p. 10 (Consp. p. 616). — Adiție: vulgar *Margică*. — Păduri. dumbrave umbroase. Govora; Otopeni.

Se va modifica nomenclatura și sinonimia la **M. ciliata** și **M. transsilvanica** (Consp. p. 616 și 617) astfel:

5. **M. ciliata** L. spe. p. 97; Koch syn. p. 923; Rchb. icon. fl. germ. vol. 1 fig. 135; Gren. Godr. fl. fr. vol. 3 p. 550; Simk. enum. transs. p. 576. *M. ciliata* var. *varia* Ledeb. fl. ross. vol. 4 p. 397 (1853). *M. transsilvanica* Schur enum. transs. p. 764 (1866); K. Richter pl. europ. vol. 1 p. 78; Grec. consp. p. 617. *M. ciliata* A. *transsilvanica* Aschers. et Græbn. syn. mitt. europ. vol. 2 p. 344 (1900). — 4 Mai. Iunie. Câmpuri, dealuri, rupturi de coaste. Tismana, Târgujiul; Comana valea spre Gurbanu și Băneasa; Bârlad; Galați.

β. *flavescens* Schur enum. transs. p. 764 (1866); Simk. enum. transs. p. 577. *M. lobata* Schur l. c. p. 765. *M. transsilvanica* c. *lobata* K. Richter pl. eur. vol. 1 p. 78 (1890). *M. ciliata* Grec. consp. p. 616. *M. transsilvanica* B. *flavescens* Aschers. et Græb. syn. mitt. eur. vol. 2 p. 345 (1900). — Vârciorova; Monăst. Bistrița; Cozia, Stănișoara; Dâmbovicioara; Sinaia; Monast. Cocoși pe Oglanda; Babadag, Ienisala. — Adiție: Panciu.

Această varietate — față de forma specifică tipică, la care spicul prin glumele spicușoarelor violaceu vârgate este astfel colorat și cariopsele ușor rugoase, — diferă prin spicul unicolor gălbeniu palid și cariopsele netede. — Forma cu spicul întrerupt, spicușoarele aplecate și toate cam la o parte, ceva mai micșoare, unicolore și palide constituie var. *glauca* F. Schultz in Flora an. 1862 p. 462 (= *M. nebrodensis* Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 551-non Parlat). Tot asemenea formă, dar cu spicușoarele ușor colorate constituie var. *taurica* C. Koch in linn. an. 1848 p. 395 (= *M. ciliata* β. *micrantha* Boiss. fl. orient. vol. 5 p. 589). — Și aceste din urmă varietăți au cariopsele netede. Este de cercetat dacă se găsesc și la noi.

**Eragrostis megastachya** Link hort. berol. vol. 1 p. 187 (Consp. p. 617). — Regiunea șesurilor, tărâm loess jărănos, năsipos, pe la drumuri. Hagieni, Țândărei; București, Fundeni-Mărcuța.

**E. poaeoides** P. Beauv. agrost. p. 71 (Consp. p. 617). — Prundișuri, locuri cu iarbă, drumuri, holde. Lunca Prahovei la Tinoasa, Crivina; Coțorca în Ialomița; Mărășești.

**E. pillosa** P. Beauv. agrost. p. 71 (Consp. p. 618).—Pe la drumuri, căi comunale, ziduri vechi, garduri. Craiova; Otești pe malurile Cepturului distr. Oltu; Cotorca.

**Poa dăra** Scop. fl. carniol. ed. 1772 p. 70 (Consp. p. 618).—Locuri joase ierboase uscate sau aspre. Băneasa, Herestrău frecuent; Brănești, Paserea.

**P. annua** L. spe. p. 99 (Consp. p. 618).—Locuri ierboase. Govora; Curtea-de-Argeș; Predeal; Băneasa, Herestrău.

β. *supina* Rchb. fl. germ. excurs. p. 46 (1830); ejus icon. fl. germ. vol. 1 fig. 388. **P. supina** Schrad. fl. germ. vol. 1 p. 289 (1806); Schur enum. transs. p. 777. *P. annua* β. *varia* Gaud. fl. helv. vol. 1 p. 243 (1828); Koch syn. p. 926; Grec. consp. p. 618. Tuferișe pe coastele pietroase. Vârciorova la gura Bahnei.

**P. laxa** Hænke fl. sudet. p. 188 (Consp. p. 618). Regiunea alpină. Parângu pe Gruiu și Păcleșu, Negoiu (pl. indig. 1899) și munții săi Lespezi și Paltina; Rarău și Petrile-Doamnei.

**P. minor** Gaud. fl. helv. vol. 1 p. 253 (Consp. p. 619).—Regiunea alpină. Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901).

**P. alpina** L. spe. p. 99 (Consp. p. 619).—Regiunea alpină. Parângu pe Prislopu; în Argeș pe Prislopu (pl. indig. 1899); Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901); în Suceava pe Rarău și Petrile-Doamnei.

**P. violacea** Bell. append. ad. fl. pedem. p. 8 (Consp. p. 620).—Regiunea alpină. Parângu pe Gruiu.

**P. nemoralis** L. spe. p. 102 (Consp. p. 620).—α. *vulgaris* Koch syn. p. 929; Rchb. icon. fl. germ. vol. 1 fig. 405 (Consp. l. c.).—Păduri umbroase. Dobrogea septentrională pe la Cocoși, Taița.

β. *flaccida* Grec. consp. a. 620.—Stânci, coaste abrupte în vai montane umede umbroase. Pe Lotru sus la Vidra în gura Pravățului; pe Argeș la Cumpăna în valea Caprei, în Cheea-Argeșului, Curtea-de-Argeș la Râpa-cu-brazi.

**P. trivialis** L. spe. p. 99 (Consp. p. 621).—Livezi. Predeal; Cămpina; Dobrovăț (distr. Vaslui).

Adiție dupe aceasta (Consp. p. 621):

\* **11<sup>b</sup>. P. Chaixii** Vill. fl. delph. in Gilib. syst. pl. europ. vol. 1 (1785); Duv.-Jouve bull. soc. botan. de france tome XI p. 78 (1863); Simk. enum. transs. p. 580. *P. sudetica* Hænke fl. sudet. p. 120 (1791); Koch syn. p. 930; Gren. Godr. fl. fr. vol. 3 p. 545; Rchb. icon. fl. germ. vol. 1 fig. 421; Schlechtend. Langeth. deutsch. fl. vol. 8 fig. 702; Grec pl. indig. anu 1900 p. 46. *P. silvatica* Vill. pl. dauph. vol. 2 p. 88 tab. 3 (1786). non Poll.—4 Iunie. Iulie. Păduri montane la locuri umede umbroase. Predeal în valea Roșnovei spre fund (pl. indig. 1901); Buceci în valea Jepilor pe latura Caraimanului (pl. indig. 1901); munții Slănicului.

**P. pratensis** L. spe. p. 99 (Consp. p. 621).—Adiție: vulgar *Firișor*.

\*  $\times$  *P. trivialis-pratensis* Sanio ap. Aschers. et Græbn. syn. mitt. europ. fl. vol. 2 p. 434. — Locuri um de umbroase. Lunca Prahovei la Tinoasa.

Are toată înfățișarea și caracterele de *P. pratensis* L.; însă prin culmul său aspru în partea inferioară și cu osebite prin ligula prelungă ține de *P. trivialis* L.

**Glyceria aquatica** Wahlenb. fl. gothob. p. 18 (Consp. p. 622). — Locuri bătoase, stufării. Lunca Prahovei pădurea Tinoasa.

Adiție sub aceasta:

\* *β. arundinacea* Aschers. fl. brand. vol. 1 p. 851 (1864); Aschers. et Græbn. syn. mitt. europ. vol. 2 p. 452. **Poa arundinacea** M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 1 p. 60 (1808). *Glyceria arundinacea* Velen. fl. bulg. p. 620. *G. remota* Griseb. in Ledeb. fl. ross. vol. 4 p. 391 (1853), Boiss. fl. orient. vol. 5 p. 613-non Fries. *G. retinosa* Velen. Beitr. fl. bulg. 1886 *G. aquatica β. flaccida* Lindem. fl. cherson. 2 p. 298. Locuri bătoase. Adj. d.

Diferă de forma specifică proprie: prin foile sale având limbul mai lung, mai îngust și lung atenuat la vârf, scabre pe pagina lor superioară, expresiv nervate pe cea inferioară și cu nervișoare transversale perpendicular îmbinate cu cele longitudinale în rectaungule dispuse; prin panicula sa mult mai amplă (30–50 cent. în lungime) și mai ramificată, laxă și cam aplecată (nutantă), având rachisul neted, ramificațiile mult mai lungi, flexuoase, subțiri sau filiforme, desfăcute în ramurile capilare lungi și divaricate; spicușoarele mai mici, lungulețe. a 3–5 flori.

**G. plicata** Fries novit. mant. vol. 3 p. 176 (Consp. p. 633).—Locuri bătoase, stufării. În bălțile dunarene din cuprinsul Macin, Turcoaea, Iglița.

De stramutat *Glyceria nemoralis*, pusă din eroare ca *var. subt Gl. fluitans* în Consp. p. 634, și a-o pune sub *Gl. plicata* ca varietate, astfel:

*b. nemoralis* Uechtr. 41<sup>o</sup> jahresb. schles. gesel. p. 97 (1864); Simk. enum. transs. 581. **G. nemoralis** Uechtr. et Koernicke in bot. zeit. 1866 p. 121; Schlechtd. Langeth. deutsch. fl. vol. 8 fig. 709; Sag. et Schn. fl. carp. centr. vol. 2 p. 548. *G. nemoralis b. contracta* Aschers. et Græbn. syn. mitt. europ. vol. 2 p. 450 (1900). Locuri mlăștinoase, tuferișe. Predeal în valea Roșnovei spre fund.

De slabă diferență de precedentă, caracterizată oarecum prin ligula foilor în totul fimbriată, dar mai ales prin panicula sa astrânsă (contractă) și mai egală ce, de altfel, și ea în timpul antesei este cam aplecată; spicușoarele mai mici, 5–10 mm și ceva mai îngusticele, deci florile mai mici, glumele au nervurile mai puțin pronunțate: cele trei majore ajung până la varf, cele intermediare se pierd pe la mezloc.

Subt *Glyceria distans* Wahlenb. (Consp. p. 623) se va adăuna varietatea:

\* *β. limosa*.—*Atropis distans α. limosa* Schur enum. transs. p. 77 (1866). *Festuca distans b. limosa* Simk. enum. transs. p. 585 (1886). — Pe locuri mlăștinoase sărate. Marginea lacului Techirghiol despre Sana-torul Eforiei.

Culmul înalt ca 40—60 cent. nu prea erect; foile glauce, subcon-volute, nu prea rigide; panicula patulă, trece de 20 cent., ramurile și ra-musculele neegale, scabre, în înflorire aduse în sus; spiculele a 5—8 flori purpurine, florile la bază pe nervuri cu mici perișori, glumele și glume-lele ușor acute și a 5 nervure prea puțin manifeste.

Se va suprima *Glyceria distans β. convoluta* Grec. consp. p. 623, înlocuindu-se prin următoarea specie:

\* 5. *G. salinaria*.—*Festuca salinaria* Simk. enum. transs. p. 586 (1886) et botan. transs. recentiores. *Atropis intermedia* Schur enum. transs. p. 780 (1866)-non Roem. et Sch. sub *Festuca* syst. veget. vol. 2 p. 715 (1817) nec Klinggræf. fl. preuss. p. 491 (1848).—4 Iulie. Aug. Pe locuri sărate, pe lângă lacurile sărate. Măcin valea Slatina spre Greci; Constanța pe la Tăbăcăria-veche; marginea lacului Techirghiol sub stabilimentul balnear Movilă.

Din cele ce am putut observa în urmă, putem susține că adevărata specie de *G. convoluta* Fries, așa cum există în Europa meridionalo-occidentală, nu există în părțile noastre.

*Catabrosa aquatica* P. Beauv. agrost. p. 97 (Consp. p. 623).—Locuri băltoase, stufării. Lunca Prahovei pădurea Tinoasa.

*Molinia caerulea* Moench meth. p. 183 (Consp. p. 623).—Livezi în regiunea montană inferioară. Slănic, mănăstirea Neamțu.

*Cynosurus cristatus* L. spe. p. 105 (Consp. p. 625).—Adiție: vulgar *Peptenarița*. Livezi montane. Pe Argeș la gura Budei; Predeal, Azuga; Bușteni (pl. indig. 1901).

*Festuca ovina* L. spe. p. 108 in sensu stricto; Rchb. icon. fl. germ. vol. 1 fig. 294. *F. ovina α. vulgaris* Koch syn. p. 938 excepto forma tenuifolia et capillata. *F. ovina α. genuina* Gren. Godr. fl. fr. vol. 3 p. 570. *F. ovina vulgaris α. genuina* Sag. et Schn. fl. carp. centr. vol. 2 p. 550. *F. euovina var. 2<sup>o</sup> vulgaris* Hack. monogr. festuc. p. 86. Consp p. 625.—Livezi montane. Buceci pe Furnica și Vârful-cu-Dor (pl. indig. 1901); Slănic pe muntele Șandru.

\* *b. sciaphila* Aschers. et Græbn. syn. mitt. europ. vol. 2 p. 468. *F. sciaphila* Schur enum. transs. p. 787 (1866). *F. euovina var. 2<sup>o</sup> vul-garis b. hispidula* Hack. monogr. festuc. p. 86 (1882).—Livezi pe munții de la Greci.

**F. supina** Schur. enum. transs. p. 784 (Consp. p. 626). — Livezi montane alpine. Parângu pe Pâcleșu și poalele Mirului-Mare (1400 m.); Negoiu la stâna Podeanului și pe Paltina.

**F. sulcata** Hack. monogr. festuc. p. 100:— $\gamma$ . *colorata* Schur enum. transs. p. 788 (Consp. p. 627). — Adiție: sinonimii *F. saxatilis* Schur l. c. p. 791. *F. glaberrima* Schur l. c. p. 791. *F. canescens* Rchb. icon. fl. germ. vol. 1 fig. 306-non Host. *F. sulcata* var 5<sup>o</sup> *genuina* subvar.  $\zeta$ . *saxatilis* Hack. monogr. festuc. p. 105 (1882). — Livezi. Slănic pe muntele Șandru.

A suprima pe *F. sulcata* var.  $\delta$ . *megaphylla* (Consp. p. 627), fiind sinonimă cu *F. sulcata* *genuina* și păstrând în această specie varietățile  $\beta$  et  $\gamma$  din Conspect.

**F. pseudovina** Hack. monogr. festuc. p. 214 (1882); ejus ap. Kern. in sched. ad fl. austro-hung. fasc. 1 n<sup>o</sup>. 281; Grec. consp. p. 628. — Livezi la locuri uscate. București parcul de la Șosea; Comana; Dobrogea la Greci, Acpunar.

**F. heterophylla** Lam. fl. fr. edit. 1<sup>o</sup> p. 600 (Consp. p. 628). — Adiție: sinonimu *F. rubra* subsp. *I. heterophylla* Hack. monogr. festuc. p. 128. — Livezi montane. Slănic pe muntele Pufu.

**F. rubra** L. spe. p. 109 (Consp. p. 628). — Adiție: sinonimii *F. rubra*  $\alpha$ . *genuina* Gren. Godr. fl. fr. vol. 3 p. 574. *F. eurubra* var 1<sup>o</sup>. *genuina vulgaris* Gaud. fl. helv. vol. 1 p. 285 (1828); Hack. monogr. festuc. p. 139. — Livezi montane. Predeal pe Clăbucetu-Taurului și în livezile de la Schit; Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901).

$\beta$ . *fallax* Hack. monogr. festuc. p. 129; Sag. et Schn. carpat. centr. vol. 2 p. 556. **F. fallax** Thuill. fl. paris. edit. 1799 p. 50 (Consp. p. 628). — Livezi montane. Predeal coastele de la Schit.

\*  $\gamma$ . *barbata* Hack. l. c. p. 129. **F. barbata** Schrank 'prim. fl. salisb. p. 46 (1792). *F. pubescens* Willd. enum. hort. berol. p. 6 (1809). *F. rubra* var. *villosa* Koch. syn. p. 939. — Livezi montane. Pe Lotru sus la Vidra în gura Pravățului; Slănic pe muntele Șandru.

**F. varia** Iläenke ap. Jacq. collect. vol. 2 p. 94 (Consp. p. 629). — Adiție: sinonimu *F. versicolor* Tausch in Flora an. 1821 p. 359 ex p. — Livezi alpine. Parângu pe Prislopu; Negoiu pe Lespezi.

A se suprimă din Conspect la p. 629 **Festuca pilosa** Hall. fil. (ap. Sut. fl. helv. vol. 1) de oare ce este sinonimu speciei *Poa violacea* Bell. înscrisă la p. 620 din Conspect.

**F. montana** M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 3 p. 75 (Consp. p. 629). Păduri și văi montane subalpine umede umbroase. Pe Argeș la Cumpăna în valea Caprei și în Cheea-Argeșului; Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1901); munții Slănicului.

**F. elatior** L. spe. p. 111 var.  $\alpha$ . (Consp p. 630). — Livezi. București pe la Șosea; Brănești.

**F. gigantea** Vill. pl. dauph. vol. 2 p. 110 (Consp. p. 631).—Păduri și văi montane subalpine în locuri umede umbroase. Pe Argeș la Cumpăna în valea Caprei, pe Buda și în Cheea-Argeșului; Buceci în valea Urlătoare (pl. indig. 1901); Slănic; Monăstirea Neamțu.

**Brachypodium silvaticum** Rœm. et Sch. syst. veget. vol. 2 p. 741 (Consp. p. 631). — Păduri umbroase. Valea Bahnei la Vârciorova; Govora; Curtea-de-Argeș pe dealurile Hodiei; Brănești pădurea Pustnicu.

**Bromus sterillis** L. spe. p. 113 (Consp. p. 632). Câmpuri, poeni, la locuri aprice. Vârciorova în valea Bahnei; Chitilla; Brănești.

**B. tectorum** L. spe. p. 114 (Consp. p. 632). — Câmpuri, drumuri, garduri, locuri virane. Govora; Curtea-de-Argeș; Brănești; Măcin, Greci.

**B. ramosus** Huds. fl. angl. edit. 1762 p. 40. Grec. consp. p. 632.—Păduri, codri, dumbrave, în locuri umbroase. Poalele Bucecilor în valea Urlătoare (*B. asper* Grec. pl. indig. an. 1901 p. 27); munții Slanicului.

**B. erectus** Huds. fl. angl. edit. 1762 p. 49.—Livezi. Sinaia, Câmpina.

$\beta$ . *transsilvanicus* Grec. consp. p. 633. **B. traussilvanicus** Steud. synops. glum. vol. 1 p. 320 (1855) teste cl. Hackel; Velen. fl. bulg. p. 615 (non Schur în œst. bot. zeit an. 1860 p. 227 cujus stirps ad *B. fibrosus* Hack. pertinet).—Livezi montane. Predeal coastele de la Schit.

**B. inermis** Leyss. fl. halens. edit. 1761 p. 16 (Consp. p. 633). — Livezi, locuri ierboase. București, Băneasa; Brăila.

**B. secalinus** L. spe. p. 112 (Consp. p. 633). Livezi. Curtea-de-Argeș, în livezile din Valea Calului; Piatra-Neamțu (pl. indig. 1900).

**B. arvensis** L. spe. p. 113 (Consp. p. 634). — Livezi, locuri ierboase, căi rurale și urbane. Govora; Curtea-de-Argeș; Câmpina.

**B. commutatus** Schrad. fl. germ. vol. 1 p. 353 (Consp. p. 634).—Câmpuri, căi rurale și urbane. Brănești; Fetești, Hagieni; Brăila.

**B. mollis** L. spe. p. 112 (Consp. p. 634).—Livezi, locuri ierboase, drumuri. Govora; Curtea-de-Argeș; pe Argeș la gura Budei; Predeal; Câmpina.

**B. patulus** Mert. et Koch deutsch. fl. vol. 1 p. 685 (Consp. p. 634).—Câmpuri. Brănești; Măcin, Greci.

**B. squarrosus** L. spe. p. 12 (Consp. p. 635).—Câmpuri, locuri aprice. Comuna Blegii distr. Argeș (pl. indig. 1900); Zăpodenii distr. Vaslui (pl. indig. an. 1901); stepele Ialomiței pe la Hagieni, Țandărei; Măcin, Greci.

Adiție dupe *Hordeum vulgare* (Consp. p. 635):

\* **Hordeum distichum** L. spe. p. 125. *H. spontaneum* C. Koch in linn. tom. XXI p. 430 (1848). *Zeocriton distichum* P. Beauv. agrost. p. 115 (1812). Vulgar. *Orzoac*. În cultura și subspontanu.



**H. murinum** L. spe. p. 126 (Consp. p. 635). Locuri ierboase, căi comunale, locuri virane, păragini. Govora; Curtea-de-Argeș; Măcin; Techirghiol.

Adiție dupe acesta:

\* **H. maritimum** Wither. botan. arrang. p. 172 (1776); Koch syn. p. 956; Rchb. icon. fl. germ. vol. 1 agrost. fig. 250; Gren. Godr. fl. fr. vol. 3 p. 595; Boiss. fl. orient. vol. 5 p. 687. *H. marinum* Huds. fl. angl. edit. 2<sup>o</sup> (1778) p. 57. *H. geniculatum* All. fl. pedem. vol. 2 p. 259 (1776).—  
 ☉ Iunie-Septemvre. Locuri joase umede sau uscate năsiptoase. Ivești distr. Tecuci (P. Enculescu).

**H. Caput Medusæ** Coss. et Dur. explor. scient. alger. vol. 2 p. 198 (1856): *var. asperum* A. Degen ap. Aschers. et Græbn. syn. mitt. europ. vol. 2 p. 744 (1902). *Cuviera Caput Medusæ var. aspera* Simk. in termés. közlem. vol. 29 pótf. 230 (1897 Novemb.) cum descriptione. *Hordeum Caput Medusæ* Grec. consp. p. 636. *Elymus Caput Medusæ* L. spe. p. 123 ex p. *E. crinitus* Sadler fl. comit. pestin. ed. 1<sup>o</sup> p. 85; Koch syn. p. 954; Heuff. enum. banat. p. 199; Brânză prodr. p. 503-non Schreb. *Hordeum crinitum* Hack. natur. pflanz. famil. vol. 2 p. 88-non Desf.—  
 ☉ Mai. Iunie. Câmpuri la locuri aprice, lœss năsiptos. Segarcea în Dolji (P. Enculescu); poalele munt. Pricopanului la Măcin spre Greci.

**H. europæum** All. fl. pedem. vol. 2 p. 260 (Consp. p. 636)—Păduri montane. Slănic pe muntele Șandru.

**Agropyrum caninum** Rœm. et Sch. syst. veget. vol. 2 p. 756 (Consp. p. 637).—Păduri, tuferișe, în locuri umbroase montane. Azuga, Bușteni pe malurile Prahovei și în pădurile locale (pl. indig. 1901).

**A. repens** P. Beauv. agrost. p. 102 (Consp. p. 737).—Adiție: vulgar *Albei. Ragalie*.—Specie comună.

**A. glaucum** Rœm. et Sch. syst. veget. vol. 2 p. 752 (Consp. p. 637). Livezi, câmpuri, locuri pietroase. Vârciorova; Câmpulung; Crivina; București; Măcin, Constanța.

\* **β. villosum**.—Livezi montane. Predeal pe coastele de la Schit.

Diferă de *A. barbulatum* Schur enum. transs. p. 809 (*A. pilosum* Schur olim) prin foile sale pestetot mult pîroase, nu glabriuscule și numai pe margini scabre; prin spicurile sale ale căror spicușoare glabre abia la vîrf puțin barbulate nu pe dos hirsute și marginea lungicel piloso-barbate.

Adiție dupe acesta:

\* **4<sup>b</sup>. A. junceum** P. Beauv. agrost. p. 146 (1812); Rchb. icon. fl. germ. vol. 1 agrost. fig. 267. *Triticum junceum* L. mant. altera p. 327 (1771); Koch syn. p. 951. *T. farctum* Viv. annal. bot. tom. I vol. 2 p. 159 (1804). 4 Iulie. August. Năsipuri maritime. Techirghiol-Movilă pe dunele despre barcagii.

Planta noastră are o înfățișare robustă întru toate părțile sale: rizomă lungă țeapănă și stufoasă; culmii plini, vârtosi; foile rigide, tenace, au marginile convolute și spre vîrf subulate, glauce ca și toată planta; spicul foarte lung, rachisul robust a 8—15 spicușoare mari ce trec de 3 cent. în lungime, distanțe și distice (*formă giganteica*). Nu cumva *A. junceum megastachyum* Fries mant. vol. 3 p. 12?

**A. elongatum** P. Beauv. agrost. p. 102 (Consp. p. 637). — Livezi, locuri ierboase, locuri aspre. Curtea-de-Arges pe Sânicora; Valea Călugărească; Slănic; malul mării la Techirghiol-Movilă.

**A. cristatum** Bess. enum. pl. volh. podol. bess. p. 41 (Consp. p. 638). — Câmpuri la locuri aprice, tărâm fertil și de cultură. Stepele Ialomitei la Fetești, Hagieni; Brăila; Adjud: *forma macrostachya*; Măcin, Turcoaea, Carcaliu; pe malul mării la Techirghiol-Movilă.

**Lolium temulentum** L. spe. p. 122 (Consp. p. 629). — Adiție: vulgar *Salbăție* (în Moldova).

Adiție dupe *Secale cereale* L. (Consp. p. 638):

\* **2. Secale fragile** M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 3 p. 93 (1819); Ledeb. fl. ross. vol. 4 p. 334; Rchb. icon. fl. germ. vol. 1 agrost. fig. 273; Boiss. fl. orient. vol. 5 p. 671. *S. cereale* M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 1 p. 84 (1808)-non L. *S. glaucum* d'Urv. enum. p. 12 (1822) sec. descriptione. — ☉ Iulie-Septemv. Locuri uscate, năsipuri. Ivești distr. Tecuci (P. Enculescu).

**Nardus stricta** L. spe. p. 77 (Consp. p. 640). Regiunea alpină. Parângul pe Mirul-Mare; Negoiu pe Lespezi și Paltina, cam pe la 2000 m.

## TYPHACEÆ St. Hilaire.

**Typha latifolia** L. spe. p. 1377 (Consp. p. 460). — Adiție: vulgar *Bațea*, *Berbecuț*, *Bucșău*, *Culm*. — Specie foarte răspândită în regiunea bălților dunărene și interne ale țării.

Adiție dupe aceasta:

\* **1<sup>b</sup>. T. Shuttleworthii** Koch et Sonder in Koch syn. p. 786 (edit. 2<sup>o</sup> an. 1844); Rchb. icon. fl. germ. vol. 9 fig. 746. *T. transsilvanica* Schur enum. transs. p. 637 (1866). *T. latifolia* var. *involutrata* Simk. in magyar. növenit. lap. vol. 2 p. 152 (1878). — 4 Iulie. August. Mlăștini, tărâm de aluvium, pe albia Prahovei între Breaza și Comarnic (*T. transsilvanica* Grec. pl. indig. an. 1899 p. 14).

Ca 70 cent. până la 1 m. înălțime. Foile verzi, linear-înguste (6 mm.—10 mm. lățime) merg îngustându-se spre vârf, devenind acute. Spicurile cilindrice, contigue, cu o foaie bracteală între ele: spicul mascul aproximativ egal cu cel feminin care este cu ceva mai gros și mai oacheș în-

chis prin uscare. Astfel, diferă de *T. latifolia* L. prin talia și portul său mult mai micșorate (Grec. l. c.).

**T. angustifolia** L. spe. p. 1377 exclus. var.  $\beta$ . (Consp. p. 641). — Ape stagnante, bălți, gropi, șanțuri ude. Curtea-de-Argeș la Flămânzeni, Oești; Slănic; Brăila în ostrovu Chiciu-Măcinului etc.

**Sparganium ramosum** Huds. fl. angl. ed. 2<sup>o</sup> (1778) p. 401 (Consp. p. 641). — Ape stagnante, bălți, stufării, gropi șanțuri ude. — Curtea-de-Argeș la Flămânzeni; lacul Sineasca pe Mostiște în Ilfov etc. — Specie răspândită la noi.

### ARACEÆ Endl.

**Arum maculatum** L. spe. p. 1370 (Consp. p. 641). — Adiție: vulgar *Hribă. Marceți*. — Păduri. Craiova în lunca Jiului (pl. indig. 1900); Câmpina pe dealuri (pl. indig. 1899).

**A. orientale** M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. 2 p. 407 (Consp. p. 642). — Pădurea Otopeni; pădurea Trifești distr. Roman (pl. indig. 1901).

### NAIADACEÆ Endl.

**Potamogeton natans** L. spe. p. 182 (Consp. p. 642). — Adiție: vulgar *Broscariță*. Ape stagnante, bălți, heleșteuri. Lacul Sineasca pe Mostiște și la Scuipați.

Adiție dupe acesta:

\* **1<sup>b</sup>. P. fluitans** Roth tent. fl. germ. vol. 1 p. 72 (1778) și vol. 2 p. 202 (1789); Koch syn. p. 776; Rchb. icon. fl. germ. vol. 7 fig. 83; Gren. Godr. fl. fr. vol. 3 p. 312; Boiss. fl. orient. vol. 5 p. 16. *P. natans*  $\beta$ . *fluitans* Chamisso adnot. p. 4 (1815). *P. oblongus a. fluitans* Mey. chloris hanov. p. 519 (1836). — 4 Iulie. August. Ape limpezi stagnante. București, heleșteul Floreasca, Herestrău.

**P. lucens** L. spe. p. 183 (Consp. p. 642). — Ape limpezi stagnante. Lunca Prahovei pădurea Tinoasa.

**P. crispus** L. spe. p. 183 (Consp. p. 643). — Ape limpezi stagnante. București heleșteul Floreasca, Herestrău, Fundeni-Mărcuța.

\* *b. serrulatus* Rchb. deutsch fl. vol. 7 p. 28 et icon. fl. germ. vol. 7 fig. 52. — București în heleșteul Floreasca, Herăstrău.

**P. pusillus** L. spe. p. 184 (Consp. p. 648). — Pe Colentina în heleșteul de la Buftea și la Fundeni-Mărcuța; Monăstirea Pasărea și Căldărușani; pe Sușea în Putna; valea Bistriței în bălțile de la Bacău (pl. indig. 1899).

**P. pectinatus** L. spe. p. 183 (Consp. p. 643). — Ape limpezi stagnante. Slăvinești distr. Neamțu (pl. indig. 1900).

**Zostera marina** L. spe. p. 1373 (Consp. p. 643) — Plantă marină immersă, vulgar numită *Iarba-marei*, *Reigrass-de-mare*. Litoralul mării la Techirghiol-Movilă și Tuzla, unde talazurile mării depun mari cantități pe năsipuri.

**Zanichellia major** Bœningh. ap. Rchb. fl. germ. excurs. p. 7 (1830). et icon. fl. germ. vol. 7 fig. 24 (Consp. p. 643). Adiție: vulgar *Matrița*.

Dupe aceasta (Consp. p. 644) adiție genul și speciile următoare:

\* 5. **NAIAS** L: gen. n° 1096.

\* 1. **N. major** All. fl. pedem. vol. 2 p. 221 (1785); Roth tent. fl. germ. vol. 2 p. 499 (1793); Koch syn. p. 783; Gren. Godr. fl. fr. vol. 3 p. 322; Boiss fl. orient. vol. 5 p. 27. *N. marina* α. L. spe. p. 1441. *N. fluviatilis* Lam. encycl. méth. vol. 4 p. 416 (1797). — ☉ August-Octomvre. In ape limpezi stagnante. Pe Colentina în heleșteuri la Herestrău, Floreasca (Z. Panțu exsic.), Fundeni-Mărcuța.

\* 2. **N. minor** All. fl. pedem. vol. 2 p. 221 (1785); Koch syn. p. 783; Boiss. fl. orient. vol. 5 p. 28. *N. marina* β. L. spe. p. 1441. *Caulinia fragilis* Willd. acta berol. ann 1798 p. 88 tab. 1; Gren. Godr. fl. fr. vol. 3 p. 322. — ☉ August-Septemvre. Plantă immersă în ape limpezi stagnante. București la Satu-Nou spre Ciorogârla (Z. Panțu exsic.) și pe Colentina în heleșteul Fundeni-Mărcuța.

### III. SPOROGENE SAU CRIPTOGAME.

#### CLASA IX.

#### Sporogene Vasculare.

#### MARSILEACEÆ R. Br.

**Marsilea quadrifolia** L. spe. p. 1563 (Consp. p. 645). Ape limpezi stagnante. Cernica, Pantelimon; Măcin lacul Iglia.

**Salvinia natans** Hoffm. deutsch. fl. vol. 2 p. 1 (Consp. p. 645). Pe apele Colentinei heleșteul de la Buftea și la Fundeni-Mărcuța; Căldărușani pe marginea heleșteului.

#### FILICES Juss.

**Ophioglossum vulgatum** L. spe. p. 1518 (Consp. p. 645). — Locuri umede, păduri. Pădurea Nemoiu în Vâlcea (N. Iacobescu exsic.); Sinaia în livedea de la Isvoru (Gh. C. Brânză).

**Botrychium Lunaria** Swartz syn. filic. p. 171 (Consp. p. 646). Livezi montane. Predeal pe Urzicaru (pl. indig. 1900); Ceahlău valea pârului Durău și la Polița-lui-Ghidion (pl. vasc. ccăhl. p. 81).

**Polypodium vulgare** L. spe. p. 1544 (Consp. p. 647).—Adiție: vulgar *Iarba-dulce* — Stânci umede în văi subalpine. Pe Argeș la Cumpăna în valea Caprei; Căineni (pl. indig. 1899); pe Lotru la Voineasa și Vidra; dealul Măgura la Vidra în Vrancea (pl. indig. 1901); Slănic.

**Phegopteris polypodioides** Fée gen. filic. vol. 3 p. 242 (Consp. p. 647).—Stânci în văi umede umbroase subalpine. La Cumpăna în valea Caprei; Căineni din Argeș (pl. indig. 1899); Buceci în valea Ialomiței pe la Schit (pl. indig. 1899); Slănic.

**Ph. Dryopteris** Fée gen. filic. vol. 3 p. 242 (Consp. p. 647).—Locuri pietroase, stânci în văi umede umbroase. Voineasa în valea Jidoaei; Govora în valea Ilinței prin făget clina din dreapta râului; Monăstirea Suzana în Prahova; Slănic; gura Tarcăului (pl. indig. 1899); Ceahlău pe Boambe.

**Ph. Robertiana** Al. Br. in Milde höh. sporenfl. p. 45 (Consp. p. 647). Stânci în văi subalpine umede umbroase. Sinaia în valea Peleşului.

**Aspidium Lonchitis** Swartz syn. filic. p. 43 (Consp. p. 648).—Stânci în văi umede subalpine. Sinaia în valea Peleşului sus; văile Ceahlăului (pl. indig. 1901).

**A. aculeatum** Döll. rhein. fl. p. 20 (*Polystichum aculeatum* L. spe. p. 1552 in sensu lato). Consp. p. 648:

*α. lobatum* (Swartz syn. filic. p. 53 ann. 1806 pro specie) Aschers. et Græbn. syn. mitt. europ. I p. 37; Grec. consp. p. 648. — Păduri montane subalpine și prin văi umede umbroase. Pe Argeș la Cumpăna în valea Caprei și în Cheea-Argeșului; Predeal (pl. indig. 1900); Sinaia în valea Peleşului; Slănic pe muntele Dobruului.

*β. Swartzianum* Koch syn. ed. 2<sup>o</sup> p. 976 (Consp. p. 648).—Ca sinonimi încă: *A. angulare* Kit. ap. Willd. spe. pl. vol. 5 p. 257 (1810) et herb. ex parte sec. Milde in verhandl. d. zool.-bot. gesel. in wien 1867 p. 826. *Polypodium aculeatum* L. l. c. ex parte. *Aspidium aculeatum* b) *angulare* All. Br. in Döll. rhein. fl. p. 21 (1843); Luerss. farnpfl. p. 343 fig. 139 a. b. *A. hastulatum* Ten. fl. neapol. tab. 250 (1836), Simk. enum. transs. p. 606. *A. aculeatum* β. *Swartzianum subtripinnatum* Koch l. c. p. 977.—Stânci la locuri umede umbroase. Vârciorova în valea Bahnei în sus de cătunul Ilovița (an. 1907); pe Lotru la Vidra în gura Pravățului; la Negoii (pl. indig. 1900); Slănic (pl. indig. 1899)?

*γ. Braunii* Döll. rhein. fl. p. 21 (1843). **A. Braunii** Spenn. fl. friburg. vol. 1 p. 9 tab. 2 (1825). *A. angulare* Kit. l. c. ex parte; Grec. consp. p. 648. *A. pilosum* Schur enum. transs. p. 833 (1866). Pe Argeș

la Cumpăna în valea Budei și în Cheea-Argeșului; munții Slănicului; Ceahlău în valea părțului Durău (pl. vasc. ceahl. p. 82; Grinț. exsic.).

\*  $\times$  *A. lobatum-Braunii* Luer. farnpfl. p. 356 fig. 143 (1889) Synon. **A. Luerssenii** Dörf. in öest. bot. zeit. 1890 p. 227. În munții Slănicului (Marcel Br.)

**Polystichum Thelypteris** Roth tent. fl. germ. vol. 3 p. 77 (Consp. p. 649).—Locuri bătoase, stufării. Căldărușani (P. Filix mas. Grec. consp. p. 649-non Roth.); Cernica; pădure la Ciocănești (pl. indig. 1901).

**P. Filix mas** Roth tent. fl. germ. vol. 3 p. 82; Koch syn. p. 978 (Consp. p. 649):

$\alpha$ . *subintegrum*.—*Aspidium Filix mas var. subintegrum* Döll. fl. baden. p. 27 (1857); Luer. farnpfl. p. 379. *A. Filix mas genuinum* Milde nov. acta leopol. carol. tom. 26 (1858) p. 508. Păduri, văi montane. Slănic.

$\beta$ . *crenatum*. — *Aspidium Filix mas var. crenatum* Milde l. c.; Asch. et Græbn. syn. mitt. europ. vol. 1 p. 27. *A. Filix mas typicum* Luer. farnpfl. p. 372, 376. *Polystichum Filix mas var.  $\delta$ . crenatum* Grec. consp. p. 649.—Păduri, văi montane. Pe Iotru la Vidra în gura Pravățului; Ceahlău în valea părțului Durău; în Dobrogea pe la Niculițel, Telița.

\*  $\gamma$ . *deorsi-lobatum*. — *Lastrea Filix mas var. deorsi-lobata* Moore ferns great brit. and irl. nat.-pr. pl. 14—17 text p. 7 (1857). *Aspidium Filix mas var. deorsi-lobata* Milde filic. europ. p. 120 (1867); Luer. farnpfl. p. 380; Asch. et Græbn. l. c. p. 27.—Păduri, văi montane. Valea Argeșului la Cumpăna în valea Caprei.

$\delta$ . *affine* Grec. consp. p. 649 (sub var.  $\beta$ ). *Aspidium affine* Fisch. et Mey. in Hohenak. enum. talüsch. p. 10 (1838); *Polystichum affine* Ledeb. fl. ross. vol. 4 p. 515 (1853). *Lastrea Filix mas var. incisa* Moore phytol. vol. 3 p. 137 (1848). *Aspidium Filix mas var. incisa* Döll. fl. baden. p. 27 (1857); Luer. farnpfl. p. 383. *A. F. mas var. affine* Asch. et Græbn. syn. mitt. europ. vol. 1 p. 27. *A. caucasicum* Al. Br. in Flora an. 1841 vol. 24 p. 707. *Polystichum Filix mas var.  $\gamma$ . caucasicum* Grec. consp. p. 649. Păduri, văi montane. Sinaia în valea Peleşului; munții Slănicului.

Adiție dupe acesta (Consp. p. 650):

\* **2<sup>b</sup>. P. cristatum** Roth tent. fl. germ. vol. 3 p. 84 (1880); Koch syn. p. 978; Gren. Godr. fl. fr. vol. 3 p. 631; Ledeb. fl. ross. vol. 4 p. 515; Schlecht. Langeth. deutsch. fl. vol. 1 fig. 44. *Aspidium cristatum* Swartz in Schrad. journ. vol. 2 p. 37 (1800); Aschers. et Græbn. syn. mitt. eur. p. 31; Luer. farnpfl. p. 412 fig. 152. *Polypodium cristatum* L. spe. 1551).—  
4 Iulie. Aug. Stânci în văi montane umede umbroase. Pe Argeș la Cumpăna în valea Caprei; Slănic în valea Cerbului.

**P. spinulosum** DC. fl. fr. vol. 2 p. 561 (Consp. p. 650).—Păduri, văi și locuri umede umbroase. Pe Lotru la Voineasa valea Voinoșiei; în lunca Prahovei pădurea Tinoasa; Slănic valea Cerbului, muntele Șandru.

β. *dilatatum* Koch syn. p. 979 (Consp. p. 650).—Pe Argeș la Cumpăna în valea Caprei și în Cheea-Argeșului; Buceci valea Jepilor (pl. indig. 1901); munții Slănicului.

**Cystopteris fragilis** Bernh. in Schrad. neu. journ. vol. 1 pars 2<sup>o</sup> p. 26: *genuinum* (Consp. p. 650).—Locuri umede umbroase, stânci. Vârciorova stâncile de la gura Cerovățului și în sus pe Bahna; valea Jiului la Păiuș, Lainici; pe Argeș în valea Budei spre fund; Slănic; în Vlașca pădurea între Malu-Spart și Crevedia-Mare (Profes. Em. C. Teodorescu: aci de mirare!); Măcin pe munții Pricopanului; Oglinzi distr. Neamțu (pl. indig. 1901); Ceahlău.

**C. sudetica** Al. Br. et Milde schles. gesellsch. 1855 p. 92 (Consp. p. 651).—Stânci montane, văi umbroase subalpine. Gura Tarcăului (pl. indig. 1899).

**Athyrium Filix femina** Roth tent. fl. germ. vol. 3 p. 61—67 (Consp. p. 651).—Păduri montane, locuri umede umbroase. Cheea-Argeșului și pe muntele Arefu; la Cumpăna în valea Caprei: *var fissidens* Milde fl. europ. p. 50, *Asplenium Filix femina var. fissidens* Döll. fl. baden. p. 24; munții Slănicului: *var. fissidens* Milde l. c. et *var. multidentata* Milde l. c.; Lueress. farnpfl. p. 141 fig. 99 101, *Asplenium Filix femina var. multidentata* Döll. rhein. fl. p. 12.

**A. alpestre** Rylands in Moore ferns. of great brit. an. irl. nat. pr. pl. VII (1857); Lueress. farnpfl. p. 143 fig. 102 (Consp. p. 651).—Stânci montane. Vârciorova la gura Corovățului pe stâncile din stânga chiar la intrare.

**Asplenium viride** Huds. fl. angl. ed. 1 (1762) p. 385 (Consp. p. 651).—Stânci în văi alpine și subalpine la locuri umede. În Parângu pe Găuri în sus de stână și la poalele Mândrei; pe Negoiu și Lespezi; Buceci pe Caraimanu (pl. indig. 1899); Ceahlău; Rarău pe Piatra-Zîmbrului și pe Pietrile-Doamnei.

**A. Trichomanes** L. spe. p. 1540 (Consp. p. 651). Stânci montane. Vârciorova în valea Bahnei; Cheea-Argeșului; Slănic; Măcin pe munții Pricopanului; Ceahlău la Piatra-Lată (pl. vasc. ceahl. p. 82).

**A. Adiantum nigrum** L. spe. p. 1541 (Consp. p. 562).—Stânci montane. Măcin pe munții Pricopanului: *var. lancifolia* Heufler zool. bot. ver. tom. 6 an. 1856 p. 310, Grec. pl. indig. 1901.

**Blechnum spicant** Roth tent. fl. germ. vol. 3 p. 44 (Consp. p. 653).—Stânci în văi montane alpine, subalpine. La Negoiu pe Paltina; Slănic (pl. indig. 1901 și în urmă de Marc. Br.).

**Pteris aquilina** L. spe. p. 1533 (Consp. p. 653). — Păduri, poeni în regiunea montană alpestră. Govora; Slănic.

β. *lanuginosa* Kaulf. enum. filic. p. 189 (Consp. p. 653). — Slănic pe muntele Pufu.

**Struthiopteris germanica** Willd. enum. hort. berol. p. 1071 (Consp. p. 653). — În regiunea montană la locuri joase umede pe lângă apă. Slănic; pădurea Dobrina la Huși (pl. indig. 1901).

### LYCOPODIACEÆ DC.

**Lycopodium Selago** L. spe. p. 1565 (Consp. p. 654). — Stânci montane, locuri pietroase în regiunea alpină, subalpină. În Argeș pe Suru și Prislopu (pl. indig. 1899); la Negoiu pe Lespezi, Paltina și Clăbucetu; Slănic pe muntele Șandru; Ceahlău valea Isvoru-Alb și la Panaghia (pl. vasc. ceahl. p. 82).

**L. annotinum** L. spe. p. 1566 (Consp. p. 654). — Locuri pietroase tapetate cu muschi sau iarbă, poeni subalpine. Pe Lotru sus la Vidra în gura Pravățului; în Argeș pe Prislopu (pl. indig. 1899) și pe Clăbucetu; munții Slănicului și pe Șandru.

**L. clavatum** L. spe. p. 1564 (Consp. p. 654). — Poeni subalpine, locuri pietroase tapetate cu muschi sau iarbă. Slănic pe muntele Șandru.

**Selaginella helvetica** Spring. ap. Döll. rhein. fl. p. 39 (Consp. p. 654). — Văi montane subalpine, pe lespezi umede. Pe Lotru valea Voinășiței; pe Zănoaga (pl. indig. 1899) și la Cumpăna în valea Budei spre fund pe stânci.

**S. spinulosa** Al. Br. ap. Döll. rhein. fl. p. 38 (Consp. p. 655). — Stânci în regiunea alpină pe locuri umede. La Negoiu pe Podeanu (anu 1907); Ceahlău (pl. indig. 1900).

### EQUISETACEÆ DC.

**Equisetum Telmateja** Ehrh. Beitr. vol. 2 p. 159 (Consp. p. 655). — Locuri umede mlăștinoase sau scurse, pe lângă păduri și prin lunci. Govora; Curtea-de-Argeș spre Râpa-cu-Brazi; pădurea Tinoasa (ramuri fertile și sterile); Valea Călugărească; Măcin la balta Igliza (ram. sterile). Adiție: vulgar *Barba-sasului*.

β. *serotinum* Milde Denkschr. schles. Gesell. p. 187 (1853); Luer. Farnpfl. p. 679. — Lunca Neajlovului pe la comuna Zădărici; Slănic.

**Eq. arvense** L. spe. p. 1516 (Consp. p. 655). — Locuri umede humifere sau nășipoase inundate sau scurse, miriști, lunci, păduri. Curtea-de-Argeș; pădurea Tinoasa (ram. fertile și sterile); Slănic.



β. *nemorosum* Al. Br. ap. Döll. rhein. fl. p. 27 (Consp. p. 655).—Pădurea Tinoasa (steril).

\* γ. *ramulosum* Rupr. distrib. cryptog. vasc. imp. ross. p. 19 (1845): *forma decumbens* Lueress. farnpfl. p. 694.—Pruniș, pe albia râului Slănic la Slănic (steril).

Adiție după acesta (Consp. p. 655):

\* *Eq. littorale* Kuhlwein in Rupr. fl. ross. diatr. beitr. pflanzenk. russ. reichs. vol. 4 p. 91 (1845); Simk. enum. transs p. 614; Lueress. farnpfl. p. 722. *Eq. inundatum* Lasch. in Rabenh. bot. centr. bl. 1846 p. 28. *Eq. arvense var. inundatum* Rabenh. cript. vol. 2 p. 333 (1848). *Eq. arvensi-limosum* Lasch. bot. zeit. 1857 p. 505. — 24 Iulie. August. Livezi în părțile de jos pe locuri umede. Slănic.

*Eq. silvaticum* L. spe. p. 1516 (Consp. p. 656).—Păduri, tuferișe, pe locuri umede în regiunea montană. Cheea-Argeșului.

\* β. *capillare* Asch. et Græbn. syn. mitt. europ. vol. 1 p. 122. *Eq. silvaticum capillare* Milde nova acta tom. 26 vol. 2 p. 433 (1853).—Păduri. Slănic valea spre Oituz.

*Eq. hiemale* L. spe. p. 1517 (Consp. p. 657).—Locuri mlăștinoase în văi montane. Pe Argeș la Cumpăna în valea Caprei; Sinaia (pl. indig. 1899); Slănic.

*Eq. ramosissimum* Desf. fl. atlant. vol. 2 p. 398 (1880); Simk. enum. transs. p. 615; Lueress. farnpfl. p. 731; Aschers. et Græbn. syn. mitt. europ. vol. 1 p. 139. *Eq. ramosum* DC. syn. plant. in fl. gall. descriptar. p. 118 (1806); Schleich. catal. plant. in helvet. sponte nascent. ed. 2<sup>a</sup> 1807 p. 27; Koch syn. p. 966; Gren. Godr. fl. fr. vol. 3 p. 645; Boiss. fl. orient. vol. 5 p. 742; Grec. consp. p. 656: — α. *altissimum* Al. Br. in Milde sporenplanz. p. 117 (1865); Lueress. farnpfl. p. 740. — Chitila; Agiud.

β. *pannonicum* Aschers. et Græbn. syn. mitt. europ. vol. 1 p. 140 (1896). *Eq. pannonicum* Kit. ap. Willd. spe. pl. vol. 5 p. 6 (1810). *Eq. ramosum b) virgatum* Al. Br. in Flora ann. 1839 p. 308; Lueress. farnpfl. p. 736. — Chitila.

\* *Eq. variegatum* Schleich. catal. pl. helvet. ann. 1807 p. 27 (Consp. p. 697).—Mlăștini, în valea Peleşului la Sinaia (pl. indig. 1899).

# APPENDIX

## PLANTÆ RARIORES ROMANIÆ HUCUSQUE INCOGNITÆ

Auct. Dr. DEM. GRECESCU

---

### Silene Lotriensis.

#### TABELLA I.

Perennis, cœspitosa, multicaulis. Caulibus pumilis, 0<sup>m</sup>,10—0<sup>m</sup>,15 altis, tenuibus, glaberrimis, simplicibus, inferne decumbentibus, subgeniculatis, superne ascendentibus erectis. Foliis viridibus, glaucis, glabris, integerrimis, margine linea albida tenuissima cincta, omnibus latioribus; radicalibus numerosis, densis, spathulato-obovatis, longiuscule attenuatis, sessilibus; caulinis oppositis, sessilibus, parce connatis amplexicaulibus, inferius obovatis, sequentibus ellipticis ovatisque (0<sup>m</sup>,015—0<sup>m</sup>,018 longis, 0<sup>m</sup>,006—0<sup>m</sup>,009 latis). Flores cymis dichasis, laxis, terminalibus lateralibusque ramulos simulantibus et non repetatis; pedunculis tenuibus filiformibusque, calyce paulo brevioribus, erecto-patulis, nonnullis subreflexis; calycis tubo longo, basi parce umbilicato, paulo inflato subcampanulato, non clavato, membranaceo, subtransparente, glaberrimo; petalorum lamina biloba, sicca pallide rosacea venulisque subtilissime pictis; carpophoro capsula longiore.—Floret Iun. Jul.

Habitu et statura *S. Lerchenfeldianæ* Baumg. similis et gregalis. Differt: præsertim foliis glaucis, latioribus, spathulato-obovatis ellipticis ovatisque; cymis regularibus terminalibus lateralibusque conformibus; calyce parum inflato, non clavato, subtransparente; petalorum lamina sicca pallide rosacea, venulosa.

In rupibus calcareis et fissuris saxorum subalpinis. Ad Voineasa, in convalle «Jidoaea» dicta, secundum rivulum Lotru (distr. Vâlcea).

*Obs.*—Figura reproducă înfățișează planta în mărimea sa reală.

## Melilotus arenaria

### TAB. II

Biennis vel perennis (?), altissima. Radice crassa, longiore, multicauli. Caulibus erectis, firmis, 1<sup>m</sup>—1<sup>m</sup>,50 et ultra altis, inferne glabris, leviter angulatis, superne etiam ramis pubescenter pilosis, ramis primariis longissimis, ca 0<sup>m</sup>,40—0<sup>m</sup>,60 et ultra, caulium similibus. Foliorum foliolis obovato-oblongis, terminali longiore, omnibus argute dentato-serratis, superne rotundatis mucronulatis, supra viridibus glabris, subtus pallidioribus pubescentibusque, stipulis integerrimis setiformibus. In axilis caulinarium atque ramealium foliorum 3—5 pedunculis fascicularibus effusis inæqualibus emissis ramulo immixto incipiente, pedunculis inæqualibus, plerisque brevioribus debilibus, paucifloris : uno excepto, valido, longissimo, fructifero, ca 0<sup>m</sup>,15 et ultra longo, firmo, rigido, multifloro, patulo et in summo subarcuato-deflexo; pedunculis a basi longe differente quod speciebus cognitis non occurit. Floribus pendulis, longe remotis, majusculis, flavis odorantibus; calycis tubo campanulato, pubescente, nec fisso, pedicello brevior, dentibus inæqualibus; vexilio alis carinisque sublongiore. Leguminibus pendulis, brevistipitatis, ovato-suboblongis acuminatis, acute carinatis calycis tubo 4—5 longiore; pericarpio membranaceo, glabro, pallido, fragiliore, tenue reticulato-rugoso; semine ovoideo, nitido, basi profunde sulcato. Flor. fruct. Iul. Aug.

E sectione Cœlorytis Seringe: *floribus pendulis, pericarpio reticulato-rugoso*.—A. *M. officinali* Desr. et *M. altissima* Thuill. evidenter differt: statura altissima, habitu robusto, firmo, multicauli, ramis longissimis; foliolis angustioribus subtus pubescentibus, pedunculis fructiferis longissimis, firmis, rigidis, basi numerosis pedunculis minoribus, debilibus, inæqualibus, in fasciculos effusos dispositis; legumino parum majore, non transverse cutato uti *M. officinalis* Desr., nec pubescente, nec nigrescente uti *M. altissima* Thuill.

<sup>1</sup> In arenis mobilibus regionis maritimæ (gall. *dunes*). Ad Mare Nigrum in Dobrogea, inter Tuzla et Tekirghiol, prope «Sanatorul Eforiei Spitalelor» in societate *Artemisiæ arenariæ* DC., *Silene ponticæ* Branza, *Astragali virgati* Pall. etc.

Obs.—Figura dată înfățișează o ramură primară *a*, inflexă, despinsă din partea de pe la mezloc a axei caulinare primare (caulis) și în mărime redusă pe jumătate ( $\frac{1}{2}$ ) din cea reală; *b*, o foaie trifoliată cu o mică racemă axilară lăsând a se vedea câțiva legumeni. Cele mai multe raceme se văd cam șcuturate de flori și fructe, planta fiind la maturitate înaintată.

## Senecio ponticus

### TAB. III

Perennis. Radice obliqua vel repente, etiam stolones tenuiores subterraneos emittente, parvis atque distantibus squamulis. Caule robusto, alto et rigido, pubescenti-araneoso, simplici ramosissimove, ample, composite et laxo corymboso. Foliis suboblongis, in circuitu obovatis, supra intense viridibus et araneoso-floccosis, subtus valde araneoso-lanuginosis et canescentibus; ad minora specimina foliis inferioribus paulo minoribus, basi attenuatis, mediis et superioribus sessilibus, amplexicaulibus, auriculis et limbo profunde et grosse inciso-serratis; ad majora specimina omnibus foliis caulinaribus sessilibus, auriculato-amplexicaulibus, limbo profunde sinuato-pinnatifido, laciniis inciso-serratis, omnibus marginibus subtiliter reflexis, laciniis et serraturis distantibus, lanceolato-acuminatis. Corymbo amplissimo, pleiocephalo, pedicellis bracteolatis, bracteolis laxo patentibus. Capitulis mediocribus, hemisphæricis, basi calyculato adpresso; ligulis flavis, involucri multo-longioribus. Acheniis pubescentibus et æqualiter papposis.—Flor. Iul. Aug.

E sectione J a c o b æ DC: *capitulis radiatis, involucri calyculato, acheniis pubescentibus*. Habitu *S. erucifolio* L. a quo indumento abunde arachnoideo-lanuginoso et canescenti caulium et foliorum differt et sectione foliorum profunde et grosse inciso-serratis, laciniis et serraturis omnium acutis distantibus. Radice stolonifera, stolonibus tenuioribus, sterilibus. An non *Senecio grandidentatus* Ledeb. fl. ross. vol. II p. 636? cujus habitus in insula Sara tantum Maris Caspii, provinciis Caucasiciis cognitus.

In arena regionis maritimæ. Frequens in ripa Maris Nigri, ad Tekirghiol-Movila in Dobrogea.

Obs —Figura dată înfăţişează planta în mărimea redusă la jumătate (<sup>1</sup>), din cea reală.

## Nonea paniculata

### TAB. IV

Perennis. Altissima, 0<sup>m</sup>,50 et ultra, a basi ramosissima, ramis longissimis, axillaribus, paniculam amplissimam laxiflorem formans. Caule et ramis herbaceis, ascenduntibus, pilis mollibus densis pubescentibus vestitis

cum longis rarioribus pilis immixtis, ramis gracilioribus, longissimis, 0<sup>m</sup>,20 et ultra, et a medio furcatis, in cymas scorpioïdas laxifloras terminatis. Foliis oblongis lanceolatis, integris, acuminatis, pubescenti-pilosis, longis pilis setiformibus dispersis immixtis, margine densioribus, sine punctis albis pustularibus; floralibus sessilibus, basi ovatis et valde oblongis, lanceolato-acuminatis. Floribus longe pedicellatis, pedicellis gracilioribus, ca 0<sup>m</sup>,005 – 0<sup>m</sup>,010 longis, etiam post anthesin erecto-patulis; calyce adpresso piloso, 5-fido, laciniis longiusculis, angustissimis, acuminatis et conniventibus, nec tubo inflato post anthesin; corolla atro-purpurea calycem superante.—Flor. Iun. Iul.

Instar *Noneæ pullæ* DC., cujus flores similes, e sectione *Cryptantheræ perennicæ* Alph. DC.; sed præter staturam et paniculam amplitudine ab hac differt tam absentia punctorum alborum pustularium foliorum et præsertim inflorescentia amplissima laxaque, pedicellis floralibus multo longioribus, tenuioribus quam calyce haud inflato post anthesin innutante, cujus laciniis multo longioribus, acutissimis, conniventibus, non brevibus, triangularibus et parum acutis.

In solo aluvionis. In alveo rivuli Slănic, ad thermas Slănic, a Dr. Marcel Branza detecta.

*Obs.*—Figura ce înfăţişează această plantă este redusă la jumătate (1/2) din mărimea reală a plantei.

## Scrophularia elata

### TAB. V

Perennis. Radice brevi, grossa, verticali. Caule simplici, erecto, firmo, 0<sup>m</sup>,80 et ultra alto, rubescente, tetragono, expresse proeminenter angulato exalato et dense pubescente in lineam intensam albicantem in petiolorum superne sequentium latera abeuntem, in oppositione quoad atro-rubescens colorem lateralium facierum valde paucis et raris pubibus præditarum. Foliis oppositis, petiolatis, gramineo-viridibus, concoloribus, puberulis et mollibus in inflorescentiam diminuentibus, petiolis exalatis et inappendiculatis, limbo ovato-triangulari suboblongo, obtuso, expresse triplicato-dentato, ad diminuta duplicato-dentatis, basi leviter cordatis vel subtruncatis. Inflorescentia in paniculam oblonga et laxa, ramis inferioribus valde distantibus et longis; cymis sat pedunculatis, florum pedicellis brevioribus, pubescentibus glandulosisque, laxis. Calyce glabro, laciniis orbicularibus et late alboscariose marginatis. Stamina inclusis, anthera sterili (staminoda) lata reniformi. Flor. Iul. Aug.

E sectione *Scorodoniæ* Bentham: *staminibus inclusis, calycis laciniis scariose marginatis, panicula foliata* Nostra planta, inter hujus sectionis consortes, maxime affinis *S. Scorodoniæ* L., a qua habitu firmo et valde alto differt; foliis oblongioribus et expresse triplicato-dentatis; sed præsertim panicula oblonga et ramis inferne perdistantibus et longissimis.

In locis limosis. Secundum rivulum Prahova, in ripis paludosis, in silva Tinoasa dicta, ubi Dr. Marcel Branza eam detexit.

*Obs.*—Figura dată, în *a* înfăţişează planta întreagă, dar în mărimea redusă la jumătate ( $\frac{1}{2}$ ); în *b* o parte din extremitatea unei cime purtând o floare şi o capsulă pedicelele glandular păroase.

## Suæda littoralis

### TAB. VI

Annua. Caule herbaceo perrobusto, 0<sup>m</sup>,50—0<sup>m</sup>,60 alto, inferne sub-fleuxoso et crasso, a basi pyramidali-ramosissimo, ramis longissimis, subarcuato ascendentibus, summo carnosulis rubescentibus: caulibus et ramis glaberrimis glaucescentibus. Foliis 0<sup>m</sup>,025—0<sup>m</sup>,035 longis, grossis, carnosis, succulentis, glaberrimis, glaucis, superne leviter planis, dorso convexis, basi sessilibus angustioribus, summo rotundatis obtusis, iis plantæ siccis incoloribus, albicantibus, subtransparentibus; omnibus passim parvis verrucosis sporadicis areolis. Floribus axillaribus, sessilibus, 2—3 glomeratis; calyce fructifero viridescente, subinflato-carinato. Seminibus nitidis et subtilissime punctulatis.—Flor. Aug. Septem.

Inter affines consortes *S. salinariæ* Simk. simillima; sed differt: tam habitu et statura multo altiore et robusto, pyramidali ramosissimo; foliis multo longioribus, crassis, succulentis et glaucis, quam statione arenaria littorali. Haberi potest varietas perrobusta et crassior speciei Schurianæ (*Schoberia salinaria* Schur enum. transs. p. 568=*Suæda salinaria* Simk.)

*Obs.*—Figura dată înfăţişează în *a*, *a*, o mică parte de pe la mezloc din axa caulinară (caulis), purtând numeroase, lungi şi robuste ramuri primare: totul în figura aceasta este redus la mărimea pe jumătate ( $\frac{1}{2}$ ) de cum este planta în realitate; în *b*, o extremitate rameală purtând flori axilare.



## ERORI TIPOGRAFICE

---

Pag.	Linia	În loc de :	Să se citească astfel
2	30	Th. angustifolium (Talictrum)	Th. angustifolium
18	2	stânci montoane	stânci montane.
20	11	β. ambigna	β. ambigua
35	35	pisurile Caraimanului	piscurile Caraimunnlui
29	40 și 41	Să se suprimeze.	
35	38	Geranium phæum	Geranium phæum
38	2	Althaea officinallis	Althaea officinalis
48	17	deutsch. fl. fac.	deutsch. fl. fasc.
56	36	pădurea Androache	pădurea Andronache
75	35	β. diffusa	β. diffusa
76	27	dealurile Rugelului	dealurile Rugetului
83	17	Inula germanica	Inula germanica
87	24	A. compacta (Achillea)	A. compacta
89	13	Tanacetum Balsamita	Tanacetum Balsamita
90	28	regiuner alpină	regiunea alpină
99	3	Oporinnapr atensis β.	Oporina pratensis β.
102	34	Hieracium Pilosella	Hieracium Pilosella
107	5	la și Predeal	și la Predeal
107	29	Ambosiaceæ	Ambrosiaceæ
109	35	β. stenophylla	β. stenophylla
110	3	lasciniile caliciului	laciniile caliciului
110	4	lungimea corolei	lungimea corolei
112	11	Monesis grandiflora	Monesis grandiflora
113	40	G. germanica (Gentiana)	G. germanica
114	25	regulei de prioritate	regulei de prioritate
114	29	Kltaibel	Kitaibel
114	42	ssfel	astfel
114	42	Cargaților	Carpaților
115	23	brætee	bractee
118	16	a peniculă	a paniculă
118	24	sinonimu	sinonimu
123	6	la stânga Podeanului	la stâna Podeanului
125	11	Verbassnm glabratum	Verbascum glabratum
125	32	β. neglecta	β. neglecta
131	1	Ultricularia vulgaris	Utricularia vulgaris
136	24	Sidertis montana	Sideritis montana
143	5	Tuckestan	Turkestan
150	14	E. faleata (Euphorbia)	E. falcata.

# TABLA ALFABETICĂ

## DE

### SPECIILE, VARIETĂȚILE ȘI SINONIMII AICI CUPRINSE

Numirile cu litere *drepte* sunt cele capitale adoptate, numirile cu litere *italic*e sunt sinonimi, fie specii sau varietăți.

<b>A</b> butilon Avicenne Gærtn. 38.	Aconitum moldavicum Hacq. 10.	Agrostis $\beta$ . major Gaud. 177.
Acanthus longifolius Host 129.	multifidum Koch 11.	$\gamma$ . pontica Grec. 177.
Acer campestre L. 39.	Napellus L. 11.	$\delta$ . coarctata Schur 177.
platanoides L. 39.	<i>septentrionale</i> Baumg. 11.	<i>arenaria</i> Gouan 178.
Pseudoplatanus L. 89.	Stoerkianum Rchb. 11.	canina L. 177.
tataricum L. 40.	tauricum Wulf. 11.	<i>coarctata</i> Hoffm. 177.
Achillea compacta Willd. 87.	<i>toxicum</i> Rchb. 11.	<i>pungens</i> Schreb. 178.
depressa Janka 87.	Actæa spicata L. 11.	rupestris All. 177.
distans $\beta$ . stricta Koch 86.	Adenostyles Kernerii Simk. 80.	vulgaris Wither. 177.
lingulata W. et Kit. 86.	Adonis æstivalis L. 3.	$\beta$ geniculata Grec. 177.
millefoliata Grec. 87.	flammea Jacq. 3.	Aira cœspitosa L. 180.
Millefolium L. 87.	vernalis L. 4.	$\beta$ . Adræi Porc. 180.
$\beta$ . collina Beck. 87.	Walziana Simk. 4.	$\gamma$ . depauperata Grec. 180.
$\delta$ . silvatica Beck. 87.	Adoxa Moschatellina L. 77.	flexuosa L. 180.
$\epsilon$ . <i>villosa</i> Schur 87.	Aegopodium podagraria L. 68.	Ajuga hybrida Kern. 137.
Neilreichii Kern. 87.	Aethionema <i>banaticum</i> Janka 20,	Laxmannii Benth. 137.
pannonica Scheele 86.	saxatile R. Br. 20.	<i>Albersia deflexa</i> Boiss. 141.
Ptarmica L. 86.	Agrimonia Eupatoria L. 60.	<i>viridis</i> Kunth 141.
Schurii Schultz-Bip. 86.	odorata Mill. 60.	Alchemilla alpestris Schm. 53.
setacea W. et Kit. 87.	<i>procera</i> Wallr. 61.	alpina L. 54.
<i>stricta</i> Schleich. 86.	Agropyrum caninum Rœm. et Sch. 187.	<i>fissa</i> Schum. 54.
tanacetifolia All. 86.	cristatum Bess. 188.	flabellata Buser 53.
Aconitum Anthora L. 10.	elongatum P. Beauv. 188.	<i>glaberrima</i> Schm. 54.
<i>Anthora var alpinum</i> Gre. 10.	glaucum Rœm. et Sch. 187.	<i>hybrida</i> Kern. 54.
<i>Anthora var. collinum</i> Schur 10.	$\beta$ . villosum Grec. 187.	<i>pubescens</i> Koch 53.
$\beta$ . velutinum Rchb. 10.	junceum P. Beauv. 187.	pyrenaica Duf. 54.
cernuum Wulf. 11.	repens P. Beauv. 187.	vulgaris L. 53.
$\beta$ . toxicum Grec. 11.	Agrostemma Coronaria L. 30.	<i>vulgaris</i> $\beta$ . L. 53.
lasianthum Simk. 10.	Agrostis alba L. $\alpha$ . diffusa 177.	<i>Alectorolophus montanus</i> Fritsch 128.
$\beta$ . Baumgartianum Simk. 10.		Alisma Plantago L. 153.
		$\beta$ . stenophyllum Grec. 153.
		<i>Michaletii b. stenophyllum</i> Aschers. 153.



- Alisma Plantago* L.  $\beta$ . *lan-  
nceolatum* Gren. Godr.  
153.  
*Aldrovanda vesiculosa* L.  
13.  
*Allium acutangulum*  
Schr. 164.  
*ammophilum* Heuf. 164.  
*Ampeloprasmus* L. 166.  
*angulosum* L. 164.  
 $\alpha$ . *petraeum* Lam. 164.  
 $\beta$ . *majus* Trevir. 164.  
 $\beta$ . *pratense* Lam. 164.  
 $\delta$ . *flavescens* Regel 164.  
*angulosum* B. *ammo-  
philum* Asch. et  
Græbn. 164  
*Ascalonicum* L. 166.  
*atropurpureum* W. et K.  
163.  
*atroviolaceum* Boiss. 166.  
*capillare* Cavan. 165.  
*danubiale* Spreng. 164.  
*fallax* Roem. et Sch. 164.  
*flavum* L. 165.  
*fuscum* W. et K. 165.  
*globosum* Réd. 165.  
*globosum* B. *xanthicum*  
Aschers. et Græbn.  
164.  
*laxiflorum* Tausch. 165.  
*leptophyllum* Schur. 165.  
*montanum* Schm. 164.  
*moschatum* L. 165.  
*ochroleucum* Rchb. 164.  
*oleraceum* L. 165.  
*paniculatum* L. 165.  
*rotundum* L. 166.  
*saxatile* M. Bieb. 165.  
*Schœnoprasum* L. 164.  
*Scorodoprasum* L. 165.  
*senescens* Baumg. 164.  
*setaceum* W. et K. 165.  
*sphaerocephalum* L. 166.  
*Stevenii* Willd. 165.  
*Stevenii*  $\delta$ . s. Ledeb. 164.  
*transsilvanicum* Ler-  
chenf. 164.  
*ursinum* L. 163.  
*vineale* L. 165.  
*xanthicum* Griseb. 164.  
*Alnus glutinosa* Gärtn. 152.  
*incana* Willd. 152.  
*viridis* DC. 153.  
*Alopecurus brachystachys*  
Janka 176.  
*fulvus* Smith 176.  
*laguriformis* Schur. 176.  
*Alsine Gerardii* Wahlenb.  
33.  
*recurva* Wahlenb. 33.  
*Alsine verna* Bartl. 33.  
 $\beta$ . *Gerardii* Grec. 33.  
 $\gamma$ . *nivalis* Fenzl. 33.  
*Althæa cannabina* L. 38.  
*officinalis* L. 38.  
*pallida* W. et K. 38.  
*taurinensis* DC. 38.  
*Alyssum Arduini* Fritsch 17.  
*argenteum* Vitm. 18.  
*commutatum* Simk. 18.  
*desertorum* Stapf. 18.  
 $\beta$ . *ramosissimum* Grec.  
19.  
*minimum* Willd. 18.  
*minutum* Schlecht. 19.  
*montanum*  $\delta$ . *commuta-  
tum* Heuff. 18.  
*orientale* Ard. 18.  
*podolicum* Bess. 19.  
*repens* Baumg. 18.  
*rostratum* Grec. 18.  
*rostratum* Rchb. 18.  
*saxatile* L. 18.  
*saxatile* Sturm 17.  
*saxatilis* b. *subsiniatum*  
Borb. 18.  
*transsilvanicum* Schur  
18.  
*Wierzbichii* Heuf. 18.  
*Amarantus Blitum* Koch  
141.  
*Blitum a. silvestris*  
Moq.-Tend. 141.  
*deflexus* L. mant. 141.  
*pallidus* M. Bieb. 141.  
*silvestris* Desf. 141.  
*viridis* L. 141.  
*Amygdalus nana* L. 52.  
*Anacamptis pyramidalis*  
Rich. 156.  
*Anagallis arvensis* L. 138.  
*Anchusa arvensis* M. Bieb.  
119.  
*Barrelieri* DC. 119.  
*italica* Retz. 119.  
*ochroleuca* M. Bieb. 119.  
*officinalis* L. 118.  
 $\gamma$ . *procera* Lindem. 118.  
*orientalis* Rchb. 119.  
*procera* Bess. 118.  
*stylosa* M. Bieb. 119.  
*Andropogon Gryllus* L. 177.  
*Ischæmum* L. 177.  
*Andromeda polifolia* 111.  
*Androsace arachnoidea*  
Schott 138.  
*Chamaejasme* Host 138.  
*elongata* L. 138.  
*lactea* L. 138.  
*maxima* L. 138.  
*Anemone alpina* Jacq. 3.  
*Anemone angulosa* Lam. 3.  
*Hepatica* L. 2.  
*narcissiflora* L. 3.  
 $\beta$ . *uniflora* Grec. 3.  
*nemorosa* L. 3.  
*nigricans* Grec. 3.  
*Pulsatilla* L. 3.  
*ranunculoides* L. 3.  
*silvestris* L. 3.  
*Angelica silvestris* L. 71.  
 $\beta$ . *elatiar* Wahlenb. 71.  
*Antennaria dioica* Gært. n.  
84.  
*Anthemis arvensis* L. 88.  
*carpatia* W. et K. 87.  
 $\beta$ . *pyrethroides* Schur  
87.  
*Cotula* L. 88.  
*ruthenica* M. Bieb. 87.  
*tinctoria* L. 87.  
 $\beta$ . *discoidea* Grec. 87.  
*Anthericum ramosum* L.  
162.  
*Anthoxanthum alpinum*  
Schur 175.  
*odoratum* L. 175.  
 $\beta$ . *glaberrimum* Schur 175.  
*Anthriscus alpestris* Wimm.  
72.  
*lejocarpa* Simk. 73.  
*nemorosa* Spreng. 73.  
*silvestris* Hoffm. 73.  
*torquata* Heuff. 73.  
*trichosperma* Schult. 73.  
*Apera Spica-venti* P. Beauv.  
177.  
*Aposceris foetida* Less. 98.  
*Aquilegia nigricans* Baumg.  
9.  
*paraplesica* Schur 10.  
*transsilvanica* Schur 10.  
*Arabidopsis Thaliana*  
Schur 17.  
*var. simplex* Grec. 17.  
*Arabis alpina* L. 14.  
*var.  $\gamma$ . nana* Baumg. 14.  
*constricta* Griseb. 14.  
*Hallerii* L. 15.  
*hirsuta* Scop. 14.  
 $\beta$ . *Hornungiana* Grec. 14.  
 $\gamma$ . *comosa* Borb. 14.  
 $\alpha$ . *Hornungiana* Schur.  
14.  
*ovirensis* Wulf. 15.  
*petrogena* Kern. 15.  
 $\alpha$ . *Turrita* L. 15.  
*Archangelica officinalis*  
Hoffm. 71.  
*Aremonia agrimonoides*  
Neck. 61.  
*Arenaria biflora* L. 33.

- Arenaria multicaulis L. 33.  
Armeria alpina Willd. 137.  
Arnica *Clusii* All. 90.  
montana L. 90.  
Aronicum carpaticum  
Schur 90.  
Clusii Koch 90.  
*Doronicum* Jacq. 90.  
*Doronicum* Rchb. 90.  
Arrhenatherum elatius M.  
et K. 180.  
Artemisia Abrotanum L. 85.  
arenaria DC. 85.  
austriaca Jacq. 85.  
*a. Jacquiniiana* Bess. 85.  
campestris L. 85.  
*δ. Gmeliniana* Bess. 85.  
eriantha Ten' 85.  
inodora M. Bieb. 85.  
*β. incana* DC. 85.  
*orientalis* Willd. 85.  
*pendula* Schur 86.  
pontica L. 85.  
*repens* Pall. 85.  
Santonium L. 86  
Scoparia W. et K. 86.  
vulgaris L. 85.  
*γ. latiloba* Ledeb. 85.  
Arum maculatum L. 189.  
orientale M. Bieb. 189.  
*Arundo acutiflora* Schrad.  
178.  
Asarum europæum L. 149.  
Asparagus *amarus* DC. 161  
*marinus* Rchb. 161.  
officinalis L. 160.  
*officinalis campestris*  
Grec. 160.  
pseudoscaberrim. 160.  
scaber Brign. 160.  
*scaber* Blocki 160.  
tenuifolius Lam. 160.  
trichophyllus Bunge 161.  
verticillatus L. 161  
Asperula Aparine M. Bieb.  
75.  
arvensis L. 75.  
capitata Kit. 75.  
cynanchica L. 75.  
*Eugenia* K. Richt. 75.  
galioides M. Bieb. 75.  
*β. tyraica* DC. 75.  
graveolens M. Bieb. 75.  
humifusa Bess. 75.  
*α. conferta* Grec. 75.  
*β. diffusa* Grec. 75.  
odorata L. 75.  
*β. Eugeniae* Gre. 75.  
Asphodeline lutea Rchb.  
162.  
*Asphodelus luteus* L. 162.  
Aspidium aculeatum Döll.  
191.  
*α. lobatum* Asch. et Gräb.  
191.  
*β. Swartzianum* Koch 191  
*γ. Braunii* Döll. 191.  
*angulare* Kit. 191.  
*Braunii* Spenn. 191.  
*caucasicum* Al. Br. 192.  
cristatum Sw. 192.  
*hastulatum* Ten. 191.  
lobatum-Braunii Luerss.  
192.  
Lonchitis Sw. 191.  
*Luersenii* Dörf. 192.  
*pilosum* Schur. 191.  
Asplenium Adiantum ni-  
grum L. 193.  
*Filix femina var. fis-*  
*sidents* Döll. 193.  
*Filix femina var. mul-*  
*tidentata* 193.  
Trichomanes L. 193.  
viride Huds. 193.  
Aster alpinus L. 81.  
Amellus L. 81.  
*β. bessarabicus* DC. 81.  
annuus L. 82.  
Tripolium L. 81.  
Astragalus alpinus L. 49  
asper Jacq. 50.  
australis Rchb. 49  
austriacus L. 50.  
Cicer L. 50.  
daciensis Heuff. 49.  
dasyanthus Pall. 50.  
glycyphyllos L. 50.  
*linearifolius* Pers. 49.  
monspessulanus L. 50.  
Onobrychis L. 49.  
*α. vulgaris* Ledeb. 49.  
*β. brevifolius* Grec. 49.  
*γ. linearifolius* Ledeb. 49.  
*δ. stenophyllus* Grec. 49.  
oroboides Hornem. 49.  
subulatus M. Bieb. 50.  
vesicarius L. 50.  
virgatus Pall. 50.  
*Wulfenii* Griseb. 50.  
Astrantia alpestris Ky. 67.  
*carniolica* Baumg. 68.  
major L. 67.  
*α. vulgaris* Stur 67.  
*β. montana* Stur 67.  
*α. alpestris* Knapp 67.  
*β. alpestris* Simk. 68.  
*minor* Schur 68.  
Athyrium Filix femina  
Roth 193.  
alpestre Rylands 193.  
Atragene alpina L. 1.  
Atriplex erecta Huds. 145  
hortensis L. 145.  
*β. microtheca* Lorr. 145.  
*laciniata γ. sinuata*  
Moq.-Tend. 146.  
*laciniata δ. diffusa* Moq.-  
Tend. 146.  
*laciniata c. salina* Schur  
146.  
latifolia Wahlenb. 145.  
*β. microsperma* Grec. 145.  
*β. salina* Koch. 144.  
littoralis L. 146.  
*microsperma* W. et K.  
145.  
*microtheca* Moq.-Tend.  
145.  
nitens Schkuhr 145.  
oblongifolia W. et K. 145.  
patula L. 145.  
*β. erecta* Grec. 145.  
*γ. farinosa* DC. 145.  
*portulacoides* L. 144.  
rosea L. 146.  
*sinuata* Hofm. 146.  
Tatarica L. 146.  
*β. sinuata* Grec. 146.  
*γ. diffusa* Grec. 146.  
Atropa Belladonna L. 122.  
*Atropis distans α. limosa*  
Schur 184.  
*intermedia* Schur 184.  
*Aurinia orientalis* Griseb.  
18.  
Avena alpina Smith 180.  
carpatica Host 180.  
compressa Heuff. 180.  
dubia Leers. 180.  
fatua L. 180.  
flavescens L. 180.  
versicolor Vill. 180.  
Azalea procumbens L. 111.  
**Balsamita suaveolens**  
Pers. 89.  
*vulgaris* Willd. 89.  
Barbarea vulgaris R. Br. 14.  
*Barkhausia fetida* DC.  
101.  
Bartsia alpina L. 129.  
Beckmannia eruciformis  
Host 176.  
Bellis perennis L. 81.  
Berberis vulgaris L. 12.  
Berula angustifolia Koch.  
68.  
Betonica officinalis L. 135.  
Betula carpatica W. et K.  
152.  
pubescens Ehrh. 152.  
Bidens cernua Willd. 84.

- Bidens* β. *radiata* DC. 84.  
*tripartita* L. 84.  
*Bifora* *radicans* M. Bieb. 74  
*Biscutella* *ambigua* DC. 20.  
*hispidula* Rchb. 20.  
*laevigata* L. 20,  
β. *ambigua* Grec. 20  
s. *hispidissima* Koch. 20.  
*Blechnum* *spicant* Roth.  
193.  
*Blitum* *Bonus* *Henricus* C  
A. Mey. 144.  
*glaucum* Koch 144.  
*virgatum* L. 144.  
*Borrigo* *officinalis* L. 117.  
*Botryanthus* *neglectus*  
Kunth 167.  
*Botrychium* *Lunaria* Sw.  
191.  
*Brachypodium* *silvaticum*  
R. et S. 186.  
*Bromus* *arvensis* L. 186.  
*commutatus* Schrad. 186.  
*erectus* Huds. 186.  
β. *transsilvanicus* Grec.  
186.  
*inermis* Leyss. 186.  
*mollis* L. 186.  
*patulus* M. et K. 186.  
*ramosus* Huds. 186.  
*secalinus* L. 186.  
*squarrosus* L. 186.  
*sterillis* L. 186.  
*tectorum* L. 186.  
*transsilvanicus* Steud.  
186.  
*Bruckenthalia* *spiculiflora*  
Rchb. 111.  
*Brunella* *alba* Pall. 137.  
β. *laciniata* Grec. 137.  
*grandiflora* Mönch. 137.  
*laciniata* L. 137.  
*vulgaris* L. 137.  
*Bryonia* *alba* L. 110.  
*Bufonia* *annua* DC. 34.  
*parviflora* Griseb 34.  
*tenuifolia* L. 34.  
*Bupleurum* *aureum* Fisch.  
68.  
*diversifolium* Rochel 69.  
*falcatum* L. 68.  
α. *dilatatum* Schur 68.  
β. *variifolium* Rochel 69.  
*procumbens* Desf. 69.  
*rotundifolium* L.  
*tenuissimum* L. 69.  
*Butomus* *umbellatus* L. 153.  
*Calamagrostis* *acutiflora*  
DC. 178.  
*arundinacea* Roth 178.  
*Calamagrostis* *bihariensis*  
Simk. 178.  
*Epigeios* Roth 178.  
β. *Reichenbachiana* Grec.  
178.  
*littorea* DC. 178.  
*montana* Host 178.  
β. *acutiflora* Koch 178  
*Calamintha* *Baumgartenii*  
Grec. 134.  
*Nepeta* Link 134.  
*officinalis* Mönch 134.  
*Patacina* Host 134  
*suaveolens* B. iss. 134.  
*Callitriche* *verna* L. 151.  
*Calluna* *vulgaris* Salisb. 111  
*Caltha* *alpina* Schur 9  
*palustris* L. 8.  
*Camelina* *macrocarpa*  
Wierzb. 19.  
*Campanula* *abietina* Griseb.  
110.  
*alpina* Jacq. 108.  
*bononiensis* L. 109.  
*carpatica* Jacq. 110.  
*Cervicaria* L. 109.  
*glomerata* L. 109.  
γ. *speciosa* Alph. DC.  
109.  
*latifolia* L. 109.  
*macrostachya* Kit. 109.  
*patula* L. 110.  
γ. *neglecta* Alph. DC. 110.  
*persicifolia* L. 110.  
β. *dasycarpa* Kit. 110.  
*pseudolanceolata* Panto.  
109.  
β. *arcuata* Simk. 109.  
*pussila* Hänke 110.  
*rapunculoides* L. 109.  
γ. *neglecta* Grec. 109.  
δ. *ramosa* Grec 109.  
*Rapunculus* L. 110.  
*Scheuchzeri* Vill. 109.  
β. *stenophylla* Grec. 109  
*Sibirica* L. 108.  
β. *paniculata* Alph. DC.  
108.  
*tenuifolia* Hoffm. 110.  
*Trachelium* L. 109.  
β. *dasycarpa* Koch. 109.  
*Camphorosma* *ovata* W. et  
Kit. 143.  
*Cannabis* *sativa* L. 149.  
*Capsella* *Bursa pastoris*  
Mönch 20.  
δ. *microcarpa* Grec. 20.  
*procumbens* Fries 20.  
*Cardamine* *gelida* Schott  
15.  
*hirsuta* L. 15.  
*Cardamine* *impatiens* L. 15.  
*pratensis* L. 15.  
β. *Hayneana* Welw. 15.  
*var. alpina* Andr. 15.  
*resedifolia* *var. gelida*  
Grec 15.  
*rivularis* Schur 15.  
*Carduus* *acanthoides* L. 93.  
*Afer* Jacq. 95.  
*crispus* L. 93.  
β. *pinnatifidus* Grec. 93.  
*hamulosus* Ehrh. 93.  
*Kernerii* Simk. 93.  
*Personata* Jacq. 93  
*radiatus* W. et Kit. 95.  
*Carex* *ampulacea* Good  
172.  
*atrata* L. 173.  
*brachystachys* Schrank  
173.  
*breviculis* DC. 173.  
*brizoides* L. 175.  
*canescens* L. 174.  
*cæspitosa* L. 174.  
*cæspitosa* Good. 174.  
*curvula* All. 175.  
*dacica* Heuff. 174.  
*digitata* L. 173.  
*distans* L. 172.  
*disticha* Huds. 175.  
*divulsa* Good. 175.  
*Drejeri* Lang. 174.  
*filiformis* L. 172.  
*flava* L. 172.  
*glauca* Murr. 173.  
β. *dinarica* Heuff. 174.  
*Goodenowii* Gay 174.  
*Goodenoughii* Sag. et  
Schm. 174.  
α. *elator* Asch. et Gräbn.  
174.  
*hirta* L. 171.  
*lasiocarpa* Ehrh. 172.  
*leporina* L. 174.  
*Michellii* Host 173.  
*muricata* L. 175.  
β. *virescens* Koch 175.  
*nigra* All. 173.  
*nutans* Host 172.  
*pacifica* Drej. 174.  
*pallens* L. 173.  
*paludosa* Good. 172.  
*panicea* L. 173.  
*pendula* Huds. 174.  
*pilosa* Scop. 173.  
*præcox* Schreb. 175.  
*Pseudo-Cyperus* L. 172.  
*remota* L. 174.  
*riparia* Curt. 172.  
β. *monstruosa* Grec. 172.  
*rostrata* Stokes 172.

- Carex silvatica* Huds. 172.  
*splendida* Willd. 172.  
*tenuis* Host 173.  
*tomentosa* L. 173.  
*tristis* M. Bieb. 173.  
*ventricosa* Curt. 173.  
*verna* Caix 173.  
*vesicaria* L. 172.  
*vesicaria* β. L. 172.  
*vesicaria* Huds. 172.  
*vulgaris* Fries 174.  
*vulpina* L. 175.
- Carlina acanthifolia* All. 92.  
*acaulis* L. 92.  
*brevibracteata* Simk. 92.  
*longifolia* var. *brevibracteata* Andræ. 92.  
*vulgaris* L. 92.
- Carpesium cernuum* L. 84.  
*Carpinus Betulus* L. 151.  
*Carum Carvi* L. 68.  
*Catabrosa aquatica* P. Beauv. 184.  
*Caulinia fragilis* Willd. 190.  
*Centaurea austriaca* Willd. 96.  
*axillaris* Willd. 97.  
*β. pinnatifida* Grec. 97.  
*Calcitrapa* L. 98.  
*conglomerata* Porc. 96.  
*Cyanus* L. 96.  
*diffusa* Lam. 97.  
*indurata* Janka 96.  
*Jacea* L. 95.  
*β. vulgaris* Koch 95.  
*γ. lacera* Koch 95.  
*δ. commutata* Koch 96.  
*jurineifolia* Boiss. 97.  
*Kanitziانا* Janka 97.  
*Kotschyana* Heuff. 97.  
*maculosa* Lam. 97.  
*mollis* W. et K. 97.  
*napulifera* Rochel 97.  
*orientalis* L. 97.  
*parviflora* M. Bieb. 97.  
*phrygia* L. 96.  
*plumosa* Lam. 96.  
*Pseudophrygia* Porc. 96.  
*rigidifolia* Bess. 97.  
*salicifolia* M. Bieb. 96.  
*solstitialis* L. 98.  
*spuria* Kern. 96.  
*stenolepis* Kern. 96.
- Cephalanthera ensifolia* Rich. 157.  
*pallens* Rich. 157.  
*rubra* Rich. 157.
- Cephalaria corniculata* R. et S. 78.  
*transsilvanica* Schrad. 78.
- Cerastium acutifolium* Schur 31.  
*alpinum* L. 31.  
*β. glabrum* Willd. 31.  
*γ. lanatum* Koch. 31.  
*δ. squalidum* Ram. 31.  
*alpinum* β. *glabratum* 31.  
*alpinum* δ. *glutinosum* Koch 31.  
*alpinum* α. *hirsutum* Fenzl 31.  
*arvense* α. *strictum* Porc. 30.  
*anomalum* W. et K. 30.  
*banaticum* Heuff. 30.  
*brachypetalum* Desf. 32.  
*β. tauricum* Spreng. 32.  
*bulgaricum* Uechtr. 82.  
*ciliatum* W. et K. 30.  
*filifolium* Vest. 30.  
*glabratum* Hartm. 31.  
*glomeratum* Thuill. 32.  
*grandiflorum* var. *filifolium* Fenzl 30.  
*grandiflorum* var. *banaticum* Rochel 30.  
*laniferum* Schur 31.  
*Lerchenfeldianum* Schur 30.  
*petrosum* Schur 31.  
*ramosissimum* Boiss. 32.  
*β. bulgaricum* Grec. 32.  
*repens* Heuff. 30.  
*strictum* Wahlenb. 30  
*transsilvanicum* Schur 31.  
*trigynum* Vill. 30.  
*triviale* var. *elatus* Pe-term, 32,  
*triviale* var. *nemorosum* Uechtr. 32.  
*villosum* Baumg. 31.  
*viscosissimum* Schur 31.  
*viscosum* L. 32.  
*vulgatum* L. 31.  
*α. hirsutum* Fries 31.  
*β. alpinum* Sturm 31.  
*γ. lancifolium* Schur 31.
- Cerasus avium* Mönch 53.  
*Chamaecerasus* Lois. 52.  
*pumila* Pall. 53.
- Ceratocarpus arenarius* L. 145.  
*Ceratocephalus orthoceras* DC 4.  
*Ceratophyllum demersum* L. 151.  
*Cerinth minor* L. 115.  
*Chamaepeuce* Afra DC. 95.  
*Chærophyllum aromaticum* L. 73.
- Chærophyllum aureum* L. 73.  
*bulbosum* L. 73,  
*hirsutum* L. 73.  
*temulum* L. 73.  
*Chenopodium album* L. 144.  
*β. viride* Moq.-Tend. 144.  
*γ. lanceolatum* Gren. 144.  
*album* β. *cymigerum*. Koch 144.  
*album* var. *conneatenat.* Thuill. 144.  
*candicans* Lam. 144.  
*hybridum* L. 142.  
*intermedium* Mert. 143.  
*lanceolatum* Mühlenb 144.  
*opulifolium* Schrad. 144.  
*polyspermum* L. 144.  
*urbicum* L. 143.  
*β. intermedium* Moq.-Tend. 143.  
*var. grandidentatum* A. Dietr. 143.  
*viride* L. 144.
- Cherleria sedoides* L. 33.  
*Chilochloa collina* Schur 176.  
*Chironia spicata* Willd. 115.  
*Chondrilla juncea* L. 100.  
*viminea* Lam. 100.  
*Chorispora tenella* DC. 13.  
*Chrysosplenium alternifolium* L. 67.  
*Cicuta virosa* L. 68.  
*Cinara Cardunculus* L. 93.  
*Cineraria aurantiaca* Hoppe 90.  
*aurantiaca* β. *lanata* Koch 90.  
*aurantiaca* var. *flocculosa* Rchb. 90.  
*capitata* Koch 90.  
*flocculosa* Grec. 90.  
*longifolia* var. *sulphurea* Baumg. 90.  
*sulphurea* Grec. 90.  
*Circæa alpina* L. 64.  
*intermedia* Ehrh 64.  
*lutetiana* L. 64.  
*Cirsium Afrum* DC. 95.  
*arvense* Scop. 95.  
*γ. setosum* Ledeb. 95.  
*Boujartii* Schultz 94.  
*γ. furiens* Grec. 94.  
*canum* M. Bieb. 94.  
*decussatum* Janka 93.  
*eriophorum* var. *spathulatum* Rchb. 93.

- Cirsium Erisithales* Scop. 94.  
*Erisithales-pannonicum* Heer. 94.  
*erisithaloides* Grec. 94.  
*heterophyllum* All. 94.  
*lanceolatum* Scop. 94.  
 $\beta$ . *nemorale* Rchb. 94.  
*oleraceum* Scop. 95.  
*palustre* Scop. 94.  
*pannonicum* Gaud. 94.  
*panonico-Erisithales* Näg. ap. Koch 94.  
*pauciflorum* Spreng. 94.  
*revulare* Link 94.  
 $\beta$ . *simplex* Grec. 94.  
*spathulatum* Gaud. 93.  
*Clematis integrifolia* L. 1  
*recta* L. 1.  
*Vitalba*  $\alpha$  L. 1.  
 $\beta$ . *banatica* Wierzb. 1.  
 $\gamma$ . *dentata* Grec. 1.  
*Cneorum tricoccum* Guldenst. 40.  
*Cnicus Afer* Willd. 95.  
*spathulatus* Moretti. 93.  
*Cnidium apioides* Spreng. 70.  
*Cochlearia Armoracia* L. 17.  
*Cæloglossum viride* Hartm 155.  
 $\beta$ . *bracteatum* Richt. 155.  
*Colchicum autumnale* L. 167.  
*Comandra elegans* DC. 149.  
*Comarum palustre* L. 55.  
*Conium maculatum* L. 73.  
*Conringia orientalis* Andr. 17.  
*Convallaria majalis* L. 161.  
*Convolvulus Cantabrica* L. 120.  
*sepium* L. 120.  
*Corallorrhiza innata* R. Br. 157.  
*Coriandrum sativum* L. 73.  
*Cornus mas* L. 74.  
*sanguinea* L. 74.  
*Coronilla elegans* Pancici 50.  
*varia* L. 50.  
*Cortusa Mathioli* L. 139.  
*Corydalis bicalcara* Velen. 21.  
*digitata* Pers. 21.  
*Marschalliana* Pers. 21.  
*stivenensis* Velen. 21.  
*solida* Sw. 21.  
 $\beta$ . *bicalcara* Grec. 21.  
 $\gamma$ . *depauperata* Schur 21.  
*var. alpina* Schur. 21.  
*Cotonaster integerrima* Med. 61.  
*Coussinia bulgarica* C. Koch 93.  
*Crambe maritima* L. 21.  
*Crataegus laciniata* Stev. 61.  
*monogyna* Jacq 61.  
 $\alpha$ . *glabrescens* Grec. 61.  
 $\beta$ . *hirsuta* Grec. 61.  
 $\gamma$ . *fissa* Bosc 61.  
*nigra* W. et K. 61.  
*pentagyna* W. et K. 61.  
*Crepis biennis* L. 101.  
 $\alpha$ . *runcinata* Koch 101.  
 $\beta$ . *lacera* Koch 101.  
*chondrilloides* Fröl. 102.  
*foetida* L. 101.  
*grandiflora* Tausch 102.  
*Jacquinii* Tausch 102.  
*paludosa* Mönch 102.  
*præmorsa* Tausch 102.  
*rhœadifolia* M. Bieb. 101.  
*rigida* W. et K. 101.  
*setosa* Hall. 101.  
*sibirica* L. 102.  
*tectorum* L. 102.  
*virens* Vill. 102.  
*Crocus autumnalis* M. Bieb. 158.  
*annulatus var. chrysanthus* Herb. 158.  
*banaticus* Gay 158.  
*campestris* Herb. 158.  
*chrysanthus* Herb. 158.  
*Heuffelianus* Herb. 158.  
*hybernus* Friv. 158.  
*moesiacus* Ker. 158.  
*Pallasii* M. Bieb. 158.  
*reticulatus* M. Bieb. 158.  
*sativus*  $\beta$  *Pallasii* Maw.  
*sulphureus* Griseb. 158.  
*Crypsis aculeata* Ait. 176.  
*alopecuroides* Schrad. 176.  
*Cucubalus Antelopum* Vest 28.  
*baccifer* L. 28.  
*Cuscuta alba* Presl 120.  
*breviflora* Vis. 121.  
*cupulata* Engelm. 120.  
*Epithymum* L. 120.  
*var. micrantha* Boiss. 120.  
*europæa* L. 121.  
*monogyna* Vahl 121.  
*obtusiflora* Humb. 121.  
*var. breviflora* Eng. 121.  
*planiflora* Ten. 120.  
*Rogovitschiana* Trautv 121.  
*Cuscuta trifolii* Babingt. et Gyps. 120.  
*urceolata* Kuntze 120.  
*Cuviera Caput Medusæ var. aspera* Simk. 187.  
*Cynanchum acutum* L. 112.  
*Cynoglossum officinale* L. 117.  
*Cynosurus cristatus* L. 184.  
*Cyperus badius* Desf. 170.  
*flavescens* L. 170.  
*fuscus* L. 170.  
*glomeratus* L. 170.  
*longus* L. 170.  
*longus var. badius* Gay. 170.  
*Monti* L. fil. 170.  
*thermalis* Dumort. 170.  
*Cypripedium Calceolus* L. 170.  
*Cystopteris fragilis* Bernh. 193.  
*sudetica* Al. Br. 193.  
*Citrus aggregatus* Schur 44.  
*alpestris* Schur 45.  
*austriacus*  $\beta$  *pallidus* Rchb. 43.  
*banaticus* Griseb. 44.  
*elongatus* W. et K. 45.  
*Heuffelli* Wierzb. 44.  
 $\beta$ . *argenteus* Grec 44.  
*hirsutus* L. 44.  
 $\beta$ . *leucotrichus* Schur 44.  
 $\gamma$ . *alpestris* Grec. 44.  
*leucanthus* W. et K. 43.  
 $\beta$ . *pallidus* Schrad. 43.  
*leucanthus*  $\beta$  *obscurus* Roch. 44.  
*leucotrichus* Fuss. 44.  
*nigricans* L. 43.  
 $\beta$ . *sericeus* Roch. 43.  
*pallidus* Kit. 43.  
*polytrichus b. alpestris* Simk. 45.  
*Rochelii* Wierzb. 44.  
*scoparius* Liek 43.  
*Daphne Mezereum* L. 148.  
*Daucus Carota* L. 72.  
 $\beta$ . *ponticus* Grec. 72.  
*Delphinium Consolida* L. 10.  
 $\beta$ . *paniculatum* Grec. 10.  
 $\gamma$ . *divaricatum* Rchb. 10.  
*divaricatum* Ledeb. 10.  
*elatum* L. 10.  
 $\alpha$ . *intermedium* Grec. 10.  
*fissum* W. et K. 10.  
*paniculatum* Host 10.  
*Dentaria bulbifera* L. 15.  
*glandulosa* W. et K. 15

- Deschampsia Andræi* Auersw. 180.  
*Dianthus biternatus* Schur 27.  
*capitatus* DC. 27.  
*Carthusianorum* L. 26.  
 $\alpha$ . *saxigenus* Schur 26.  
 $\beta$ . *reflexus* Neitr. 27.  
 $\gamma$ . *puberulus* Simk. 27.  
 $\gamma$ . *arenarius* Neitt. 27.  
*compactus* Kit. 26.  
*deltoides* L. 26.  
*diutinus* Rchb. 27.  
*giganteiformis* Borb. 27.  
*giganteus* D'Urv. 27.  
*glabriusculus* Kit. 27.  
*glacialis* Haenke 25.  
*guttatus* M. Bieb. 26.  
*Henteri* Heuff. 26.  
*integripetalus* Schur 25.  
*Kitaibelii* Janka 25.  
*marisensis* var. *laevigatus* Simk. 26.  
*pallens* Sibth. Sm. 27.  
*petraeus* W. et K. 25.  
*polymorphus* M. Bieb. 26.  
*pseudobarbatus* Bess. 26.  
*Pseudo-Grisebachii* Grec. 27.  
*puberulus* var. *lucigatus* Porc. 26.  
*Segueri* var.  $\gamma$ . Ledeb. 26.  
*sabuletorum* Heuff. 27.  
*spiculifolius* Schur 25.  
*superbus* L. 25.  
*tenuifolius* Schur 27.  
*transsilvanicus* Schur 26.  
*Vandasii* Velen. 27.  
*Dictamnus Fraxinella* Pers. 39.  
*Digitaria sanguinalis* Scop. 175.  
*Diploaxis tenuifolia* DC. 21.  
*Dipsacus Fullonum*  $\alpha$ . L. 78.  
*pilosus* L. 78.  
*silvestris* Huds. 78.  
*Doronicum austriacum* Jacq 89.  
*caucasicum* M. Bieb. 89.  
*Chusii* Tausch 90.  
*Columnæ* Ten. 89.  
*orientale* Willd. 89.  
*Dorycnium pentaphyllum* Scop. 48.  
 $\alpha$ . *patentipilosum* Ledeb. 48.  
 $\beta$ . *adpresipilosum* Ledeb. 48.  
*Draba aizoon* Wahlenb. 19.  
*carinthiaca* Hoppe 19.  
*muralis* L. 19.  
*Draba nemorosa* All. 19.  
*podolica* Rupr. 19.  
*Schieverackia* Janka 19.  
*uralensis* Willd. 19.  
*Drosera rotundifolia* L. 13.  
*Dryas octopetala* L. 55  
*Echinophora Sibthorpiana* Guss. 73.  
*Echinops commutatus* Juzrazka 92.  
*ruthenicus* M. Bieb. 91.  
 $\beta$ . *tenuifolius* Fisch. 92.  
*sphaerocephalus* L. 92.  
*Echium altissimum* Jacq. 116.  
*italicum* L. 116.  
*vulgare* L. 115.  
 $\beta$ . *Wierzbichii* Haberl. 116.  
*Elatine Alsinastrum* L. 34.  
*Elymus Caput Medusæ* L. 187.  
*crinitus* Sadler 187.  
*Elyna spicata* Schrad. 175.  
*Epilobium adnatum* Griseb. 63.  
*alpestre* Jacq. 63.  
*alpinum* L. 64.  
*alsinaefolium* Vill. 64.  
*angustifolium*  $\beta$ . L. 62.  
*collinum* Gmel 63.  
*Dodonæi* Vill. 62.  
*hirsutum*  $\alpha$ . L. 62.  
 $\beta$ . *subglabrum* Koch 62.  
*lanceolatum* Seb. et M. 62.  
*montanum* L. 63.  
*obscurum* Scherb. 63.  
*palustris* L. 64.  
*parviflorum* Schreb. 62.  
*roseum* Schreb. 63.  
*tetragonum* L. 63.  
*trigonum* Schrank 63.  
*Epipactis latifolia* All. 157.  
*palustris* Cr. 157.  
*rubiginosa* Koch 157.  
*Epipogium aphyllum* Sw. 157.  
*Equisetum arvense* L. 194  
 $\beta$ . *nemosum* Al. Br. 195.  
 $\gamma$ . *ramulosum* Rupr. 195.  
var. *inundatum* Rabenh. 195.  
*arvensi-limosum* Lasch. 195.  
*hiemale* L. 195.  
*inundatum* Lasch. 195.  
*littorale* Kuhl. 195.  
*pannonicum* Kit. 195.  
*Equisetum ramosissimum* Desf. 195.  
 $\beta$ . *pannonicum* Asch. et Gräbn. 195.  
*ramosum* DC. 195.  
*ramosum* b. *virgatum* Al. Br. 195.  
*silvaticum* L. 195.  
 $\beta$ . *capillare* Asch. et Gräbn. 195.  
*Telmateja* Ehrh. 194.  
 $\beta$ . *serotinum* Milde 194.  
*variegatum* Schleich. 195.  
*Eragrostis megastachya* Link 181.  
*pilosa* P. Beauv. 182.  
*poaeoides* P. Beauv. 182.  
*Erica vulgaris* L. 111.  
*Erigeron acre* L. 82.  
*alpinus* L. 82.  
*alpinus* Baumg. 82.  
*annuum* Pers. 82.  
*glabratus* Schur 82.  
*neglectus* Kern. 82.  
*racemosus* Baumg. 82.  
*uniflorus* L. 82.  
*Eriophorum latifolium* Hoppe 171.  
*polystachyon*  $\alpha$ . L. 171.  
*vaginatum* L. 171.  
*Erodium cicutarium* L'Hérit. 37.  
*Eryum hirsutum* L. 51.  
 $\beta$ . *microphyllum* Grec. 51.  
*tetraspermum* L. 51.  
*Eryngium planum* L. 67.  
*Erysimum diffusum* Ehrh. 17.  
*exaltatum* Andr. 17.  
*repandum* L. 17.  
*Wittmanni* Zaw. 17.  
*Erythraea Centaurium* Pers. 115.  
*ramosissima* Pers. 115.  
*spicata* Pers. 115.  
*Erythronium Dens canis* L. 162.  
*Eupatorium cannabinum* L. 80.  
*Euphorbia amygdaloides* L. 150.  
*agraria* M. Bieb. 150.  
*carniolica* Jacq. 149.  
*Esula* L. 150.  
*exigua* L. 150.  
*falcata* L. 150.  
*Gerardiana* Jacq. 150.  
*glareosa* M. Bieb. 150.  
*lingulata* Heuff. 150.  
*lucida* W. et K. 150.  
*Myrsinitis* L. 150.



- Euphorbia palustris* L. 150.  
*Peplus* L. 150.  
*virgata* W. et K. 150.  
*Euphrasia minima* Jacq. 128  
*montana* Jord. 128.  
*officinalis* γ. *montana*  
 Kostkoviana Heyne 128.  
 β. *montana* Grec. 128.  
*salisburgensis* Funk. 128  
 β. *minuta* Gremli 128.  
*var. parvula* Wetts. 128,  
*stricta* Host 128.  
 β. *pubibunda* Simk. 128.  
*Euxolus deflexus* Rafin. 141  
*Evonymus bulgaricus* Ve-  
 len. 40.  
*europæus* L. 40.  
 β. *pubescens* Steph. 40.  
 β. *scabridum* Degen 40.  
*nanus* M. Bieb. 40.  
*verrucosus* Scop. 40.  
  
*Fagus silvatica* L. 151.  
*Fedia Auricula* Roem. 80.  
*Festuca barbata* Schrank.  
 185.  
*canescens* Rchb. 185.  
*distans* b. *limosa* Simk.  
 184.  
*elator* L. 186.  
*ovovina var. 2<sup>o</sup> vulga-*  
*ris* Hack. 184.  
*fallax* Thuill. 185.  
*gigantea* Vill. 186.  
*glaberrima* Schur 185.  
*heterophylla* Lam. 185.  
*montana* M. Bieb. 185.  
*ovina* L. 184.  
 b. *sciaphila* Asch. et  
 Gräbn. 184.  
*ovina a. vulgaris* Koch  
 184  
*ovina a. genuina* Gren.  
 Godr. 184.  
*pseudovina* Hack. 185.  
*pubescens* Willd. 185.  
*rubra* L. 185.  
 β. *fallax* Hack. 185.  
 γ. *barbata* Hack. 185.  
*rubra a. genuina* Gren.  
 Godr. 185.  
*rubra var. villosa* Kock  
 185.  
*salinaria* Simk. 184.  
*saxatilis* Schur 185.  
*sciaphila* Schur. 184.  
*sulcata* Hack. 185.  
 γ. *colorata* Schur 185.  
*supina* Schur 185.  
*varia* Haenke 185.  
*versicolor* Tausch 185.  
  
*Ficaria calthæfolia* Rchb 8.  
*intermedia* Schur 8  
*nudicaulis* Kern. 8.  
*ranunculoides* Roth 8.  
*transsilvanica* Schur 8.  
*Filago arvensis* L. 83.  
*germanica* L. 83.  
*Foeniculum capillaceum*  
 Gilib. 69.  
*vulgare* Gärt. 69.  
*Fragaria campertris* Stev.  
 55.  
*collina* Ehrh. 55.  
*elator* Ehrh. 55.  
*meschata* Duchesne 55.  
*viridis* Duchesne 55.  
*Frankenia pulverulenta* L.  
 25.  
*Fritillaria tenella* M. Bieb.  
 162.  
*Fumaria micrantha* Lag. 21.  
*officinalis* L. 21.  
  
*Gagea lutea* Ker. 163.  
*stenopetala* Fries 163  
 β. *pratensis* Koch 163  
*transsilvanica* Schus 163  
*Galanthus nivalis* L. 160.  
*plicatus* M. B'eb. 160.  
*Galega officinatis* L. 49.  
*Galeobdolon luteum* Huds.  
 135.  
*Galeopsis acuminata* Rchb.  
 135.  
*angustifolia* Ehrh 135.  
*Ladanium* L. 135.  
*pubescens* Bess. 135.  
*speciosa* Mill. 135.  
*Tetrachit* L. 135.  
 β. *acuminata* Grec. 135.  
*Galinsoga parviflora* Ca-  
 van. 81.  
*Galium alpinum* Grec. 77.  
*Aparine* L. 77  
*boreale* L. 77.  
*Cruciata* Scop 77.  
*Cruciata-alpinum* Grec.  
 77.  
*elatum* Thuill. 75.  
 β. *pubescens* Schrad. 76.  
 γ. *graveolens* Grec. 76.  
*crectum* Huds. 76.  
 β. *petroëum* Grec. 76.  
 γ. *transsilvanicum* Simk.  
 76.  
*glabrum b. alpinum* Simk  
 77.  
*Kitaibelianum* Schult 76.  
*maximum* Mor. 76.  
*palustre* L. 77.  
*petroëum* Schur 76.  
  
*Galium pseudoaristatum*  
 Schur 76.  
*retrosum* DC. 77.  
*Schultesii* Vest. 76.  
*silvestre* γ. *carpathicum*  
 Porc. 76.  
*sudeticum* Tausch 76.  
*transsilvanicum* Schur 76.  
*vernium* Scop. 77.  
*verum* L. 75.  
*Gaya simplex* Gaud. 71.  
*Genista albida* Willd. 43.  
*oligosperma* Grec. 43.  
*ovata* W. et K. 43.  
*sagittalis* L. 43.  
*scoparia* Lam. 43.  
*tinctoria* L. 43.  
 β. *elator* Rchb. 43.  
 γ. *latifolia* DC. 43.  
*tinctoria v. oligosperma*  
 Andræ 43.  
*Gentiana acaulis* a. L. 113.  
*Æstiva* Röm. et S. 113.  
*Amarella v. depauper-*  
*ata* Rochel 114.  
*aselepiadea* L. 113.  
*carpathica* Wettst. 114.  
*caucasica* Simk. 114.  
*chloræfolia* Schur 113.  
*a. atroviridis* Schur 114.  
*cruciata* L. 113.  
*frigida* Hänke 113.  
*germanica v. caucasica*  
 Griseb. 113.  
*germanica β. minor*  
 Meyer 114.  
*lutea* L. 113.  
*nivalis* L. 113.  
*obtusifolia v. Uechtri-*  
*tzii* Sag. et Schn. 113.  
*orbicularis* Schur 113.  
*punctata* L. 113.  
*spicata* L. 115.  
*Uechtritzii* Grec. 113.  
 β. *atroviridis* Grec. 114.  
 γ. *depauperata* Grec. 114.  
*Geranium aconitifolium*  
 Kotschy 36.  
*alpestre* Schur 36.  
*asphodeloides* Willd. 36.  
*cœrulatum* Schur 36.  
*columbinum* L. 37.  
*divaricatum* Ehrh. 37.  
*fasciculatum* Pancici 36.  
*lucidum* L. 37.  
*palustre* L. 36.  
*phæum* L. 35.  
*pratense* L. 36.  
*Robertianum* L. 37.  
*sanguineum* L. 37.  
*Geum Aleppicum* Jacq 55.

- Geum montanum L. 55.  
reptans L. 55.  
rivale L. 55.  
*Gieracium chondrilloides* Rchb. 102.  
Gladiolus imbricatus L. 157.  
Glaucium corniculatum Curt. 12.  
Glechoma hederacea L. 134.  
Glyceria aquatica Wahlenb. 183.  
    *β* arundinacea Aschers. 183. -  
    *aquatica β. flaccida* Lindem 183.  
    *arundinacea* Velen. 183.  
    *distans* Wahlenb. 184.  
    *β. limosa* Grec. 184.  
    *nemoralis* Uechtr. 183.  
Glyceria *nemoralis β. contracta* Asch. 183.  
    *plicata* Fries 183.  
    *β. nemoralis* Uechtr. 183  
    *remota* Griseb. 183.  
    *retinosa* Velen. 183.  
    *salinaria* Grec. 184.  
Glycyrrhiza echinata L. 49.  
Gnaphalium norvegicum Gunn. 84.  
    *silvaticum* L. 83.  
    *supinum* L. 84.  
    *uliginosum* L. 84.  
Gymnadenia albida Rich. 156.  
    *conopsea* R. Br. 155.  
    *β. leucantha* Schur 156.  
    *odoratissima* Rich. 156  
Gypsophila muralis L. 27.  
    *paniculata* L. 28.  
    *transsilvanica* Spreng. 28.  
**Habenaria bracteata** R. Br. 155.  
Halimocnemis triandra Moq.-Ten. 1. 143.  
    *crassifolia* C. A. Mey. 143.  
    *volvox* C. A. Mey. 143.  
*Halimus portulacoides* Wallr. 144.  
Haplophyllum suaveolens Ledeb. 39.  
Hedera Helix L. 74.  
Hedysarum obscurum L. 51.  
Helleborus *graveolens* Rchb. 9.  
    *odorus* W. et K. 9.  
    *purpurascens* W. et K. 9.  
Heleocharis acicularis R. Br. 171.  
    *ovata* R. Br. 171.  
Heleocharis palustris R. Br. 171.  
    *uniglumis* Schult. 171.  
Helianthemum alpestre Dun. 12.  
    *β. hirtum* Grec. 12.  
    *alpestre* Rchb. 12.  
    *hirsutum* Kern. 12  
    *elandicum β. hirtum* Koch. 12.  
    *rupifragum* Kern. 12.  
    *vulgare* Gärtn. 12.  
Helianthus annuus L. 84.  
Helichrysum arenarium DC. 84.  
Heliosperma quadrifidum Rchb. 28.  
Heliotropium europæum L. 115.  
    *suaveolens* M. B. eb. 115.  
*Hepatica multiloba* Guebh. 3.  
    *transsilvanica* Fuss 3.  
Heracleum palmatum Baumg. 72.  
    *sibiricum* L. 71.  
    *Sphondylium* L. 72.  
Herminium alpinum Lindl. 156.  
    *monorchis* R. Br. 156.  
Herniaria glabra L. 34.  
    *incana* Lam. 34.  
    *α. angustifolia* Fenzl 34.  
    *β. latifolia* Fenzl 34.  
Hesperis alpina Schur 16  
    *matronalis* L. 16.  
    *β. hortensis* Grec. 16.  
    *matronalis β. silvestris* DC. 16.  
    *matronalis β. integrifolia* Neilr. 16.  
    *matronalis β. lusus b.* Ledeb. 16.  
    *matronalis var. α.* DC. 16.  
    *nivea* Baumg. 16.  
    *runcinata* W. et K. 16.  
    *β. Steveniana* Grec. 16.  
    *silvestris* Cr. 16. -  
    *Steveniana* DC. 16.  
Hibiscus ternatus Cav. 38.  
Hieracium alpinum L. 106.  
    *alpinum β. Csereianum* Simk. 106.  
    *alpinum β. sudeticum* Koch 106.  
    *Auricula* L. 104.  
    *γ. minimum* Grec. 104.  
    *Auricula-Pavichii* Grec. 105.  
    *aurantiacum* L. 105.  
Hieracium Bauhini Schult 105.  
    *bifidum* Kit. 106.  
    *boreale* Fries. 107.  
    *carpatium* Schur 106.  
    *chondrilloides* L. 102.  
    *Csereianum* Baumg. 106.  
    *cymosum* L. 105.  
    *β. Nestleri* Grec. 106.  
    *decipiens* Tausch 106.  
    *echioides* Lumn. 106.  
    *β. albo-cinereum* Rupr. 106.  
    *γ. setigerum* Tausch 106.  
    *foliosum* W. et K. 107  
    *Hausmanni* Rchb. 104.  
    *Moritzianum* Hegetsch. 104.  
    *murorum* L. 106.  
    *Nestleri α. hirsutum* Koch. 105.  
    *Nestleri β. brevisetum* Koch 105.  
    *pannonicum* Näg. Pet.  
    *pelesii* Grec. 107.  
    *petræum* Friv. 104.  
    *Pilosella* L. 102.  
    *α. vulgare* Tausch 103.  
    *β. robustius* Koch 103.  
    *ε. florigerum* Grec. 103.  
    *ζ. elatum* Grec. 103.  
    *poliotrichum* Wimm. 105.  
    *præaltum* Vill. 105.  
    *pratense* Tausch. 105.  
    *prenanthoides* Vill. 107.  
    *pseudoboreale* Grec. 107.  
    *racemosum* W. et K. 107.  
    *Rothianum* Wallr. 106.  
    *sabinum* Seb. et Maur. 106.  
    *stoloniflorum* Baumg. 104.  
    *subauratum* Schur. 105.  
    *subcæsius* Fries 106.  
    *sudeticum* Froel. 106.  
    *transsilvanicum* Heuff. 106  
    *umbellatum* 107.  
    *villosum* L. 106.  
    *vulgatum* Fries 107.  
Himantoglossum hircinum Spr. 156.  
Hipophaë rhamnoides L. 148.  
Holcus lanatus L. 180.  
*Homalocarpus uniflorus* Schur. 3  
Homogyne alpina Cass. 81.  
Hordeum Caput Medusæ Coss. 187.  
    *β. asperum* Degen 187.



- Hordeum Caput Medusæ*  
Grec. 187.  
*crinitum* Hack. 187.  
*distichum* L. 186.  
*europæum* All. 187.  
*geniculatum* All. 187.  
*marinum* Huds. 187.  
*maritimum* Wither. 187.  
*murinum* L. 187.  
*spontanæum* C. K. 186.  
*Humulus Lupulus* L. 149.  
*Hutchinsia alpina* R. Br. 20.  
*brevicaulis* Hoppe 20.  
*procumbens* Desv. 20.  
*Hyacinthus leucophæus*  
Stev. 167.  
*Hydrocharis Morsus ranæ*  
L. 153.  
*Hypericum androsemfol.*  
Vill. 35.  
*commutatum* Nolte 35.  
*elegans* Steph. 35.  
*hirsutum* L. 35.  
*montanum* L. 35.  
*perforatum* L. 35.  
*β. veronense* Rchb. 35.  
*quadrangulum* L. 35.  
*quadrangulo-tetrapter.*  
Rchb. 35.  
*tetrapterum* Fries 35.  
*transsilvanicum* Celak.  
35.  
*Hypochoeris helvetica*  
Jacq. 98.  
*maculata* L. 98.  
*radicata* L. 98.  
*Iberis saxatile* L. 20.  
*semperflorens* L. 20.  
*Inula britannica* L. 83.  
*Conyza* DC. 83.  
*ensifolia* L. 83.  
*germanica* L. 83.  
*hirta* L. 83.  
*Oculus Christi* L. 83.  
*salicina* L. 83.  
*squarrosa* L. 83.  
*Iris angustifolia* Gilib. 159.  
*Clusiana* Tausch 159.  
*Clusiana a. transsilva-*  
*nica* Schur 159.  
*graminea* L. 159.  
*graminea* Griseb. 159.  
*pratensis* Lam. 159.  
*Pseudo-Cyperus.* Schur.  
159.  
*pumila* L. 159.  
*β. lutea* Ker. 159.  
*γ. minor* Grec. 159.  
*γ. pumila* Curt. 159.  
*ruthenica* Dry. 159.  
*Iris sibirica* L. 159.  
*Sintenisii* Janka 159.  
*transsilvanica* Schur 159.  
*transsilv. v. atrovio-*  
*cea* Schur 159.  
*variegata* L. 160.  
*Isopyrum thalictroides* L. 9.  
**Juncus acutiflorus** Ehrh.  
168.  
*γ. fluitans* Grec. 168.  
*alpinus* Vill. 168.  
*β. carpaticus* Grec. 163.  
*articulatus* L. 168.  
*atratus* Krok. 168.  
*bufonius* L. 169.  
*β. capillaceus* Grec. 169.  
*carpaticus* Simk. 168.  
*compressus* Jacq. 198.  
*congestus* Thuill. 170.  
*conglomeratus* L. 167.  
*diffusus* Hoppe 168.  
*effusus* L. 167.  
*effusus-glaucus* F. Sch.  
168.  
*glaucus* Ehrh. 168.  
*glaucus-effusus* Schnitz.  
168.  
*lamprocarpus* Ehrh. 168.  
*maritimus* Lam. 168.  
*Kochelianus* Röm. et Sch.  
168.  
*sudeticus* Willd. 170.  
*transsilvanicus* Schur 168.  
*trifidus* L. 168.  
*triglumis* L. 168.  
*Jurinea arachnoidea*  
Bunge 95.  
*mollis* Rchb. 95.  
*β. arachnoidea* Grcc. 95.  
**Kentrophyllum lanatum**  
DC. 98.  
*Kernera saxatile* Rchb. 17.  
*Knautia arvensis* Coult. 78.  
*β. rosea* Baumg. 78.  
*γ. dumetorum* Grec. 78.  
*atrorubens* Janka 78.  
*dumetorum* Heuff. 78.  
*silvatica* Duby 78.  
*β. atropurpurea* Grec. 78.  
*γ. lancifolia* Heuff. 79.  
*Kochia arenaria* Roth. 143.  
*hirsuta* Nolte 143.  
*prostrata* Schrad. 143.  
*Scoparia* Schrad. 143.  
*Koeleria cristata* Pers. 179.  
*α. genuina* 179.  
*β. montana* Haussm. 179.  
*γ. transsilvanica* K. Richt.  
179.  
*Koeleria δ. gracilis* Koch.  
180.  
*cristata v. pseudoglauca*  
Schur. 179.  
*Fenzliana* Schur 179.  
*Fenzliana β. transsil-*  
*van.* Grec. 180.  
*gracilis* Pers. 180.  
*rigidula* Simk. 179.  
*transsilvanica* Schur. 179  
**Luactuca muralis** Frescn.  
100.  
*quercina* L. 100.  
105.  
*saligna* L. 100.  
*viminea* Link. 100.  
*Lamium album* L. 135.  
*β. nemorale* Grec. 135.  
*maculatum* L. 135.  
*Lappa major* Gärt. 92.  
*minor* DC. 93.  
*tomentosa* Lam. 83.  
*Lapsana communis* L. 98.  
*β. glanduloso-pilosa*  
Schur 93.  
*Laserpitium alpinum* W.  
et. K. 72.  
*latifolium* L. 72.  
*prutenicum* L. 72.  
*Lathrœa squamaria* L. 130.  
*Lathyrus Aphaca* L. 52.  
*hirsutus* L. 52.  
*α. uniflorus* Grec. 52.  
*platyphyllus* Retz. 52.  
*pratensis* L. 52.  
*tuberosus* L. 52.  
*Lavatera thuringiaca* L. 38.  
*Leontodon asperum* Rchb.  
99.  
*autumnalis* L. 98.  
*β. subpratensis* Grec. 98.  
*autumnalis β. pratensis*  
Koch. 99.  
*corniculatum* Kit. 100.  
*croceus* Hânke 99.  
*danubialis* Jacq. 99.  
*glaucescens* M. Bieb.  
*hastile* L. 99.  
*hispidus* L. 99.  
*γ. danubialis* Grec.  
*medius* Simk.  
*prateusis* Rchb. 96.  
*Leontopodium alpinum*  
Cass. 84.  
*Lepidium procumbens* L.  
20.  
*sativum* L. 20.  
*Leucanthemum rotundifol.*  
DC. 88.  
*vulgare* Lam. 88.

- Leucanthemum* β. carpatum Bess. 88.  
 γ. subalpinum Schur. 88.  
*Leucosium vernum* L. 160.  
*Libanotis humilis* Schur 70.  
*leiocarpa* Simk. 70.  
*montana* Cr. 70.  
 β. pubescens Pantzu 70.  
*montana v. leiocarpa* Heuff. 70.  
*montana* β. minor Koch. 70.  
*pubescens* Pichler 70.  
*vulgaris* β. *pubescens* DC. 70.  
*Lilium Martagon* L. 162.  
*Limnanthemum nymphaeoides* Link. 113.  
*Limosella aquatica* L. 125.  
*Linaria dalmatica* Mill. 123.  
 β. transsilvanica Schur 123.  
*hybrida* Schur 123.  
*Elatine* Mthl. 123.  
*Linum alpinum* Jacq. 37.  
 β. elatius Wahlenb. 37.  
*austriacum* L. 37.  
*flavum* L. 37.  
*hirsutum* L. 37.  
 β. glabrescens Rochel 37.  
*nervosum* W. et K. 37.  
*perenne* L. 37.  
*tauricum* Willd. 37.  
*Lynosyris vulgaris* Cass. 81.  
*villosa* DC. 81.  
*Listera ovata* R. Br. 157.  
*Lithospermum arvense* L. 116.  
*dispermum* L. 120.  
*officinale* L. 116.  
*retortum* Pall. 120.  
*Littorella lacustris* L. 140.  
*Lloydia serotina* Rchb. 162.  
*Lolium temulentum* L. 188.  
*Lomatogonium carinthiacum* Al. Br. 113.  
*Lonicera nigra* L. 77.  
*Xylosteum* L. 77.  
*Loranthus europaeus* L. 140.  
*Lotus corniculatus* L. 48.  
 β. alpinus Baumg. 48.  
*Lunaria rediviva* L. 17.  
*Luzula albida* Lam. 169.  
 β. rubella Gand. 169.  
*campestris* Lam. 169.  
*congesta* Lej. 170.  
*erecta* β. *congesta* Desv. 170.  
*maxima* Lam. 169.  
*multiflora* Lej. 169.  
 β. *congesta* Koch 170.
- Luzula nigricans* Desv. 170.  
*pilosa* Willd. 169.  
*silvatica* Gaud. 169.  
*spadicea* Lam. 169.  
*spicata* Lam. 170.  
*sudetica* DC. 170.  
*vulgaris* Buch. 169.  
*Lyeium vulgare* Dun. 121.  
*Lycopodium annotinum* L. clavatum L. 194.  
*Selago* L. 194.  
*Lycopsis arvensis* L. 119.  
*orientalis* L. 119.  
*taurica* Stev. 119.  
*Lycopus europaeus* L. 131.  
*Lysimachia punctata* L. 138.  
*vulgaris* L. 138.  
*Lythrum Salicaria* L. 41.  
*virgatum* L. 41.
- Majanthemum bifolium* DC. 161.  
 β. latifolium Grec. 161.  
*Malachium aquaticum* Fries 32.  
*Malus communis* Lam. 61.  
 β. semperflorens Grec. 61.  
*Malva borealis* Wallm. 38.  
*rotundifolia* L. 38.  
*silvestris* L. 38.  
*Marrubium peregrinum* β. L. 136.  
*praecox* Janka 136.  
*vulgare* L. 136.  
*Marsilea quadrifolia* L. 190.  
*Melampyrum arvense* L. 129.  
*cristatum* L. 126.  
*commutatum* Tausch 126.  
*nemorosum* L. 126.  
*silvaticum* L. 126.  
 β. saxosum Garke 127.  
*Melandrium nemorale* Rchb. 30.  
*pratense* Röhl 30.  
*silvestre* Röhl 30.  
*Melica altissima* L. 181.  
*ciliata* L. 181.  
 β. flavescens Schur 181.  
*uniflora* Retz. 181.  
*Melilotus alba* Desr. 45.  
 β. micrantha Grec. 45.  
*dentata* Pers. 45.  
*dentata* Sturm 46.  
*officinalis* Desr. 46.  
*Melissa Baumgartenii* Simk. 134.  
*officinalis* L. 134.  
*Melitis Melissophyllum* L. 135.
- Mentha aquatica* L. 131.  
 α. genuina Gren. Godr. 131.  
 β. hirsuta Koch. 131.  
*arvensis* L. 131.  
*silvestris* L. 131.  
 α. candicans Grec. 131.  
 β. vulgaris Benth. 131.  
 γ. nemorosa Benth. 131.  
 δ. crispa Benth. 131.  
*viridis* L. 131.  
*Menianthes trifoliata* L. 102.  
*Mercurialis ovata* Sternb. 151.  
*perennis* L. 151.  
*Messerschmidia cancellata* Asso 120.  
*Milium effusum* L. 178.  
*effusum* β. *elatius* Koch 178.  
*effusum v. latifolium* Schur 178.  
*transsilvanicum* Schur 178.  
*Mœhringia Grisebachii* Janka 33.  
*muscosa* L. 33.  
*trinervia* Clair. 33.  
*villosa* Fenzl 33.  
*villosa* β. *tenuifolia* Rchb. 33.  
*Molinia caerulea* Mönch 184.  
*Moneses grandiflora* Salisb. 112.  
*Monotropa Hypopitys* L. 112.  
*Mulgedium alpinum* L. 101.  
*tataricum* DC. 101.  
*Muscari botryoides* Mill. 166.  
*neglectum* Guss. 166.  
*tenuiflorum* Tausch 166.  
*transsilvanicum* Schur 166.  
*Myogalum Boucheanum* Kth. 162.  
*Myosotis alpestris* Schm. 117.  
 γ. elatior DC. 117.  
*collina* Hoffm. 117.  
*intermedia* Link 117.  
*montana* M. Bieb. 117.  
*palustris* Roth 116.  
 β. laxiflora Koch 117.  
*silvatica* Hoffm. 117.  
*sparsiflora* Mik. 117.  
*stricta* Link 117.  
*Myosurus minimus* L. 4.  
*Myricaria germanica* Desv. 13.

- Myriophyllum spicatum* L. 64.  
*Myrrhis odorata* Baumg. 73.  
*Najas major* All. 190.  
     *marina* β. L. 190.  
     *minor* All. 190.  
*Narcissus radiiflorus* Salisb. 160.  
*Nardus stricta* L. 188.  
*Nasturtium armoracoides* Pausch 14.  
     *austriacum* Cr. 14.  
     *officinale* R. Br. 14.  
     *proliferum* Heufft 14.  
     *pyrenaicum* R. Br. 14.  
     *silvestre* R. Br. 14.  
     γ. *Kernerii* Grec. 14.  
*Nectaroscordum bulgaricum* Janka 163.  
*Neottia Nidus avis* Rich 157.  
*Nepeta Cataria* L. 134.  
     *nuda* L. 134.  
*Neslia paniculata* Desv. 19.  
*Nigella arvensis* L. 9.  
*Nigritella nigra* Rchb. 156.  
*Nonea atra* Griseb. 118  
     *erecta* Bernh. 118  
     *pulla* DC. 118.  
*Obionne pedunculata* Moq. Tend. 144  
     *postulacoides* Mog Tand 144  
*Ocimum Basilicum* L. 132.  
*Odontites lutea* Rchb. 129.  
     *serotina* Rch. 129.  
     *verna* Rchb. 128.  
*Oenanthe banatica* Heufft. 69.  
     *Phellandrium* Lam. 69.  
     *silaifolia* M. Bieb. 69.  
*Onobrychis gracilis* Bess. 51.  
     *montana* DC. 50.  
     *sativa* Lam. 50.  
*Ononis hircina* Jacq. 45.  
*Onopordon acanthium* L. 95.  
*Onosma tauricum* Pall. 116.  
     β. *viride* Grec. 116.  
*Ophioglossum vulgatum* L. 190.  
*Ophrys cornuta* Stev. 156.  
     *aestifera* v. *cornuta* Boiss. 156.  
     *Scolopax* Host 156.  
*Oporina pratensis* β. DC. 99.  
*Orchis bracteata* Willd. 155.  
     *cassidea* M. Bieb. 154.  
     *cimicina* Cr. 154.  
     *cordigera* Fries 155.  
     *cordiger banaticus* Asch. 155.  
     *cordigera d. foliosa* Kling. 155.  
     *coriophora* L. 154.  
     *elegans* Heufft 154.  
     *foliosa* Schur 155.  
     *fragrans* Poll. 154.  
     *globosa* L. 154.  
     *incarnata* L. 155.  
     *lancibracteata* C. Koch. 155.  
     *macedonica* Griseb. 155.  
     *macrostachys* Ten. 155.  
     *maculata* 155.  
     β. *macrostachys* Asch. Grb. 155.  
     *maculata* β. *saccigera* Rchb. 155.  
     *militaris* L. 154.  
     *Morio* L. 154.  
     *pallens* L. 154.  
     *purpurea* Huds. 154.  
     *saccifera* Brong. 155.  
     *sambucina* L. 155.  
     *Simia* Lam. 154.  
     *speciosa* Host. 154.  
     *ustulata* L. 154.  
*Origanum Barcense* Simk 132.  
     *Barcense* β. *macrostachys* Grec. 132.  
     *Majorana* L. 132.  
     *megastachyum* Link. 132.  
     *vulgare* L. 132.  
     β. *virens* Benth. 132.  
     γ. *glandulare* Grec. 132.  
     *vulgare* α. *albiflorum* Schur 132.  
     *vulgare* β. *prysmaticum* Gaud. 132.  
*Ornithogalum Boucheanum* Grec. 162.  
     *refractum* Klt. 163.  
     *tenuifolium* Guss. 163.  
*Orobanche caryophyllacea* Sm. 129.  
     *cærulea* Vill. 130.  
     *eruenta* Bartl. 129.  
     *Cumana* Wallr. 130.  
     *Epithymum* DC. 129.  
     *flava* Mart. 130.  
     *gracillis* Sm. 129.  
     *loricalu* Rchb. 130.  
     *lucorum* Al. Br. 130.  
     *lutea* Baumg. 129.  
     *Medicaginis* Duby 130.  
*Orobanche purpurea* Jacq. 130.  
     *rnbens* Wallr. 129.  
     *Teucarii* F. W. Schultz. 130.  
*Orobanchus aureus* Stev. 52.  
     *lacteus* M. Bieb. 52.  
     *lævigatus* W. et K. 52.  
     *variegatus* Ten. 52.  
     *vernus* L. 52.  
     *versicolor* Gmel. 52.  
*Oxalis Acetosella* L. 37.  
*Oxyria digyna* Campd. 147.  
*Oxytropis campestris* DC. 49.  
     *carpatia* Uechtr. 49.  
     *pilosa* DC. 49.  
     *sericea* Simk. 49.  
*Padus Mahaleb* Grec. 53.  
*Pæonia corallina* β. *triterinata* Boiss. 11.  
     *romanica* Brânza 11.  
     *tenuifolia* L. 11.  
     *triterinata* Pall. 11.  
*Papaver hybridum* L. 12.  
     *pyrenaicum* Willd. 12.  
*Parietaria erecta* Mert. 149.  
*Paris quadrifolia* L. 162.  
*Parnassia palustris* L. 13.  
*Paronichia cephalotes* Stev 34.  
     *hungarica* Griseb. 34.  
*Pastinaca sativa* L. 71.  
     β. *elatio* Rochel 71.  
     γ. *silvestris* DC. 71.  
*Pedicularis Baumgartenii* Simk. 127.  
     *campestris* Griseb. 127.  
     *exaltata* Auct hung. 127.  
     *exaltata* v. *carpatia* Porc. 127.  
     *Haquetii* Graf. 127.  
     *Jacquinii* Koch 127.  
     *palustris* L. 127.  
     *rostrata* b. *Jacquinii* sumana Spreng. 127.  
     *tuberosa* Baumg. 127.  
     *versicolor* Wahlenb. 127.  
     *verticillata* L. 126  
*Petasites albus* Gärt. 81.  
     β. *Kablikianus* Grec. 81.  
     *Kablikianus* Tausch. 81.  
     *niveus* Baumg. 81.  
     *officinale* Mönch. 81.  
*Peucedanum alsaticum* L. 71.  
     *Cervaria* Cuss. 71.  
     *Chabraei* Rchb. 71.  
     *montanum* Koch. 71.  
     *Oreoselinum* Mönch 71.

- Phaca frigida L. 49.  
Phalaris arundinacea L. 175  
  canariense L. 175.  
Phlegopteris Dryopteris  
  Fée 191.  
  polypodioides Fée 191.  
  Robertiana Al. Br. 191.  
Phelipaea coerulea C. A.  
  Mey. 130.  
  purpurea Grec. 130.  
  ramosa C. A. Mey. 130.  
Phleum alpinum L. 176.  
  alpinum commutatum  
  Grec. 176.  
  Boehmeri Wibel 176.  
  collinum Schur 176.  
  commutatum Gaud. 176.  
  montanum C. Koch. 176.  
  pratense L. 176.  
  serrulatum Boiss. 176.  
Phomis pungens Willd. 136  
  tuberosa L. 136.  
Phænopus vimineus DC.  
  100.  
Phragmites communis Trin  
  177.  
Phyteuma alpinum Schur 108  
  anthericoides Nym. 108.  
  canescens W. et K. 108.  
  cofusum Kern. 108.  
  orbiculare L. 108.  
  Vagneri Kern. 108.  
Picris hieracioides L. 99.  
  β. crepoides Koch 99.  
Pimpinella magna L. 68.  
Saxifraga L. 68.  
  β. alpestris Spreng. 68.  
Pinguicula alpina L. 130.  
  vulgaris L. 130.  
Pirola chlorantha Sw. 111.  
  media Sw. 112.  
  secunda L. 112.  
Plantago arenaria W. et K.  
  140.  
  Cornuti Gou. 140.  
  Cornuti Guébh. 140.  
  hungarica W. et K. 140.  
  gentianoides Sibth. 140.  
  lanceolata L. 140.  
  β. irrigua Desne 140.  
  γ. hungarica Grec. 140.  
  major L. 140  
  δ. sabulosa Grec. 140.  
  maritima L. 140.  
  media L. 140.  
  Schwarsenbergiana  
  Schur 140.  
  sibirica Poir 140.  
  tenuiflora W. et K. 140.  
  uliginosa Baumg. 140.  
  uniflora L. 141.  
Platanthera bifolia Rich.  
  155.  
Pleurospermum austriac.  
  Hoffm. 74.  
Poa alpina L. 182.  
  annua L. 182.  
  β. supina Rchb. 182.  
  annua v. varia Gaud.  
  182.  
  arundinacea M. Bieb. 183  
  Chaixii Vill. 182.  
  dura Scop 182.  
  laxa Hænke 182.  
  minor Gaud 182.  
  nemoralis L. 182.  
  β. flaccida Grec. 182.  
  pratensis L. 183.  
  silvatica Vill 182.  
  sudetica Hænke 182.  
  supina Schrad. 182.  
  trivialis L. 182.  
  trivialis-pratensis Sanio  
  183.  
  violacea Bell. 182.  
Podospermum laciniatum  
  DC. 100.  
Polycnemum arvense L.  
  141.  
  α. majus Grec. 141.  
  β. brevifolium Neilr. 142.  
  γ. filifolium Neilr. 142.  
  arvense a longifol. Neilr.  
  141.  
  Heuffelii Lang. 142.  
  majus Al. Br. 141.  
  verrucosum Lang. 142.  
Polygala amarella Cr. 24.  
  austriaca Cr. 25.  
  comosa Schuhr 24.  
  major Jacq. 24.  
  vulgaris L. 24.  
  β. densiflora Tausch 24.  
  γ. pseudoalpestris Godr.  
  24.  
Polygonatum latifolium  
  Desf. 161.  
  multiflorum All. 161.  
  officinale All. 161.  
  verticillatum All. 161.  
Polygonum arenarium W.  
  et K. 148.  
  aviculare L. 148.  
  Bellardii All. 148.  
  Bistorta L. 147.  
  danubiale Kern. 148.  
  dumetorum L. 148.  
  Hydropiper L. 148.  
  lapathifolium L. 147.  
  β. incanum Koch. 148.  
  γ. danubiale Grec. 148.  
  mite Schrank 148.  
Polygonum persicaria α. L.  
  148.  
  viviparum L. 147.  
Polypodium aculeatum L.  
  191.  
  cristatum L. 192.  
  vulgare L. 191.  
Polystichum affine Ledeb.  
  192.  
  cristatum Roth 192.  
  Filix mas Roth 192.  
  α. subintegrum Grec. 192.  
  β. crenatum Grec. 192.  
  γ. deorsi-lobatum Grec.  
  192.  
  δ. affine Grec. 192.  
  Filix max v. caucasic.  
  Grec. 192.  
  spinulosum DC. 193.  
  β. dilatatum Koch 192  
  Thelypteris Roth. 192.  
Populus alba L. 152.  
  tremula L. 152.  
Potamogeton crispus L.  
  189.  
  β. serrulatus Rchb. 189.  
  fluitans Roth 189.  
  lucens L. 189.  
  natans L. 189.  
  natans β. fluitans Cham.  
  189.  
  oblongus a. fluitans Mey.  
  189.  
  pectinatus L. 189.  
  pusillus L. 189.  
Potentilla alba L. 57.  
  albo-villosa Schur 56.  
  Anserina L. 55.  
  α. discolor Wallr. 55.  
  β. concolor Wallr. 55.  
  arenaria Borkh. 57.  
  argentea L. 56.  
  β. impolita Wahlenb. 56.  
  γ. dissecta Wallr. 57.  
  astrachanica Jacq. 56.  
  aurea L. 57.  
  canescens Bess. 56.  
  chrysantha Trev. 57.  
  β. thuringiaca Grec. 57.  
  chrysocraspeda Lehm.  
  57.  
  β. minor Boiss. 57.  
  collina v. cano-viridis  
  Schur 57.  
  corymbosa Mönch 56.  
  hirta Sturm 56.  
  hirta v. pinnatifida Gri-  
  seb. 56.  
  hirta v. subsericea Gri-  
  seb. 56.  
  hirta v. pedata Schm. 56

- Potentilla incana* Mönch 57.  
*laeta* Rchb. 56.  
*leucotricha* Borb. 56.  
*maculata* Pourr. 57.  
*micrantha* Ram. 57.  
*microdons* Schur 57.  
*β. cano-viridis* Grec. 57.  
*obscura* Willd. 56.  
*patula* W. et K. 57.  
*pedata* Willd. 56.  
*pilosa* Willd. 56.  
*recta* L. 55.  
*rubens* Gr. 57.  
*silvestris* Neck. 58.  
*supina* L. 55.  
*taurica* Willd. 56.  
*thuringiaca* Bernh. 57.  
*Poterium polygamum* W. et K. 53.  
 var. *minor* Ulep. 53.  
*Prenanthes purpurea* L. 100  
*viminea* L. 100.  
*Primula acaulis* Jacq. 138.  
*β. caulescens* Koch 138.  
*Auricula* L. 139.  
*β. dentato-serrata* Grec. 139.  
*elatior* Jacq. 138.  
*longiflora* All. 138.  
*minima* L. 139.  
*officinalis* Jacq. 139.  
*suaveolens* Bertol. 139.  
*Prunus insititia* L. 53.  
*spinosa* L. 53.  
*β. brachypoda* Borb. 53.  
*γ. dasyphylla* Schur 53.  
*Pteris aquilina* L. 194.  
*β. lanuginosa* 194.  
*Pulicaria annua* Gärt. 82.  
*dysenterica* Gärt. 82.  
*β. glabrescens* Grec. 82.  
*Pulmonaria mollissima* Kern. 116.  
*officinalis* L. 116.  
*β. obscura* Dumort. 116.  
*rubra* Schott Ky. 116.  
*Pulsatilla nigricans* Störk 3.  
*Pyrethrum alpinum* Willd. 88.  
*cinereum* Griseb. 88.  
*corymbosum* Willd. 88.  
*corymbosum* Velen. 88.  
*millefolium* Willd. 89.  
*Pyrethrum Tanacetum* DC. 89.  
*uliginosum* W. et K. 88.  
*Quercus condensata* Schur 151.  
*Quercus pubescens* Willd. 151  
*Robur α.* L. 151.  
*sessiflora* Salisb. 151.  
*β. Welandii* Wierzb. 151.  
*Ranunculus acris* L. 7.  
*β. alpinus* Heuff. 7.  
*γ. multifidus* DC. 7.  
*δ. trisectus* Grec. 7.  
*alpestris* L. 4.  
*aureus* Schleich. 6.  
*β. parvulus* Grec. 6.  
*auricomus* L. 7.  
*β. pinguior* Rchb. 7.  
*incisifolius* Rchb. 7.  
*Breynius* Cr. 6.  
*bulbosus* L. 7.  
*β. incisus* Grec. 7.  
*Calcefolius* Bluf. 8.  
*carpaticus* Herzb. 5  
*β. prigmaeus* Porc. 5.  
*cassibicus* L. 7.  
*Constantinopolitanus* D'Urv. 7.  
*crenatus* W. et K. 4.  
*Ficaria var. β.* Ledeb. 8.  
*Ficaria v. incumbens* F. Schultz 8.  
*garganicus* Ten. 5.  
*glacialis* L. 4.  
*illyricus* 5.  
*lanuginosus* L. 6.  
*lateriflorus* DC. 8.  
*Lingua* L. 7.  
*millefoliatus* Rchb. 5.  
*montanus* Willd. 5.  
*β. suancticus* Grec. 6.  
*oxyspermus* Willd. 5  
*pedatus* W. et K. 5.  
*platanifolius* L. 4.  
*polyanthemos* L. 6  
*β. latisectus* Borb. 6.  
 var. *latifissus* Simk. 6.  
*polyphyllus* W. et K. 8.  
*repens* L. 6.  
*sceleratus* L. 8.  
*Stevenii* Andr. 7.  
*suaneticus* Rupr. 6.  
*Thora α.* L. 5.  
*trichophyllus* Chain 4.  
*β. terrestris* Gren. Godr. 4  
*Raphanus Raphanistrum* L. 21.  
*Rapistrum perenne* Berg. 21  
*Reseda lutea* L. 24.  
*β. ramosissima* Grec. 24-  
*luteola* L. 24.  
*inodora* Rchb. 24.  
*Rhamnus cathartica* L. 41  
*Frangula* L. 41.  
*Rhinanthus alpinus* Baumg. 127.  
*major* Ehrh. 128.  
*β. hirsutus* F. Schultz 128.  
*minor* Ehrh. 127.  
*α. simplex* Grec. 127.  
*γ. angustifolius* Koch 128.  
*montanus* Saut. 128.  
*Rhodiola rosea* L. 41.  
*Rhododendron Kotschy* Simk. 111.  
*Rhus Cotinus* L. 41.  
*Typhina* L. 41.  
*Ribes alpinum* L. 64.  
*Grossularia* L. 64.  
*α. glanduloso-setosum* Koch 64.  
*petraeum* Wulf. 64.  
*Robinia Pseudacacia* L. 49  
*Rochelia stellulata* Rchb. 119.  
*Roripa Kernerii* Menyh. 41.  
*Rosa adenophora* Kit. 60.  
*alpina* L. 60.  
*β. adenophora* Grec. 60.  
*alpina α. atrichophylla* Borb. 60.  
*andegavensis* Bast.  
 var. *transsilvanica* Sabr. 59.  
 var. *bihariensis* Borb. 59.  
*austriaca* Cr. 58.  
*bisserata* Méral 59.  
*canina* L. 58.  
*dumalis* Bechst. 59.  
*dumetorum* Thuill. 59.  
*δ. hemitricha* Rip. 59.  
*spinosissima* L. 60.  
*transsilvanica* Schur 59.  
*Rubus agrestis* W. et K. 58.  
*caesius* L. 58.  
*hirtus* W. et K. 58.  
*Idæus* L. 58.  
*Radula Weihe* 58.  
*saxatilis* L. 58.  
*tomentosus* Borkh. 58.  
*α. canescens* Grec. 58.  
*β. glabratus* Godr. 58.  
*γ. Barthianus* Borb. 58.  
*Rumex acetosella* L. 147.  
*alpinus* L. 147.  
*arifolius* All. 147.  
*conglomeratus* Murr. 147.  
*Hydrolapathum* Huds. 147.  
*limosus* Thuill. 146.  
*maritimus* L. 146.  
*β. pigmaeus* Grec. 146.  
*obtusifolius* L. 147.  
*palustris* Sm. 146.

- Rumex palustris* b. *limosus* Celak. 146.  
*Patientia* L. 147.  
*pulcher* L. 147.  
*viridis* Sm. 147.  
*Ruscus aculeatus* L. 162.
- Sagina** Linnæi Presl 33.  
 procumbens L. 33.  
*Sagittaria Sagittæfolia* L. 153.  
*Salicornia herbacea* L. 140.  
*Salia Caprea* L. 152.  
 cinerea L. 152.  
 fragilis L. 152.  
 hastata L. 152.  
 herbacea L. 152.  
 reticulata L. 152.  
 retusa L. 152.  
 rosmarinifolia L. 152.  
 silesiaca Willd. 152.
- Salsola Kali* L. 142.  
 β. *angustifolia* Fenzl. 142.  
*Soda* L. 142.
- Salvia* Æthiopis L. 131.  
 austriaca Jacq. 131.  
 betonicæfolia Ett. 132.  
*dumetorum* Andr. 131.  
*nemorosa* L. 131.  
 nutans L. 132.  
 officinalis L. 131.  
 pratensis L. 131.  
 γ. *dumetorum* Grec. 131.  
 δ. Andrzejowski Gre. 131.  
 silvestris L. 131.  
 β. *nemorosa* Grec. 131.  
 γ. *albiflora* Grec. 131.
- Salvinia natans* Hoffm. 190.  
*Sambucus racemosa* L. 77.  
*Sanicula europæa* L. 67.  
*Saponaria officinalis* L. 28.  
*Sarothamnus vulgaris* Wimm. 43.
- Sarothamnus scoparius*** Koch 43.
- Saxifraga adscendens* L. 66.  
 aizoides L. 65.  
 Aizoon Jacq. 64.  
 α. *brevifolia* Sternb. 64.  
 β. *recta* Ser. 65.  
 γ. *intacta* Willd. 65.  
 androsacea L. 65.  
 Baumgartenii Schott 65.  
 bryoides L. 65.  
 bulbifera L. 66.  
 cultrata Schott 65.  
 demissa Schott 65.  
 granulata Baumg. 66.  
 heucherifolia Griseb. 66.  
 Heuffelii Schott 66.  
*hieracifolia* W. et K. 66.
- Saxifraga Huetiana* Boiss. 67.  
 luteo-viridis Schott 65.  
 muscoides Wulf. 65.  
 γ. *moschala* Gaud. 65.  
 oppositifolia L. 65.  
 pedemontana All. 65.  
 racemosa Towns. 66.  
 stellaris L. 65.  
 trichodes Scop. 65.  
 vivipara Vert. 66.
- Scabiosa Columbaria* L. 79.  
 lucida Vill. 79.  
 β. *alpicola* Schur 79.  
 ochrolenca L. 79.  
 β. *flavescens* Griseb. 79.  
 ucranica L. 79.
- Schievreckia podolica* DC. 19.  
 romanica Procop. 19.
- Scilla alpina* Schur 163.  
 autumnalis L. 163.  
 bifolia L. 163.  
 β. *nivalis* Back.  
 β. *gracillima* Grec. 163.  
 nivalis Boiss. 163.  
 praecox Schott 163.
- Scirpus compressus* Pers. 171.  
 Holoschoenus L. 171.  
 lacustris L. 171.  
 maritimus L. 171.  
 Michelianus L. 171.  
 multicaulis Gmel. 171.  
 ovatus Roth 171.  
 silvaticus L. 171.  
 turgidus Pers. 171.
- Scleranthus marginatus* Guss. 34.  
 neglectus Rochel 34.  
 perennis β. *confertiflor.* Boiss. 34.  
 uncinatus Schur. 34.  
 verticillatus Tausch 34.
- Scolymus hispanicus* L. 88.  
*Scorzonera hispanica* L. 99.  
 β. *edulis* Mönch 99.  
 purpurea L. 99.  
 rosea W. et K. 99.
- Scrophularia alata* Gilib. 123.  
 Scopolii Hoppe 123.  
 β. *subalpina* Grec. 123.
- Scutellaria altissima* L. 137  
 orientalis β. L. 136.
- Secale cereale* M. Bieb. 188.  
 fragile M. Bieb. 188.  
*glaucum* D'Urv. 188.
- Sedum acre* L. 42.  
 alpestre Vill. 42.  
 annuum L. 42.
- Sedum atratum* L. 42.  
 boloniense Lois. 42.  
 Fabaria Koch 42.  
 glaucum W. et K. 42.  
 maximum Sut. 42.  
 neglectum Ten. 42.  
 purpurascens Koch 42.  
 β. *albiflorum* Koch 42.
- Selaginella helvetica* Spreng. 194.  
 spinulosa Al. Br. 194.
- Sempervivum assimile* Schott 42.  
 Heuffelii Schott 42.  
 hirtum Grec. 42.  
 soboliferum Sims. 42.
- Senecio aurantiacus* Auct. transs. 90.  
 Biebersteinii Grec. 91.  
*capitatus b. radiatus* Simk. 90.  
 carpaticus Herb. 91.  
 Doria β. *Biebersteinii* Liedem. 91.  
*Doronicum var. giaberrim.* Roch. 91.  
 erucaefolius L. 91.  
 Fuchsii Gmel. 91.  
 glaberrimus Grec. 91.  
 macrophyllus Bess. 91.  
 nemorensis L. 91.  
 rupestris W. et K. 91.  
 subalpinus Koch 91.  
 tomentosus Hort. 91.  
 umbrosus W. et K. 91.
- Serratularadiata* M. Bieb. 95.  
 95.
- Seseli annuum* L. 70.  
 campestre Bess. 70.  
 gracile W. et K. 66.  
 montanum b. *glaucum* DC. 69.  
 osseum Cr. 69.  
 tauricum Link. 70.  
 tortuosum L. 69.  
 varium Trev. 69.
- Sesleria coerulans* Friv. 179.  
 disticha Pers. 170.  
 Heuffariana Schur 179.  
 Sadleriana Janka 179.
- Sherardia arvensis* L. 74.  
 β. *brevifolia* Grec. 74.
- Sideritis montana* L. 136.
- Silene acaulis* L. 28.  
 chlorantha Ehrh. 29.  
 conica L. 30.  
 densiflora D'Urv. 28.  
 dichotoma Ehrh. 30.  
 dinarica Spreng 28.  
 Lerchenfeldiana Baumg. 20.



- Silene livida* Willd. 29.  
*longiflora* Ehrh. 29.  
*nemoralis* W. et K. 29.  
*nutans* L. 29.  
*β. transsilvaica* Grec. 29.  
*Otites* Sm. 28.  
*β. macrophylla* Otth 28.  
*spergulfifolia* Rchb. 29.  
*subconica* Friv. 30.  
*supina* M. Bieb 29.  
*transsilvanica* Schur 29.  
*venosa* Gilib.  
*β. Antelopum* Grec. 28.  
*γ. oleracea* Fic. 28.  
*viridiflora* L. 29.  
*viscosa* Pers. 29.  
*Zawadzkii* Herb. 28.  
*Sisymbrium Columnæ* Jacq. 16.  
*Irio* L. 16.  
*pannonicum* Jacq. 17.  
*strictissimum* L. 17.  
*Sium lancifolium* M. Bieb. 68.  
*Solanum Dulcamara* L. 121.  
*β. indivisum* Boiss. 121.  
*esculentum* Dum. 121.  
*Melongena* L. 121.  
*nigrum* L. 121.  
*Soldanella alpina β. hungarica* Grec. 139.  
*montana* Willd. 139.  
*β. hungarica* Simk. 139.  
*pusilla* Baumg. 139.  
*Solidago Virga Aurea* L. 82.  
*α. vulgaris* DC. 82.  
*β. latifolia* Koch. 82.  
*γ. alpestris* DC. 82.  
*Sonchus arvensis* L. 101.  
*arvensis v. lævipes* Koch. 101.  
*palustris* L. 101.  
*uliginosus* M. Bieb. 101.  
*Sorbus Aucuparia* L. 61.  
*Mougeoti* Soy.-Willm. 62.  
*Sorghum halepense* Pers. 176.  
*saccharatum* Pers. 177.  
*vulgare* Pers. 177.  
*Sparganium ramosum* Hud. 189.  
*Spartium scoparium* L. 43.  
*Spergula arvensis* L. 34.  
*Spergularia marginata* Boiss. 34.  
*media* Pers. 34.  
*rubra* Pers. 34.  
*Spiræa Aruncus* L. 54.  
*crenata* L. 54.  
*Spiræa Filipendula* L. 55.  
*Ulmaria* L. 54.  
*α. denudata* Koch 54.  
*β. discolor* Koch 54.  
*ulmifolia* Scop. 54.  
*Sporobolus pungens* Kunth. 177.  
*Stachys alpina* L. 135.  
*annua* L. 136.  
*arenariæformis* Rouy 136.  
*germanica* L. 135.  
*palustris* L. 136.  
*patula* Griseb 136.  
*β. linearifolia* Grec. 136.  
*recta* L. 136.  
*recta β. sideritioides* Bois. 136.  
*sideritioides* C. Loch. 136.  
*Silvatica* L. 136.  
*Statice Bessieriana* Röm. et Sch. 138.  
*Gmelini* Willd. 137.  
*Stellaria Boræana* Jord. 32.  
*glaucia* Wither. 22.  
*graminea* L. 32.  
*Holostea* L. 32.  
*media* Vill. 32.  
*β. neglecta* Weihe 32.  
*γ. pallida* Piré 32.  
*Pseudo-Malahium* Schur 32.  
*Reichenbachii* Wierzb. 32.  
*uliginosa* Murr. 33.  
*Stenactis annua* Nees. 81.  
*bellidifolia* Braun 81.  
*dubia* Cass. 81.  
*Stipa capillata* L. 179.  
*Graffiana* Stev. 179.  
*Lessingiana* Trin. 179.  
*pennata* L. 178.  
*β. Graffiana* Lindem. 179.  
*γ. Lessingiana* K. Richt. 179.  
*pulcherrima* C. Koch. 179.  
*Streptopus amplexifolius* DC. 161.  
*Struthiopteris germanica* Willd. 194.  
*Suæda filiformis* Dumort. 142.  
*maritima* Dumort. 142.  
*β. salinaria* Grec. 142.  
*maritima v. angustifol.* Andræ 142.  
*salinaria* Simk. 142.  
*Succisa pratensis* Mönch 79.  
*Swertia punctata* Baumg. 115.  
*Symphytum cordatum* W. et K. 118.  
*foliosum* Rchm. 118.  
*officinale* L. 117.  
*ottomanum* Friv. 117.  
*pannonicum* Pers. 118.  
*tuberosum* L. 117.  
*β. subcordatum* Grec. 118.  
*uliginosum* Kern. 117.  
*Syrenia cuspidata* Rchb. 17.  
  
**Tamarix** Pallasii Desv. 13.  
*Tamus communis* L. 160.  
*Tanacetum Balsamita* L. 89.  
*boreale* Fisch. 86.  
*Taraxacum officinale* Wigg. 100.  
*β. glaucescens* Koch 100.  
*γ. alpinum* Koch 100.  
*serotinum* Poir. 100.  
*Teleckia speciosa* Baumg. 83.  
*Teucrium Chamædrys* L. 137.  
*β. gracilior* Grec. 137.  
*Polium* L. 137.  
*α. vulgare* Benth. 137.  
*β. angustifolium* Benth. 137.  
*prostratum* Schur 137.  
*Scordium* L. 137.  
*Thalictrum angustifol.* Jacq. 2.  
*β. peucedanifolium* Grec. 2.  
*aquilegifolium* L. 1.  
*β. pauciflorum* Grec. 2.  
*collinum* Wallr. 2.  
*elatum* Murr. 2.  
*flexuosum* Grec. 2.  
*flexuosum* Bernh. 2.  
*foetidum* L. 2.  
*medium* Jacq. 2.  
*pauciflorum* Schur 2.  
*peucedanifolium* Griseb. 2.  
*saxatile* Schleich. 2.  
*simplex* K. 2.  
*Thesium alpinum* K. 149.  
*ramosum* Heyne 149.  
*simplex* Velen. 149.  
*Thlaspi affine* Schott 19.  
*dadicum* Heuff. 20.  
*perfoliatum* K. 19.  
*procumbens* Wallr. 20.  
*Thymelea arvensis* Lam. 148.  
*Thymus alpestris* Tausch 132.  
*austriacus* Bernh. 134.

- Thymus Borbasii H. Braun 133.  
 Chamædrys Fries 132.  
 β. albitlorus Grec. 132.  
 comosus Heuff. 133.  
 β. hirsutior Grec. 133.  
 comosus Schur 133.  
 Jankac Celak. 134.  
*humifus*. β. *macrophyll*. Rchb. 133.  
*lanuginosus* Baumg. 134.  
*lanuginos. v. hirsutior*. Rochel 133.  
 marginatus Kern 133.  
 Marschallianus Willd. 133.  
 montanus W. et K. 133.  
*montan* γ. *Chamæledon* Heuff. 133.  
*nummularius* Simk. 133.  
 pulcherrimus Schur. 133.  
*Rochelianus* Celak. 133.  
 Serpyllum Fries 134.  
*transsilvanicus* Schur. 133.  
 zygoides Griseb. 134.  
 Tilia obliqua Host 38.  
 tomentosa Mönch 38.  
 vulgaris Heyne 38.  
 Torilis Anthriscus Gmel. 72.  
 helvetica Gmel. 72.  
 Tournefortia Argusia Röm. et Sch. 115.  
 Tozzia alpina L. 126.  
 Tragopogon floccosus W. et K. 100.  
 Traguracemosa Hall. 175.  
 Trapa natans L. 64.  
 Tribulus terrestris L. 39.  
 Trifolium agrarium L. 48.  
*agrarium* Schreb. 48.  
 alpestre L. 46.  
 β. brevifolium Boiss. 46.  
*alpestre v. incanum* Halacsy 46.  
 arvense L. 46.  
 aureum Pall. 47.  
 badium Schreb. 47.  
*campestres* Schreb. 48.  
*coespitosum* Sturm 47.  
*coespitos. β. glareosum* Ser. 47.  
*dentatum* W. et K. 45.  
 expansum W. et K. 46.  
*filiforme* Koch 48.  
*glaciale* Porc. 47.  
 glareosum Schleich. 47.  
*pallescent* Auct. transs. 47.  
 pannonicum Jacq. 46.  
 Trifolium pratense L. 46.  
 γ. frigidum Gaud. 46.  
 procumbens L. 48.  
 β. minus Gren. Godr. 48.  
*procumbens* Sm. 48.  
*procumbens a. majus* Koch 48.  
*procumbens β. minus* Koch 48.  
*pseudoprocumbens* Gmel. 48.  
 repens L. 47.  
*repens b. glareosum* Simk. 47.  
 romanicum Brânza 46.  
 sarosiense Hazl. 46.  
 Triglochin palustre L. 164.  
 Trigonella Besseriana Ser. 45.  
 gladiata Stev. 45  
 Trinia Henningii Hoffm. 68.  
 Triticum farctum Viv. 187.  
*juncum* L. 187.  
 Trollius europæus L. 9.  
 β. transsilvanicus Schur 9.  
 Tulipa Biebersteiniana R. et S. 162.  
 silvestris L. 162.  
 Turgenia latifolia Hoffm. 72.  
 Turrilis glabra L. 14.  
 Typha angustifolia L. 189.  
 latifolia L. 188.  
*latifolia v. involucreta* Simk. 188  
 Suttlevörthii Koch 188.  
*transsilvanica* Schur 188  
 Utricularia vulgaris L. 131.  
 Vaccinium Myrtillus L. 111  
*punctatum* Lam. 111.  
 uliginosum L. 111.  
 Vitis Idæa L. 111.  
*Valantia alpina* Schur 77.  
 Valeriana bijuga Grec. 80.  
 montana L. 80.  
 officinalis L. 79.  
 β. collina Wallr. 79.  
 sambucifolia Mik. 80.  
 tripteris L. 80.  
 tripteris b. bijuga Simk. 80.  
 Valerianella Auricula DC. 80.  
 Auricula γ. tridentata Koch 80.  
 carinata Lois 80.  
 Morisonii DC. 80.  
 olitoria Poll. 80.  
 ramosa Bast. 80.  
 Valisneria spiralis L. 153.  
*Ventcnata avenacea* Koeh. 180.  
 Veratrum album L. β. Lobelianum 167.  
 Verbascum austriac. Schrad 122.  
 banaticum Schrad. 122.  
 Blattaria L. 122.  
 glabratum Friv. 122.  
 Kanitzianum Simk. 122.  
 Lychnitis L. 122.  
 nigrum L. 122.  
 phlomoides L. 122.  
 phœniceum-Blattaria Grec. 123.  
 rubiginosum W. et K. 122.  
 Thapsus L. 122.  
 Veronica alpina L. 125.  
 Anagallis L. 123.  
 β. tenella Rchb. 124.  
 γ. anagalloides Rchb. 124  
*d. aquatica* Bernh. 124.  
*Anagallis glandulosa* Lindem. 124.  
 aphylla L. 124.  
 austriaca L. 124.  
 Bachofenii Heuff. 125.  
 bellidioides L. 125.  
 Baumgartenii R. et S. 124.  
*Bihariensis* Kern. 124.  
 Chamaedrys L. 124.  
 β. macrocalyx Grec. 124.  
 dentata Schmidt 124.  
 hederifolia L. 125.  
*Jacquinti* Baumg. 124.  
 latifolia L. 124.  
 latifolia Jacq. 125.  
 latifolia v. major Schrad. 125.  
 longifolia L. 125.  
 β. transsilvanica Schur 125  
 montana L. 124.  
 multifida L. 124.  
 β. Jacquini Grec. 124.  
 γ. bihariensis Grec. 124.  
 officinalis L. 124.  
 orchidea Cr. 125.  
 præcox All. 126.  
 Pseudo-Chamaedrys Jacq. 125  
 scutellata L. 123.  
 serpyllifolia L. 125.  
 β. neglecta Grec. 125.  
 γ. major Grec. 125.  
 spicata L. 125.  
 spuria L. 125.  
 Teucrium L. 125.  
*Teucrium* Kern. 125.




- Veronica triphyllos* L. 125.  
*urticifolia* Jacq. 124.  
*Viburnum Lantana* L. 77.  
*Vicia cassubica* L. 51.  
*Cracca* L. 51.  
*grandiflora* β. *sordida* Grec. 51.  
*pisiformis* L. 51.  
*segetalis* Thuill. 51.  
*sepium* L. 51.  
*serratifolia* Jacq. 51.  
*varia* Host 51.  
*villosa* Roth 51.  
β. *gracillima* Grec. 51.  
*Vilfa Pungens* P. Beauv. 178.  
*Vignæa coespitosa* Rchb. 174.  
*Vinca herbacea* W. et K. 112.
- Viola alba* Bess. 22.  
*alpina* Jacq. 23.  
*ambigua* W. et K. 22.  
*arvensis* Murr. 24.  
β. *pigmæa* Lindem. 24.  
*biflora* L. 23.  
*canina* L. 23.  
β. *montana* Fries 23.  
*danubialis* Borb. 23.  
*declinata* W. et K. 23.  
β. *Knechtelii* Grec. 23.  
*elatior* Fries 23.  
β. *latifolia* Vand. 23.  
*hirta* L. 22.  
*mirabilis* L. 23.  
*neglecta* M. Bieb. 22.  
*odorata* L. 22.  
β. *glabrior* Stev. 22.  
*pumila* Ghaix 23.  
*saxatilis* Schmidt 23.  
*silvestris* Lam. 22.
- Viola silvestris* β. *Riviana* Koch. 22.  
*tricolor* L.  
*Vandasii* Velen. 23.  
*Viscum album* L. 148.  
*Vitis vinifera* L. 39.
- Xanthium macrocarpum** DC. 107.  
*Strumarium* L. 107.  
*Xeranthemum annuum* L. 92.  
α. *genuinum* Grec. 92.  
β. *platyphyllum* Grec. 92.  
γ. *uniflorum* Grec. 92.
- Zanichellia major** Böningh. 190.  
*Zeocriton distichum* P. Beauv. 186.  
*Zostera marina* L. 190.





INST. CAR. L. GOBL. 308 S. 143 DESCU

*Silene Lotriensis*  
[www.dacoromanica.ro](http://www.dacoromanica.ro)



*Melilotus arenaria*  
www.dacoromanica.ro





*Senecio ponticus*  
[www.dacoromanica.ro](http://www.dacoromanica.ro)





*Nonea paniculata*  
[www.dacoromanica.ro](http://www.dacoromanica.ro)





*Scrophularia elata*  
[www.dacoromanica.ro](http://www.dacoromanica.ro)







*Suaeda littoralis*

